

J. xxv. Ple

Translation of
Anfangsgründe der
Geburtskunde

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PROCEEDINGS

OF THE

ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

OF PHOENIX

VOLUME 1

PART 1

1892

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

GRONDBEGINSELEN

D E R

V R O E D K U N D E ,

D O O R

JOSEPH JACOB PLENCK:

*Docter der Heelkunde, Hoogleeraar der Ontleed-
Heel- en Verloskunde enz. te Weenen.*

MIT HET HOOGDUITSCH VERTAALD,

DOOR

C. H. B R I N K:

HEELMEESTER te AMSTELDAM.

TE AMSTELDAM, BIJ

J. B. E L W E:

1802

GEORGETOWN

1850

W. R. O. R. O. N. D. E.

1850

JOSEPH JACOB WENCK

JOSEPH JACOB WENCK

JOSEPH JACOB WENCK

JOSEPH JACOB WENCK

1850

W. R. O. R. O. N. D. E.



W. R. O. R. O. N. D. E.

W. R. O. R. O. N. D. E.

1850

MIJNEN VERDIENSTELIJKEN
L E E R A A R,
DEN HOOG GELEERDEN HEERE
A N D R E A S B O N N,
HOOGLEERAAR DER ONTLEED-
HEEL- EN VERLOS-KUNDE
AAN DE DOORLUCHTIGE SCHOOLE
TE A M S T E R D A M;

L I D
VAN VERSCHEIDEN GELEERDE
M A A T S C H A P P I J E N:
I N A A N

MIJNEN ALTIJD TOEGENEGENE VRIEND,
DEN GELEERDEN EN ZEER ER-
VAREN HEERE, DEN HEERE;

EVERHARD PIETER SWAGERMAN,

HEELMEESTER VAN DE NEDERDUIT-

SCHE GEREFORMEERDE

DIACONIE

TER GEMELDE STEDE,

E N

LID VAN VERSCHEIDEN GELEERDE

M A A T S C H A P P I J E N,

WORDT DIT WERK

M E T

EERBIEDIGE HOOGACHTING

VOOR ZIJNE VERDIENSTEN

TOEGEWIJD,

DOOR

DEN VERTAALER.

V O O R R E D E.

De grootste en beste onderneemingen van eenen Staat, zijn zekerlijk die, welken de naauwste betrekking hebben op de middelen, dienende het getal zijner Burgeren en Inwooneren te vermeerderen; dat doel wordt bereikt, wanneer het getal der jaarlijks leevend geborenen het getal der gestorvenen te boven gaat; dan, hoe lange was niet de Staat ongevoelig omtrent deeze grondwaarheid? voornaamlijk vergat men tot het bereiken van dat doel de Vroedkunde: getuigen daarvan het verbazend groot getal der dood-geborene kinderen, en de jaarlijks, onder de verlossing, stervende moeders — hoe noodzaaklijk is derhalven niet het oprichten van eene openbaare Leerschool der Verloskunde geworden! welk een schrikverwekkend gezicht, als eene baarende vrouw, op het oogenblik, dat zij, zig tegen alle pijnen der geboorte van haar evenbeeld aangekant hebbende, en door een kind verblijd zijnde, dat zij, met het zelve reeds in levensgevaar geweest zijnde, door ongeschiktheid van de toegebragte hulp of uit gebrek aan ervaring in de Verloskunde, dat zij, zeg ik, met dit naauwlijks geborenen Mensch-Natuur den laatsten tol moet betalen — welk eene gewigtige omstandigheid, daar het leven van twee, en dikwijls van nog meer menschen, in de onbekwaame handen van eene domme Vroedvrouw berust! de werktuigen der Vroedkunde zelve, waren in de handen van de meeste onzer Voorouderen, als de dolk in de hand

eens krankzinnigen ; het grootste gedeelte van hunne nagellevene werken , hebben de uitöeffende hand schande , de helpende schrik , de kunst verachting , en den nakomeling vrees aangebragt — Ondertusſchen heeft de Vroedkunde in ons Vaderland eene geheel nieuwe verandering ondergaan : zij lag , even als het overige gedeelte der Heelkunde , in eenen diepen ſlaap ; er ontbrak een man , die geest en kracht genoeg bezat , om door de ongevoeligheid van deeze tijden geprikkeld te worden : de waakende Voorzienigheid bragt eenen VAN ZWIETEN , een man van genoegzame krachten voorzien op onzen bodem ; deezen alleen was in ſtaat op 't moederlijke hart te werken van de grootste Monarchin , de onſtervelijke THERESIA , zij , bij wie moederlijk gevoel gepaard was met de wijsheid der Gekroonden om eene welgeöordende maatschappij inteyoeren , en nu ontſtonden er openlijke Schoolen , in welken wij ons verder konden oefenen in de Genees- en Heelkunde , als mede in de Vroedkunde en andere noodige weetenschappen , welken betrekking hebben op ons aanweezen , en onze onderhouding.

Door deeze aantrekkende verſchijnselen geprikkeld , ontbrandde in mij de begeerte , om mijne krachten in de Vroedkunde te beproeven , eene niet geringe oefening bevestigde mij in het beſluit , om naar bijzondere regelen omtezien ; hierbij voegde ik het geen door de beste Schrijvers opgetekend is , en richtte mij alſoo een eigen gebouw in deeze wetenschap op : in den beginne deelde ik mijnen arbeid alleenlijk aan eenige mijner vrienden , tot een leidraad mede ; dan , daar ik dagelijks meer en meer overtuigd werd , dat de bijgeloovigheid en de vooroordeelen der vrouwen , aan den eenen , en aan den anderen kant de onnutte en ſchadelijke ſchaamachtigheid der moeders , nog altijd de

moordenaarsfen van zoo veele onder de verlosfing ftervende moeders en kinderen werden, en daar ik mij thans in eene plaats bevind verwijderd van alle Weetenfchappen, alwaar, uit gebrek aan Vroedmeesters, het bedoelde zwaarwigtig werk alleen aan herfenlooze Vroedvrouwen is toevertrouwd; daar ik, alzoó van deeze, met onzin over de Verlofkunde hoorde fpreken, gevoelde ik in mijdeliefde voor de menfchheid ontbranden, en befloot mijn tegenwoordigen arbeid, aan dezelve op te offeren.

Mijn wensch is alleenlijk, dat ik den langzaam voortgang der Vroedkunde moge befpoedigen; ik zal onbepaalde gevallen in een helder licht trachten te brengen; fommigen in verfcheiden werken verftrooide ftukken famen voegen, en hoe gelukkig zal ik zijn, als ik waardige helpers, ter uitbreidinge haarer grenspaalen, moge vinden: hierdoor zal mijn boek eene verzameling worden van die veelvoutige kennis, welke eene gelukkig uitoefenende Verlofkunde niet kan derven, maar tevens een vertoonplaats van alle die voordgeplante vooroordeelen en dwaalingen, welken alleenlijk het gevolg zijn van een gebrek aan befchouwing en onderzinding bij den uitoefenaaren.

Ik vlei mij dat de eigenlijke kracht der Vroedkunde, naamlijk het leerftuk van het keeren des kinds in bijzondere gevallen, het verkiezen der inftrumenten, en de rechte bepaaing der Kunstbewerking, in deeze bladen naauwkeuriger opgetekend zijn geworden, dan men misfchien verwacht zoude hebben.

Na rijp overleg, heb ik de, behalven dat wijdloopige, befchouwing der ontvanging afgekort, om dat dezelve meestal uit gisfingen beftaat; ook stel ik vooruit vast dat

IV V O O R R E D E.

hij, die zig in de Vroedkunde zal oefenen, zig bevoorrens bekend moet maaken, met de waarschijnlijkste stellingen deezzer leere, te vinden in de onstervelijke werken van eenen BOERHAVE, HALLER en BLUMENBACH.

Ik heb voornaamlijk het oefenende gedeelte der Vroedkunde verhandeld, en dit is het dat de voornaamste bezigheid van eenen Heelmeester moet uitmaaken, gelijk zulks ook tot heden toe bij mij heeft plaats gehad: des bevat het eerste Deel van dit Werk, het Leerstuk der natuurlijke en ligte geboorten, om dat die den wegwijzer uitmaaken tot de zwaare en tegennatuurlijke geboorten, welken genoegzaam stof voor mijn tweede Deel opleveren.

Om dit Werk in meer dan één opzicht nuttig te doen weezen, heb ik de kortbondige practische wijs van schrijven verkozen, dat is, bij wijze van wetten kort zonder betoog en beschouwing: het laatstgemelde maakt mijne bezigheid uit in mijne openbaare voordragten.

De waare kenners zullen ligtlijk gewaar worden, dat ik deezen mijnen arbeid in LUZINE's tempel heb ter neder gesteld, daar ik geene werktuigen, maar de eenvoudige Natuur en haare werkingen voor oogen had.

Mijn oogmerk bereikt hebbende, zal 't mij eene groote belooning zijn, zoo slechts éene moeder en één kind door mijn Leerstelsel gered wordt: de nijd moge verachting op dit werk strooijen: ik mis gaarne den roem, mag mij alleenlijk deezze gedachten overblijven — Ik ben nuttig geweest.

I N.

I N H O U D.

VAN HET EERSTE DEEL.

| | Bladz. | 1. |
|--|--------|------|
| Over de Vroedkunde in 't algemeen. | . | 1. |
| — — Vrouwelijke teeldeelen in 't algemeen. | . | 4. |
| Ontleedkundige beschouwing van het bekken en deszelfs holte. | . | 5. |
| — — — — — van de zachte vrouwelijke teeldeelen. | . | 9. |
| — — — — — der inwendige deelen eener bezwangerde baarmoeder. | . | 15. |
| Het vliezige ei. | . | 16. |
| De moederkoek. | . | 17. |
| — navelstreng. | . | 19. |
| Het lamsvocht. | . | 22. |
| De vrucht. | . | 23. |
| Beschouwing der ontvanging. | . | 25. |
| Van de ontwikkeling der vrucht in 's moeders ligchaam. | . | 26. |
| Ontleedkundige beschouwing der zwangere baarmoeder. | . | 28. |
| Het werktuiglijke der geboorte. | . | 29. |
| Het leerstuk der natuurlijke verlossing. | . | 38. |
| Hoe men eene vrouw onderslaan moet. | . | 34. |
| Tekens der ontvanging. | . | 38. |
| — — zwangerheid. | . | 39. |
| Tijdrekening der zwangerheid. | . | 42. |
| Bezorging in de zwangerheid. | . | 43. |
| De tekenen der geboorte. | . | 46. |
| De voorbereiding eener baarende vrouwe. | . | 54. |
| De noodige hulpmiddelen. | . | 55. |
| Van de weeën. | . | 57. |
| Het vocht. | . | 60. |
| De ligging tot de geboorte. | . | 63. |
| Over de hulp in de geboorte. | . | 65. |
| Het uithaalen van den moederkoek. | . | 67. |
| Over het terug blijven van den moederkoek. | . | 69. |
| Over de bezorging eener kraamvrouwe. | . | 74. |
| De bezorging van het eerstgeboren kind. | . | 78. |
| De — — — — — des kinds staande den tijd der zooginge. | . | 83. |
| De verkiezing eener minne. | . | 85. |
| De voeding des kinds met melk van dieren. | . | 90. |
| De vroegtijdige geboorte. | . | 92. |
| De ontijdige — — — — — | . | 93. |
| Van de overtijdige geboorte. | . | 97. |
| De geboorte van een dood kind. | . | 98. |
| De — — — — — tweelingen. | . | 104. |
| De overbevruchte geboorte. | . | 107. |
| De valsche zwangerheid, en de geboorte eener vliezige misdragt, of mola. | . | 109. |

I N H O U D

VAN HET TWEEDE DEEL.

| | |
|--|-------|
| <i>Van de zwaare en tegennatuurlijke geboorte in 't algemeen. Bladz. 115.</i> | |
| <i>Over de zwaare geboorte, door een gebrek aan de baarende vrouw.</i> | 116. |
| <i>De gebreken van het bekken.</i> | 117. |
| <i>De naauwte van het bekken aan deszelfs ingang of 2- venste opening.</i> | 118. |
| <i>— — — — — aan deszelfs uitgang of onderste opening.</i> | 120. |
| <i>De mismaaktheid van het bekken.</i> | 122. |
| <i>De onbeweegelijkheid van het staartbeen.</i> | ibid. |
| <i>De hardheid der kraakbeenderen en banden van het bekken.</i> | 123. |
| <i>Bovenmaatige wijde van het bekken.</i> | 125. |
| <i>Het te weinig gebogen heiligbeen.</i> | 127. |
| <i>De alte groote beweeglijkheid des staartbeens.</i> | 128. |
| <i>Gebreken aan de lippen der schamelheid.</i> | ibid. |
| <i>Het watergezwel der schaamlippen.</i> | 129. |
| <i>Het bloedgezwel der schaamlippen.</i> | 130. |
| <i>De ontsteeking der schaamlippen.</i> | 131. |
| <i>De stijfheid der uitwendige iceldeelen.</i> | ibid. |
| <i>Gebreken der schede.</i> | 132. |
| <i>De tegennatuurlijke vernauwing der schede.</i> | ibid. |
| <i>De samengroeiing der schede.</i> | 134. |
| <i>De tegenwoordigheid van het maagdenvlies.</i> | ibid. |
| <i>Het vleeschgezwel der schede.</i> | 135. |
| <i>De uitzakking der schede.</i> | ibid. |
| <i>De schedebreuk.</i> | 136. |
| <i>De ontsteeking der schede.</i> | ibid. |
| <i>De pijnlijke zweeren der schede.</i> | ibid. |
| <i>De droogheid der schede.</i> | 137. |
| <i>De krampachtige samentrekking der schede.</i> | ibid. |
| <i>De schede welke zig in den endeldarm en vlak onder den navel opent.</i> | 138. |
| <i>Gebreken van den baarmoedersmond.</i> | 140. |
| <i>De samengroeiing van den baarmoedersmond.</i> | ibid. |
| <i>De Verharding van den baarmoedersmond.</i> | 141. |
| <i>De gezwollen aan den mond der baarmoeder.</i> | 142. |
| <i>De ontsteeking van denzelfen.</i> | 143. |
| <i>Deszelfs uitzakking.</i> | 144. |
| <i>De krampachtige samengetrokken baarmoedersmond.</i> | ibid. |
| <i>De gebreken der baarmoeder.</i> | 145. |
| <i>De scheefstaande baarmoeder.</i> | ibid. |
| <i>De breuk der baarmoeder.</i> | 151. |
| <i>De ontsteeking der baarmoeder.</i> | 152. |
| <i>Derzelver versterving.</i> | 254. |
| <i>Haare verlamming.</i> | 155. |

I N H O U D.

| | Bladz. |
|---|--------|
| Het scheuren der baarmoeder. | 157. |
| De van de schede afgescheurde mond der baarmoeder. | 160. |
| De bloedvloed der baarmoeder. | 161. |
| Gebreken aan de weeën. | 168. |
| Het afgaan der waare weeën. | ibid. |
| De valsche weeën. | 169. |
| Gebrek aan krachten. | 170. |
| Het verminderen der krachten bij het verarbeiden der weeën. | 171. |
| De ongeschiktheid der baarende vrouwe tot het verarbeiden der weeën. | ibid. |
| Het alte vroege verarbeiden der weeën. | 172. |
| Gebreken der naast de baarmoeder liggende deelen. | ibid. |
| De ophooping der pis. | 173. |
| — — — — — der drekstof in den endeldarm. | ibid. |
| Het uitzetten of zwellen der speenader. | 174. |
| Het zwellen der eïernesten. | ibid. |
| Gebreken der afgelegene deelen. | 175. |
| Als de vrouw die voor het eerst kraamt te jong is | ibid. |
| — — — — — te oud is. | 176. |
| Als eene baarende vrouw te vet is. | ibid. |
| — — — — — te waterzuchtig is. | 177. |
| — — — — — te volbloedig is. | ibid. |
| Als bij eene baarende vrouw snijpen komen. | 178. |
| Als zij mank gaat of eenen bogchel heeft. | 179. |
| Als een baarende vrouw te klein is. | ibid. |
| — — — — — ziek is. | 180. |
| — — — — — dood is. | ibid. |
| De zwaare en tegennatuurlijke geboorte door een gebrek aan het kind en deszelfs deelen. | 181. |
| De gebreken aan het hoofd. | ibid. |
| Het alte groote hoofd des kinds. | 182. |
| Het monsterachtige hoofd. | 186. |
| Het waterhoofd. | ibid. |
| Het dubbelde hoofd. | 188. |
| Het verbeenen der fontanellen. | 189. |
| Gebreken aan het ligchaam des kinds. | 190. |
| De alte groote schouders van het kind. | ibid. |
| De monsterachtige gedaante des kinds. | 191. |
| Van aan elkander gegroecide tweelingen. | 192. |
| Het waterzuchtige kind. | ibid. |
| Gebreken van den navelstreng. | 194. |
| De kortheid van den navelstreng. | ibid. |
| Als de navelstreng om den hals van het kind geslingerd is. | 196. |
| Het uitzakken van den navelstreng. | 198. |
| Gebreken van den moederkoek. | 200. |
| Het voorkeomen van den moederkoek. | 201. |
| Het vasthechten van den moederkoek bezijaen den bodem der baarmoeder. | 204. |

I N H O U D.

| | |
|---|--------------|
| <i>Het terugblijven van den moederkoek naa de geboorte.</i> | Bladz. 205. |
| <i>De gebreken van de vliezen.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>De dikte der vliezen.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>De dunheid der vliezen.</i> | 206. |
| <i>De gebreken van het lamsvocht.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>De alte groote hoeveelheid van het lamsvocht.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>De vermindering van het lamsvocht.</i> | 207. |
| <i>De gebreken aan de ligging des kinds.</i> | 208. |
| <i>De kwaade ligging in 't algemeen.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>De kunstige keering van een kind.</i> | 209. |
| <i>Het verlossen van een kind het welk met den basis van 't hoofd voorkomt.</i> | 214. |
| <i>Van de geboorte waarin de kruin voorkomt.</i> | 216. |
| <i>Het scheefstaande hoofd.</i> | 221. |
| <i>Het inzakken van 't hoofd met een ander gedeelte van het ligchaam.</i> | 222. |
| <i>De geboorte van het aangezicht.</i> | 223. |
| <i>————— achterhoofd.</i> | 228. |
| <i>De oorgeboorte.</i> | 229. |
| <i>De samengestelde hoofdgeboorte.</i> | 234. |
| <i>De halsgeboorte.</i> | 235. |
| <i>De schoudergeboorte.</i> | 237. |
| <i>De geboorte waar de elleboog voorkomt.</i> | 238. |
| <i>De geboorte der hand.</i> | 239. |
| <i>Van de armgeboorte.</i> | 241. |
| <i>Van de geboorte der borst.</i> | 246. |
| <i>De geboorte waarbij de buik voorkomt.</i> | 248. |
| <i>De geboorte van het zijdelijk gedeelte van het lijf.</i> | 250. |
| <i>De geboorte van den rug.</i> | 252. |
| <i>De geboorte waarbij den stuit voorkomt.</i> | 254. |
| <i>De kniegeboorte.</i> | 259. |
| <i>De voetgeboorte.</i> | 260. |
| <i>De zwangerheid buiten het hol der baarmoeder.</i> | 269. |
| <i>De geboorte door den endeldarm.</i> | 272. |
| <i>Over de instrumentaale operatiën in de Vroedkunde, in het algemeen.</i> | 273. |
| <i>Over het gebruik van de Roonhuysiaansche hefboom.</i> | 278. |
| <i>Over het gebruik der tangen.</i> | 282. |
| <i>Het ontlasten der hersenen uit het hoofd.</i> | 287. |
| <i>————— — borst ingewanden.</i> | 291. |
| <i>Hoe een afgetrokken en teruggebleven hoofd uit de baarmoeder gebragt moet worden.</i> | 293. |
| <i>De wijze, om naa een afgescheurd hoofd den in de baarmoeder teruggebleven tronk uittehaalen.</i> | 296. |
| <i>Het doorklieven van het tusschen de schaambeenderen liggende kraakbeen, en de bandachtige zelfstandigheid.</i> | 298. |
| <i>De buiksneede.</i> | 303. |
| <i>De keizerlijke sneede.</i> | 301. |

GROND.

GRONDBEGINSELEN

DER

VROEDKUNDE.

Over de Vroedkunde in 't algemeen.

Dat gedeelte der Heelkunde, 't welk leert hoe men het baarende geslacht in eene natuurlijke, en tegen-natuurlijke geboorte ter hulpe komt, heeft, in het leerstuk der algemeene Geneeskunde, den naam van Vroedkunde ontvangen. (*)

Eer wij het leerstuk deezer wetenschap in het bijzonder verhandelen, zij het mij vergund, iet aantetekenen wegens derzelver naam, ouderdom, oorsprong, voorgang, noodzaakelijkheid, en de uitgebreide nuttigheid welke zij bevat.

Vroedkunde, wordt het uitoefenen dier wetenschap hier te Lande genaamd, om dat men, zonder met de oogen te beschouwen, en met de handen overdekt, moet werken: de Genees- en Heelkundigen, welken deeze kunst uitoefenen worden *Vroedmeesters* genaamd, en de Vrouwen welken tot dezelfde uitoefening gerechtigd zijn, draagen den naam van *Vroedvrouwen*.

De ouderdom der Vroedkunde is gelijk dien van het menschlijk geslacht, om dat, van de schepping af, haare hulp den menschen noodzaakelijk geweest is; echter heeft men, van den oorsprong deezer Kunst, tot op de tijden

(*) Ofschoon veele Schrijvers het leerstuk der ziekten, aan welken de zwangere, de baarende, en de kraamvrouwen, alsmede de kinderen, onderworpen zijn, niet de Verloskunde vereenigen, behoort hetzelfde echter niet in het eigen besfeet der Vroedkunde; de behandeling dier ziekten bepaalt zig alleenlijk tot het vak der Genees- en Heelkunde: daar 't ondertuschen ook waar zij, dat er geen goed Vroedmeester kan zijn, zonde, dat hij kennis hebbe van de Genees- en Heelkunde, kan men de Vroedkunde, met allen recht, verdeelen, in eene Geneeskundige en eene Heelkundige.

2 GRONDBEGINSELEN DER

van HYPOCRATES toe, niets zekers geweten: deeze, die de Geneeskunst, in *Griekenland*, omtrent 400 jaar vóór de geboorte onzes Zaligmaakers uitoefende, is de eerste welke, in zijne Werken, van de Vroedkunde gewag maakt. (*)

Van dien tijd af, tot op PARAEUS, (als men CELSUS (†) en PAUL EGINETTA uitsluit,) heeft deeze wetenschap, geene verbetering ondergaan, en is alzoo niet tot grooter wasdom gekomen; deels om dat zij in handen van vrouwen was, deels om dat de Genees- en Heelkundigen, tot in de zestiende eeuw toe, het werk van HYPOCRATES, uit eene overdreevene hoogachting, alleenlijk afgeschreven, en niet gewaagd hebben zelve te denken: eerst in gemelde eeuw werd, in *Frankryk*, een huis, ten openlijken onderwijs in de Vroedkunde, gesticht: aldaar was het dat, in dezelfde eeuw, PARAEUS en GUILMAN, en in de zeventiende eeuw, MOURICAU en LAMOTTE, deeze Kunst met ernst begonnen te verhandelen.

In 't begin van de tegenwoordige eeuw, en ook nog op het einde der voorgaande, hebben de *Engelschen*, de *Hollanders*, de *Zweeden*, de *Zwitzers* en de *Duitschers* dat roemrijk voorbeeld gevolgd, daar dezelve niet alleenlijk Vroedkundig onderwijs gaven, maar ook de Vroedkunde in openbare gasthuizen uitoefenden, terwijl zij dezelve, buiten die gestichten, mede met veel roems ter hand namen.

In *Engeland* werd de Vroedkunde beoefend, door CHAMBERLAIN met zijne drie zoonen; in *Holland*

(*) HYPOCRATES zoude zijne Godlijke Werken niet met bijgeloof, enz. bekleed hebben zo hij zelf de Vroedkunde ter hand hadde genomen: HYPOCRATES, de goede en getrouwe naarvolger der Natuur bij ziekten, is geen HYPOCRATES meer, als hij van de Vroedkunde spreekt, alhoewel het niet te ontkennen zij, dat hij in zijne Werken, nu en dan, eene goede handleiding tot die kunst geeft: deeze groote man hechte te veel geloofs aan de vertellingen der *Grieksche matroonen*.

(†) De verstandige geest van CELSUS zag, voor het eerst, dat men een tegen-natuurlijk liggend kind, bij de voeten en niet bij 't hoofd moest verlossen: EGINETTA heeft, daaromtrent de *Hypocratische Leer* verlaten, en is die van CELSUS gevolgd.

door RUYSCH, de twee ROONHUISEN, SOLINGEN en door VAN DEVENTER; in *Zweeden* door JOHANN VAN HOORN, in *Zwitserland* door MURALT, in *Duitschland* door SLEVOGT, HEISTER, FRIED en THEBESIUS; dan, alhoewel de Verloskunde door deeze beroemde mannen eenen merkbaar grooten wasdom ontvinge, grooter dan waartoe zij in alle de vroegere eeuwen was gestegen, hebben echter laater Vroedkundigen, als SMELLIE, CRANZ, RÜDERER, LEVRET, PUSOS, STEIN, SAXTORPH, STEIDELÉ, JACOBS en voornaamlijk, BOUDELOQUE, desaangaande, veel meer lichts aangebragt, waardoor de scherpe werktuigen, bij hunne voorgangers in gebruik, verbannen, en in derzelver plaatsen stompe werktuigen aangenomen zijn; ja ook heeft men vervolgens geleerd deezen somtijds te verwerpen, en alleenlijk met de handen te doen, het geen te vooren met de bedoelde stompe werktuigen gedaan werd. (*)

Het uitneemend nut, en de onontbeerlijkheid der Verloskunde, in alle Landen, blijkt ten volle, uit de droevige gevolgen van haare afwezigheid, en niet minder uit het geene ik in mijne Voorrede reeds gezegd heb, naamlijk, dat ieder Geneesheer zig met het beschouwende gedeelte deezer Kunst moet bekend maaken, en ieder Heelkundige dezelve moet weeten uitte oefenen.

Ondertusschen draagen zekere eigenschappen niet weinig tot de zaak zelve bij; alzoo is de eene, naar gelang van den natuurlijken bouw zijns ligchaams, meer geschikt tot het uitoefenen van deeze kunst, dan de andere; want een Vroedmeester, met eene breede hand, korte en stijve vingers, is minder geschikt, dan die welke eene finalle hand, lange en ligt beweegende vingers heeft: komt nu hier nog bij een gezond verstand, goed oordeel, en, niet minder, onbesprokene zeden, dan mag zulk een, met recht, een achtenswaardig Vroedmeester genoemd worden: wat zijne zedelijke deugden betreft hij moet vriendlijk wezen; goedaartig, vrolijk, geduldig, den sterken drank niet beminnen, en vooral de geheimhouding,

(*) Zie LEROY, Letter- Historisch- en oefenend onderricht in de Verloskunde, 1779.

bijzonderlijk in gevallen van verborgene ziekten, in den hoogsten graad betrachten.

Het nut der Verloskunde is van onderscheiden' aart: zij behoudt dikwijls moeder en kind, 't geen anders door geenig geneesmiddel hoegenaamd te weeg gebragt had kunnen worden; zij geeft den Genees- en Heel-kundigen herhaalde gelegenheid, om zoo wel de ziekten der vrouwen als die der kinderen beter te leeren kennen, en te geneezen; de gerechtigke Geneeskunst kan door haar een oordeelkundig besluit opmaaken.

Men ziet hieruit hoe noodzaakkijk de Vroedkunde in eenen wèl ingerichten Staat is, en hoe noodig het is voor 't welzijn der menschen, kundige Vroedvrouwen en Vroedmeesters aantekweeken.

Om mijn leerbegrip naar eenen goeden regel voor tedraagen, zal ik, in het eerste Deel van dit Werk, over het maaksel van de vrouwlijke teeldeelen, en derzelver werkingen, spreken, en ook opgeeven hoe de Natuur eene natuurlijke geboorte bewerkstelligt, om alzo in het tweede Deel, met meer gemak, de middelen aan de hand te kunnen geeven, waardoor men de Natuur, in eene moeijelijke geboorte, te hulp moet komen.

Over de vrouwlijke teeldeelen in 't algemeen.

Die deelen van het vrouwlijke lichaam, waarin de bevruchting geschiedt; waarin het kind gedragen, gevoed, en, naa negen maanden, geboren wordt, worden de vrouwlijke teeldeelen genoemd: zij worden verdeeld in harden en zachten: de harden zijn het bekken, en deszelfs kraakbeen.

De zachten worden onderscheiden in die welken buiten, en in die welken binnen het bekken geplaatst zijn.

Bij deeze eigentlijke schaamdeelen, komen ook in aanmerking, die welken naast dezelve gelegen zij, om dat deezen tot eene tegen-natuurlijke verlosfing aanleiding kunnen geeven. De natuurlijke gedaante van alle deeze deelen moet wèl naauwkeurig gekend worden.

Wij zullen dezelve, voor zoo verre het noodig zij, Ontleedkundig beschouwen.

Ontleedkundige beschouwing van het bekken, en deszelfs holte.

Het bekken is die beenige holte, welke het benedenste gedeelte van het onderlijf des vrouwlijken ligchaams uitmaakt.

Een Vroedkundige moet allezins bekend zijn met de natuurlijke gedaante van het bekken; met het getal der beenderen welken het samenstellen; met deszelfs natuurlijke wijdte en diepte, als ook met de nuttigheid van die holte, om dat de vrucht deezen harden beenigen weg moet doorgaan.

Het bekken vertoont eene groote beenige holte, en is van eene eliptische gedaante, aan wier bovenste zijden de darmbeenderen vleugelswijs afstaan. (*)

Deeze holte is uit vier beenderen samengesteld; naamlijk uit twee ongenaamde beenderen, welken het voorste en zijdelijke gedeelte van hetzelfde uitmaaken; voorts is het achterste gedeelte samengesteld uit het heilig- en het staart-been samen.

Bij jonge kinderen bestaat ieder der ongenaamde beenderen uit drie deelen: van boven en ter zijde uit het darmbeen; van onderen en ter zijde uit het zitbeen, en van vooren uit het schaambeen.

Deeze drie deelen zijn in den heupkom met elkander vereenigd, en, bij bejaarden, geheel samengegroeid.

Hierbij zijn nog de volgende vier merkwaardige vereenigingen in aanmerkinge te neemen; als, 1) de vereeniging der schaambeenderen: ieder stuk der schaambeenderen is met eene kraakbeenige korst bekleed: in de midden, alwaar de vereeniging plaats heeft, is de ruimte met een

(*) De gedaante van een gewoon scheerbekken, heeft de vroegere Ontleedkundigen tot de benaaming van *bekken* aanleiding gegeven.

bandachtig weeffel gevuld, het welk met eenen dikken ringformigen band bedekt is — 2) de vereeniging der darmbeenderen met het zijdelijk gedeelte des heiligen beens; 3) de vereeniging van het bovenste gedeelte des heiligen beens, met den laatsten lendenwervel; 4.) de vereeniging van het staartbeen met het onderste gedeelte des heiligen beens.

Alle deeze vereenigingen geschieden door een tusschenliggend bandachtig weeffel, welks zelfstandigheid meer veerkracht heeft dan het kraakbeen.

Deeze vier vereenigingen der beenderen van het bekken (behalven die van het staartbeen) laten geene beweging toe; en offchoon de gezegde beenderen met elkander vereenigd zijn, door eene veerkrachtig uittrekkende zelfstandigheid, vergunt dezelve echter ook geene vanëenwijking der bekken-beenderen; doch bij de geboorte kan die zelfstandigheid uitgerekt worden; en in zwaare verlosfingen, bij gezonde vrouwen, zoo wel als bij een ziekelijke gesteldheid dier zelfstandigheid, heeft men soms eene geweldige, geheele vanëenwijking dier deelen gezien. Het staartbeen alleen, kan, zonder zig te verplaatsen, of te breeken, wel een duim achteruit gedrukt worden. Wanneer men nu deeze beenige holte van het bekken in zijn geheel beschouwt, kan dezelve verdeeld worden in ingang, uitgang, en bekkenhol: men voege hierbij de twee vleugels der darmbeenderen, en de uitpuiling des heiligen beens, welken mede in aanmerking verdienen te komen.

De bovenste opening, of de ingang in het bekkenhol, wordt gemaakt, van achteren door den laatsten lendenwervel, en het bovenste gedeelte van het heiligebeen, ter zijde door de middenste stompe randen der darmbeenderen, en van vooren door de schaambeenderen. De gedaante van den ingang van het bekken is, nagenoeg, gelijk aan die van een hart, welks punt naar vooren, en welks breede gedeelte naar achteren gekeerd is.

Boven den ingang, ter zijde van het bekken, slaan de darmbeenderen, vleugelswijze naar buiten gebogen: de uitpuiling, welke, aan den ingang van het bekken, naar achteren toe, plaats heeft, en gemaakt wordt door den

laatsten lendenwervel, en het bovenste gedeelte van het heiligbeen, draagt, by de Vroedkundigen, wel eens den naam van Voorberg des heiligen beens.

De onderste opening, of de uitgang van het bekken, wordt gemaakt van achteren, door het staartbeen, ter zyde door twee banden en de knobbels der zitbeenderen, en van vooren door den schaambeensboog: deeze banden, welken van de vereeniging des heiligbeens met het staartbeen beginnen, en zig uitstrekken tot aan de graatachtige uitsteekfels der zitbeenderen, geeven den onderste uitgang eene ronde gedaante: naar achteren, en naar vooren eindigt dezelve, onder den schaambeensboog, in eenen stompen hoek.

De wijdde van den ingang van het bekken, wordt verdeeld in drie afmetingen; naamlijk, in de rechte, in de dwarse, en in de schuinse.

De rechte afmeting van den gezegden ingang begint van de uitpuiling des heiligen beens, tot aan de vereeniging der schaambeenderen, en is 4 duim lang: de dwarse afmeting gaat van den eenen stompen rand der darmbeenderen tot aan den tegenover staanden, en bedraagt 5 duim.

De schuinse afmeting van den ingang der bekkenholte, begint van de vereeniging des heiligen beens met het darmbeen, gaat schuinsch naar vooren, tot op het midden van één der schaambeenderen, aan de tegenover staande zijde van het bekken, en is lang $4\frac{1}{2}$ duim: deeze afmeting zoude de grootste zijn, indien zij niet verkleend wierde door de groote lendenpier, welke in den hoek der vereeniging van het heilig- en darm-been geplaatst is.

De uitgang der bekkenholte van het staartbeen, tot onder den schaamboog, bedraagt 4 duim; te gelijk met de dwarse lijn welke van het eene zitbeen tot het andere gaat.

Hierbij moet nog in aanmerkinge genomen worden, dat de middenlijn, van het staartbeen tot aan den schaambeensboog, in de verlossing, door het teruggedrukken van het staartbeen, een duim grooter wordt, en alzoo is het mogelijk dat die uitgang, bij de verlossing, $5\frac{1}{4}$ duim bedraagt.

Het blijkt dus, dat de ingang van het bekken, van de

eene zijde tot de andere, wijder is, dan van achteren naar vooren: van onderen aan den uitgang heeft, bij de geboorte, het tegendeel, in de afmetting, plaats, en het geen ook noodig was, om dat het kind met den kruin eerder door den ingang; maar met het aangezicht eerder door den uitgang geperst wordt; het welk ik zal bewijzen.

De hartswijze ruimte der beide openingen maaken het ware bekken-hol uit: de wijde van hetzelfde is grooter dan die der openingen.

De diepte van het bovenste gedeelte des heiligen beens, tot het staartbeen, bedraagt, in eene rechte lijn, omtrent 6 duim; maar is het staartbeen achteruit gedrukt, dan bedraagt dezelve $6\frac{1}{2}$ duim.

Aan de zijde is de diepte van het bekken-hol, van den darmbeensrand tot aan den onderrand van het zitbeen, 4 duim, en van den boven- tot den onder-rand der schaambeenderen, alwaar dezelve vereenigd zijn, 2 duim.

Alzoo is het bekken van achteren driemaal, en ter zijde tweemaal, zoo diep als van vooren.

De gedaante van het bekken-hol gaat des ter zijde, en van buiten, loodlijnig naar beneden; van achteren maakt het onderste gedeelte van het heilig- en staart-been eene kromte, welke zig van binnen in het bekken-hol buigt.

De as, die loodlijnig in het midden van de bovenste opening valt, wordt naar vooren met een stompen hoek gebogen, wanneer dezelve in het midden der onderste opening zal vallen: deeze buiging van den as, geschiedt niet in het midden van 't bekken-hol, maar meer naar achteren, alwaar de kromte van het heiligbeen het grootste is. (*): ook verschilt de gedaante als mede de wijde van een vrouwen-bekken met dat van eenen man; den in- en uit-gang van het eerstgemelde zijn wijder, het staart-been is beweegbaarder, en de vleugels der darmbeenderen zijn, tot het vrij uitzetten van de baarmoeder, meer naar buiten gebogen: desgelijks zijn de zitbeensknobbels en de schaambeensboog meer van elkander verwijderd, ten

(*) Eijtelijk, derhalven, brengt men de hand, door het bekken, naar de baarmoeder, wanneer men dezelve aan de eene of andere zijde, naas: de uitpuiling van het heiligbeen, halvemaauswijze gekend, naar boven brengt.

ende daardoor het hoofd des kinds eenen gemaklijken doorgang te maaken.

De nuttigheid, in 't algemeen, van het bekken, is niet alleenlijk om de baarmoeder, maar ook om zoowel de in- als uit-wendige teeldeelen, een vaste bewaarplaats en ondersteuning te geeven.

Deeze is dan de beschrijving van een bekken, het welk natuurlijk is, en door het welk eene natuurlijke verlossing geschiedt: ieder bekken derhalven, 't welk deeze eigenschappen bezit, word een *welgesteld bekken* genaamd; maar wijkt het in 't een of ander van het bovenbeschrevene af, dan draagt het den naam van een *mismaakt bekken*.

Ontleedkundige beschouwing van de zachte vrouwlijke teeldeelen.

De deelen voor de bevruchting en de geboorte verordent, liggen deels buiten, deels binnen het bekken-hol.

De uitwendige deelen zijn

De venusberg,

— groote lippen,

— kleene lippen der schamelheid,

— kittelaar,

Het toomtjen der lippen,

De bilnaad,

— ingang der schede, en

Het maagden-vlies,

De inwendigen zijn,

De schede,

— baarmoeder,

— banden der baarmoeder,

— trompetten van FALLOPIUS, en

— eïernesten, met de vaten, zenuwen en klieren, daartoe behoorende

Die welken in het bekken, en in de nabijheid van de voorigen liggen, zijn

De endeldarm,   

— pisblaas, en

— pisweg,

De venusberg is die, boven de schamelheid gelegene, vetachtige verhevenheid, met eene hairige huid bekleed, welke de vereeniging der schaambeenderen, als met een kussen, bedekt.

De groote lippen zijn twee groote dikke, langwerpige vette verhevenheden, beginnende onder den venusberg, en eindigende van achteren aan de bilnaad: onder den venusberg en aan de bilnaad zijn zij samen vereenigd.

Onder de bovenste vereeniging is de kittelaar geplaatst: de achterste vereeniging geschiedt door eene dwarsle huidplooi, en wordt het toontjen genaamd, 't welk, met de binnenste oppervlakte der groote lippen, de schuitswijze holte aan de bilnaad maakt.

De huid der groote lippen heeft van buiten een bruinen kleur; maar derzelver maakfel is gelijk aan die met welke alle andere deelen bekleed zijn.

De binnenzijde der groote lippen is van het overige der huid onderscheiden, zoo door haaren rooden kleur, als haare fijnheid en gevoeligheid, even als dat onderscheid plaats heeft tusfchen de lippen des monds en het aangezicht.

De buitenste vlakke der groote lippen is, als de venusberg bij huwbaare maagden, met korte en krullende haaren bedekt, welken veelal, in den hoogen ouderdom, weder verloren gaan.

Het nut der groote lippen, is gelijk aan dat van den venusberg; naamlijk dat door dezelve de schaamboog en de kittelaar bedekt worden: bovendien heeft men waargenomen dat zij, in 't bijzonder bij eerst kraamenden, onder de verlossing, naar binnen in de schede getrokken worden, en zijn alzoo behulpzaam, daartoe, dat de schede meer en gemaklijker, zonder scheuring, door het hoofd des kinds kan verwijd worden.

De kleene lippen zijn twee vliezige huidploojen, niet ongelijk aan eene haanekam, welken, van de voorhuid des kittelaars beginnende, langs de zijde van de schede voortgaan.

Zij worden gevormd door de verlenging der binnenste huid van de groote schaamlippen, en bestaan uit bloedvaten, zenuwen, klieren, en een sponsachtig wezen, waaruit de roodheid, gevoeligheid en de stijfwording ontstaat: zij zijn gestadig vochtig: de klieren deezer deelen scheiden geduurig een vocht af, hetwelk eenen eigenen reuk heeft.

Het nut van dezelve is, dat zij den ingang der schede sluiten; ook leiden zij de pis zoodanig, dat de beenen door dezelve niet bevochtigd worden, en, bij de verlossing is derzelver nut, als dat der groote lippen.

Onder de vereeniging der schaambeenderen en onder den voorsten hoek der groote lippen, is een sponsachtig ligchaam geplaatst, gelijkende naar de glans, welk ter zijden uit twee verlengfels van den schaambeensboog begint: de punt van dit ligchaamtjen wordt door eene plooi der huid, waarvan de kleene lippen beginnen, omvat: dit ligchaamtjen draagt den naam van kittelaar, en de huid waarvan hetzelfde omvat is, wordt de voorhuid des kittelaars genaamd.

Deeze kittelaar bestaat, even als de manlijke roede, uit twee sponsachtige ligchaamen, welken op het laatste maar één worden, geene opening hebbende, en 't welk door de veele bloedaderen zijne roodheid, door de veele zenuwen zijne gevoeligheid verkrijgt: in dit ligchaam is, in den bijslaap, de zitplaats van de aanprikkeling der wellust; het zwelt op, en wordt stijf, gelijk de manlijke roede.

Tusschen de kleene lippen is de ingang der schede, aan welke het maagdenvlies en de mijrtheuveltjens gevonden worden.

Gezegde heuveltjens zijn vier in getal, naamlijk twee aan wederzijde der schede; zij zijn bij maagden, vóór den bijslaap, door het maagdenvlies vereenigd. (*)

(*) De Heer VAN HALLER zegt, dat deeze mijrtheuveltjens bestaan, deels uit het verbroken maagdenvlies, deels uit verharde einden der schede, als ook uit

In den ingang der schede is een kringswijs vlies gelegen, somtijds is het eirond, het welk eene groote of kleene opening heeft, den ingang vernauwt, en denzelven als het waare met een klep sluit.

Dit vlies wordt het maagdenvlies genoemd: het wordt door de huid der schede, en die der algemeenen bekleedselen gevormd.

Het nut van dit vlies is nog niet algemeen bekend: groote Ontleedkundigen hebben gedacht, dat het maagdenvlies eene zedelijke nuttigheid voor den mensch hadde, om dat het bij denzelven alleen gevonden wordt: wanneer het door den bijlaap verbroken is, gaat het van langzaamerhand, door het wrijven verloren.

De bilnaad is de scheiding, welke tusschen de schaamheid en den endeldarm plaats heeft: aan deeze scheiding zijn de groote lippen vorkswijze gehecht: het einde der groote lippen wordt vereenigd door eene dunne huidplooï, welke dwars ligt, en toomtjen genaamd wordt; de holte achter dit toomtjen draagt den naam van schuitswijze holte.

De inwendige zachte vrouwlijke teeldeelen liggen geheel in de holte van het bekken, en zijn van buiten niet te zien.

Het eerste is de schede; dit is de vliezige koker naar de baarmoeder, begint van de kleene lippen, gaat krom, onder den schaamboog, tusschen de pisblaas en den endeldarm, naar boven, tot den mond van de baarmoeder.

De buitenste monding wordt ingang der schede genoemd: het boven einde is boven den moedermond, door celwijnswceffel aan den hals der baarmoeder gehecht. (*)

Bij volwasfene maagden is de schede in haare natuurlijke gedaante zes duimen lang; bij vrijsters is dezelve zoo naauw dat men niet in staat is, om, zonder pijn aan te doen, eenen vinger door dezelve intebrenghen.

de kleppen welken vóór de slijmholte geplaatst zijn, en tot eene soort van vleesch verhard zijn: *Gron'tris der Physiologie, seite. 645. § 372.* BLUMENBACH zegt: „Door het overblijfsel van het verbroken maagdenvlies ontstaan de mijtscheuvels, tjens, onbepaald in hun getal.” *Anfangs grunde der Physiologie seite 319. § 533.*

(*) Het achterste vlak vereenigt zig hooger op den hals der baarmoeder: deeze vereeniging maakt met den gezegden hals eenen stompen hoek.

De ingang der schede is altoos nauwer dan de middenlijn van haare overige wijdte, om dat dezelve een sluitspier heeft.

De binnenste vlakke der schede is van vooren tot achter met dwarsplooijen bezet, de eene naast de andere, en welken haar in eene voorste en achterste vlakke deelen, dewijl door de samenkomst van de voorste plooijen met de achtersten, ter rechter en linker zijde, een streep, even als eene naad, gevormd wordt.

De schede bestaat uit drie vliezen, waarvan het binnenste de zoo genoemde is: het middenste bestaat uit vleeschvezelen: het buitenste uit het celwijs weeffel van het darmvlies, waardoor de schede met den endeldarm, de pisblaas, met de schaambeenderen, en andere, daar naast gelegene, deelen, vereenigd is.

De schede is dienstig tot den bijslaap.

De klieren, in de geplooidde huid, schelden, in de verlosning een slijmerig vocht af, en in dien tijd verwijdt de schede zig ter breedte van het kinderhoofd; dit verwijden der schede geschiedt zonder verscheuring, uit hoofde van de dwarsplooijen.

De baarmoeder is dat holle vleezige lichaam, dat in het bovenste gedeelte van het bekken-hol, tusschen den endeldarm en de pisblaas, gevonden wordt, en is noodzakelijk tot de bevruchting, de onderhouding en de geboorte des kinds.

De gedaante der baarmoeder gelijkt aan een peer die samengedrukt is; de ronde punt gaat achterwaarts in het hol der schede; alwaar dezelve door een celwijs weeffel vereenigd is. De baarmoeder wordt in drie deelen verdeeld; in bodem, 't welk het bovenste en breedste gedeelte is, aan de openingen der trompetten; in ligchaam, zijnde het middenste gedeelte tusschen den bodem, en den hals; en in den hals; deeze is dat gedeelte, 't welk door de schede omvat wordt; welks onderste dwarse spleet de baarmoedersmond genoemd wordt, en het onderste in de schede liggende gedeelte uitmaakt: het wordt in eene rechter- en linker-zijde, in eene voorste en achterste vlakke verdeeld.

De baarmoedersmond heeft, bij maagden, zulk eene gedaante, als bij mannen de glans heeft; doch deeze spleet is dwars, en maakt twee lippen, eene voorste, en eene achterste; de voorste is langer dan de achterste.

De baarmoeder is een hard, sponsachtig ligchaam, met veele bloedvaten, zenuwen en sterke vleeschvezelen doorgvlochten: de bodem is dikker dan het middengedeelte en dan de hals; wordt van buiten door het buikvlies bekleed: het hol derzelve is bekleed met een zenuwachtig vlies, dat met de opperhuid bedekt is, dat deeze holte glad maakt, en, aan den hals, eenige plooijen vormt.

Het hol der baarmoeder is bij maagden zoo klein, dat hetzelve, naauwlijks, een' amandel kan bevatten.

De hals der baarmoeder is bij maagden zoo naauw dat men met moeite een penneschacht door denzelven kan heenbrengen.

Het hol der baarmoeder heeft drie openingen; de eene is de mond, de twee anderen zijn ter zijden aan den bodem: deeze laatsten maaken het begin der trompetten, en laten naauwlijks een varkensborstel door; aan het einde zijn zij wijder.

De Falloppiaansche trompetten zijn twee vliezige buizen, welken aan de zijdelijke openingen der baarmoeder beginnen, en in het zijdelijke gedeelte van het bekken geplaatst zijn, wordende ingesloten door de breede banden.

Met de kleinste opening, openen zij zig in het hol der baarmoeder, en met het grootste en dikste gedeelte zijn zij tegen de eiërnesten omgekruld, in wier nabijheid zij liggen; deeze einden zijn vleezige gekartelde franjen, om de eiërnesten te omvatten, als dezelve zig ophigten.

De eiërnesten zijn twee witte; eironde, plat gedrukte ligchaamen, liggen in het bekkenhol, ter zijde van de baarmoeder, omkleed door de breede banden, bestaan uit een vast celswijs weeffel, waarin kleene rondachtige doorschijnende blaasjens liggen, die eiëren genoemd worden: deeze eiëren zijn onder het buitenste vlies van het eiërnest gelegen, en schijnen uit de zelfstandigheid der buitenste vlakke van het eiërnest te ontstaan; bij huwbaare maagden puijen zij

uit: het getal deezer blaasjens is ongelijk, somtijds zijn er vijfien in een eiërnest: zij besluiten in zig een wit vocht, en het ei van den toekomenden mensch.

De *Corporæ lutea* zijn kleene geele korrels, welken, na de ontvanging, in de eiërnesten gevonden worden.

Bij deeze tot hiertoe beschrevene deelen, heeft de baarmoeder nog vier banden, twee breede naamlijk, en twee ronde.

De breede banden zijn de zijdelingsche ploojen van het buikvlies, 't welk de baarmoeder bekleedt; zij liggen slap en vrij in de holte van het bekken, en omkleeden de trompetten, de eiërnesten, en de ronde banden.

Deeze zoogenaamde ronde banden zijn veelëer vaatachtige koorden, welken naast de trompetten, zijdelings van den bodem der baarmoeder, beginnen, en, omkleed van de breede banden, boven den rand van het schaambeen, door den buikring, tot aan den venusberg, in de groote lippen eindigen.

De slagaders der baarmoeder en der andere zachte deelen, ontstaan uit den zaadslagader, en de takken van den onderbuiksflagader en van den speenflagader. De bloedaderen zijn insgelijks takken van den zaad-onderbuiks- en speen bloed-ader, en hebben geene klapvliezen: de lendenzenuwen, de heiligbeenszenuw, en eenige takken van den grooten tusschenribbigen zenuw, zijn de hoofdzenuwen welken door de baarmoeder en de naastbij gelegene deelen heen gaan.

De nuttigheid van de baarmoeder bestaat in de maandzuivering, de ontvanging, en de geboorte te verrichten.

Ontleedkundige beschouwing der deelen in eene zwangere baarmoeder gevonden wordende.

De inwendige deelen van eene bezwangerde baarmoeder, zijn de vliezen welken het kind omgeeven, de moederkoek, de navelstreng, het lamsvocht, en het kind zelf.

Het vliezige ei.

Het kind in de baarmoeder is omgeven van water en drie vliezen, zoodanig dat het, als 't ware, in een met water gevuld groot ei ligt: dat ei heeft de grootte van het hol der baarmoeder, aan welks binnenste vlakke het, door middel van vaten en een bijzonder celwijs weeffel, vast gehecht is.

Dit ei bestaat uit drie vliezen, waarvan het buitenste het draadachtige is; het tweede is het vaatachtige, en het binnenste wordt het lamsvlies genaamd.

Het draadachtige vlies is een fijn celwijs weeffel, hetwelk vol is van de fijnste vaten: het omkleedt de geheele buitenste vlakke van 't vaatvlies, en hecht het ei aan de holte der baarmoeder: in de twee eerste maanden der zwangerheid is het geheel draadachtig, in de derde maand begint het zig te verliezen, zoo dat men, in het laatste der zwangerheid, zoude gelooven, dat het de binnenste vlakke der baarmoeder ware, om dat het aan dezelve vastgehecht is.

Het tweede vlies, waarmede het ei omkleed wordt, is het vaatvlies; dit vlies is vast, sterk en vaatrijk; het bekleedt, even als het daaronder liggend lamsvlies, den moederkoek.

Het binnenste of derde vlies, draagt den naam van lamsvlies; het is fijner en doorschijnender dan het vaatvlies, waarmede het los vereenigd is: het binnenste vlak van dit vlies is glad, glansachtig, en zilverkleurig; 't heeft vaten welken nauwlijks gezien worden, en uit welken gestadig kleene droppels van een helder vocht uitzweet, wanneer men het vlies met den vinger drukt.

Dus wordt het ei, door middel van de draadachtige zelfstandigheid, en van het draadachtig vlies aan de baarmoeder vastgehecht; van binnen groeit het vaatvlies met het lamsvlies aan den moederkoek.

Dit lamsvlies wordt onmiddellijk door het lamsvocht omgeven, en het nut deezer vliezen bestaat in 't volgende: 1) zij omsluiten het lamsvocht, zoo dat hetzelfde
noch

noch door den mond der baarmoeder, noch door de openingen der trompetten kan heen dringen: 2) zij vereenigen den koek met de baarmoeder: 3) zij maaken het buitenste vlies van den navelstreng uit: 4) zij vormen bij de geboorte eene blaas, welke, als een wig, den mond der baarmoeder verwijdt: 5) zij beschermen, bij eene doode vrucht, voor den indrang der lucht; daar anders die vrucht, door den toegang der buitenlucht, ligtlijk in verrotting zoude overgaan: 6) het vaatvlies heeft veele en duidelijke bloedvaten, welken in het lamsvlies zoo duidelijk niet gezien worden, maar echter 't hunne schijnen bijtedraagen, tot de afscheiding van het lamsvocht. (*)

Het ei, 't welk bij de ontvanging uit het eiernest losgaat, en door de trompetten in de baarmoeder gebragt wordt, schijnt de oorsprong van deeze drie vliezen te weezen (§), omdat ieder ei, in het eiernest, uit drie vliezen bestaat,

De moederkoek.

Het tweede deel, 't welk tot het kind behoort, is de zoogenoemde moederkoek: deeze verbeeldt een sponsachtigen koek, die meestal eene ronde gedaante heeft een half voet breed, en een duim dik is.

Hij wordt verdeeld in den rand, zijnde de buitenste dunne omtrek, en in ligchaam, 't welk het middenste dikke gedeelte is — ten aanzien der ligging kan men aan den moederkoek eene bovenste en onderste vlakke beschouwen, als hij naamlijk aan den bodem van de

(*) Deeze vliezen zijn zeer naauwkeurig met elkander vereenigd, zoodanig echter dat zij gescheiden kunnen worden: als het lamsvocht weinig is, blijft somtijds in de geboorte, iet van het lamsvlies op het hoofd van 't kind hangen, de vroedvrouwen noemen dit wel eens het moederhemd, of een helm, en het bijgeloof voorspelt het kind hieruit veel geluks.

(§) Het eerste of afvallige vlies van HUNTER, bekleedt alleenlijk de baarmoeder, en wordt niet in de Falloppiaansche buizen, noch in den hals der baarmoeder gevonden: zie BLUMENBACH *Physiologi Seite 340 § 570*: dit vlies ontstaat daardoor, dat de door de bijslaaping heet gewordene en bezwangerde baarmoeder, de strembare wei van het bloed uitwasemt, waardoor dit vlies gevormd wordt; gelijk, in de longontstekking, de long met het borstvlies samengroejen.

baarmoeder hangt: het bovenste vlak is oneffen, in verscheidene lappen gedeeld, en door middel van het draadachtig vlies, aan den grond der baarmoeder gehecht. Het onderste vlak van den moederkoek is glad, en met de twee vliezen van het ei overtrokken; onder deezen zijn de groote takken der bloedaderen, en het begin van den navelstreng is, op deeze vlakke, duidelijk te zien: wanneer alles natuurlijk is, is de koek, meestal, aan den bodem van de holligheid der baarmoeder gehecht; ook kan dezelve zig, tegennatuurlijk, aan den geheelen omtrek dier holligheid vasthechten.

Deeze aanhechting wordt gemaakt door een sterk celwijsweeffel, 't welk deels de bovenste vlakke, deels den rand van den koek, als een stevige band, omvat; ook wordt dezelve ondersteund, door het in 't ei zig bevindend vocht, het welk hem als 't ware draagt. (*)

De eigenschap van den moederkoek bestaat uit vliezige cellen, en veele vaten zonder zenuwen: het saamenstel der vaten van den moederkoek is tweeledig; het eene is van de moeder en het andere van de vrucht gevormd: intusschen moet men aanmerken, dat deeze twee saamenstellen zig niet met elkander vereenigen; want beiden zuigen zij het bloed uit de cellen. (†)

Het bovenste vlak van den moederkoek, 't welk zig

(*) De vrucht, welke nog veel zwaarder is, drijft in het zelve, gedurende de eerste maanden.

(†) De einden der navel-pols- en bloed-aderen vormen, op de vliezige plaat, een net van vaten, waarvan de zijtakken het bloed in de cellen afzonderen; ook gaan de kleenen slag- en bloed-aderen der baarmoeder tot deeze cellen van den moederkoek, en vormen aan de vliezige platen deezer blaasjens een net, welks kleinste einden het bloed in de cellen afscheiden: naauwkeurige inspuitingen hebben bewezen, dat er in den moederkoek wel een overgang van bloed uit den navel-slagader in den navel-bloedader, en zoo ook een overgang van bloed uit de slagaderen der baarmoeder in de bloedaderen van dezelve geschiedt; maar nooit heeft men door inspuitingen de gemeenschap van het saamenstel der navelvaten met die der baarmoeder kunnen ontdekken: het blijkt dus dat de slagaderen welken van de baarmoeder, als ook die welken van de vrucht in den moederkoek gaan, een gedeelte van hun bloed in de cellen des moederkoeks afzonderen; en hieruit blijkt dat de einden der navel-bloedaderen, als ook de einden der slagaderen van de baarmoeder, even als de wortel van eene in het water staande plant, het afgezonderd bloed opzuigen en verder brengen: de afzondering des bloeds, en het opzuigen van het zelve in de bloedaderen, geschiedt hier even als in de sponswijze ligchaamen des maalkijven lids, bij het slijt worden van 't zelve: deeze naauwkeurige ontleding vanden moederkoek zijn wij verschuldigd aan den beroemden Engelschen Ontleeder, DR. HUNTER.

in het hol van den bodem vasthecht, is verdeeld in klee-
ne, ronde, sponsachtige stukken, gelijkende naar de bast-
achtige zelfstandigheid van de hersenen (*): de onderste
vlakten van den koek is met de twee vliezen van het ei glad
overtrokken: ik heb, over het algemeen, reeds doen aan-
merken, dat de moederkoek niet tusfchen het vaatvlies
en het lamsvlies geplaatst is; maar aan zijne onderste
vlakte van dezelve overtrokken wordt: de moeder-
koek is dienftig om den omloop des bloeds en der vocht-
ten, tusfchen moeder en kind, te onderhouden: deszelfs
maakfel is ingericht, om den soms zoo hevige omloop
des bloeds van de moeder tot het kind te bepaalen (†);
misfchien ook om het bloed van 't kind te bereiden.

De navelstreng.

Het derde deel eener vrucht is de navelstreng, of de
darmswijze koord, welke tusfchen de navel der vrucht
en den moederkoek geplaatst is: deeze navelstreng is veelal
gelijk aan de lengte van het kind, dat is, één en een
half voet lang, en meestal een duim dik; zijn begin
is in het midden van den moederkoek.

Deeze koord wordt famengefteld, uit één bloed- en
twee slag-aderen, welken door een loos celwijsweeffel ver-
eenigd, en van buiten met eene vaste huid omkleed zijn.

Die huid, welke den koord omgeeft, is een verlengfel van
het lamsvlies, hetwelk zig omtrent den moederkoek aan
dezelve begeeft: dit lamsvlies omkleedt den navelstreng,
en 'de binnenfte cellen zijn met een zultig vocht aange-
vuld, hetwelk 't Warhonifche zult genoemd wordt (§).

(*) Aan deeze oneffenheden kan men, in de baarmoeder voelen waar de koek
gezetten heeft.

(†) Daarom heeft de Natuur tusfchen het famenftel der vaten van de moeder en
die van de vrucht geene gemeenfchap gemaakt, hetwelk bewezen wordt door het
infpuiten van verfchillende kleuren in den moederkoek.

(§) Van dit zultige vocht hangt de dikte en fterkte des navelstrengs af. De
dunne navelstrengen zijn taajer en fterker; de dikkeren zijn zwakker, en fcheuren
ligelijk af; doch door de zultige dikke navelstrengen worden de navelvaten bewaard
voor famendrukkingen; bij voorbeeld, als de navelstreng zig tusfchen een gedeelte
van de vrucht geplaatst had.

Omtrent een duim 'ver van de navel der vrucht, wordt; door de huid van den onderbuik, eene plooi gevormd.

De navel-bloedader begint in den koek, uit duizenden van kleene takken van bloedvaten, welken voor en naa grooter worden, en op het onderste vlak des moederkoeks eenige groote bloedader-takken vormen: alle deeze takken vereenigen zig in eenen, wiens middelijn tweemaal grooter is dan een der navel-slagaderen: deeze navel-bloedader doortroomt de geheele langte van den navelstreng; gaat door de navel in den buik van het kind, op het buikvlies, in eene bijzondere celwijze schede befloten, naar de lever, alwaar dezelve zig in twee takken verdeelt, de eene daarvan gaat in den poortader, de andere naar den holle ader (*): door

(*) De navel-bloedader, welke zijn begin van den moederkoek neemt, gaat door den navelring der vrucht heen, is in de lever ingemond, en brengt het bloed in den poortader, vanwaar het zelve dan deels door de takken van den bloedader in de lever verdeeld, deels door eenen bijzonderen tak (*ductus venosus arantii*) in den opklimmenden holle- ader overgebragt wordt; alle twee kanaalen, naamlijk, het terug gebleven einde van den navel-bloedader, als ook de bijzondere bloedaderlijke tak, in den buik des kinds, worden, na dat de navelstreng afgescheiden is, gesloten, en de navel-bloedader verandert in den ronden leverband: zie de plaat van EUSTACHIUS, pl. 10 fig. 2 — k.

Dit bloed, hetwelk door den opklimmenden holle ader in de rechter holligheid van het hart gaat, moet, daar de longen van het ongeboren kind het zelve niet doorlaaten, eenen anderen weg neemen, en wordt alzoo door middel van de klappen van EUSTACHIUS, *Tabula Osta. fig. 6 — a.* en het eironde gat, in het linker oor van het hart gebragt.

Want voor de opening van den opklimmenden holle ader is, bij ongeboren kinderen, een halvemaanswigs klapvlies geplaatst, *Eustachisch Klapvlies* geheten: dit vergaat bij toeneemende jaaren, maar bij ongeborene kinderen, dient het, om 't bloed, uit het onderlijf terug vloeijende, te geleiden naar het eironde gat, het welk in het vliezig middenschot der twee boezems gevonden wordt: zie EUSTACHIUS pl. 16 fig. 6.

Door dit eironde gat wordt het bloed, uit den opklimmenden holle ader terug gevoerd wordende, bij ieder uitzetting der ooren van het hart in het linker oor geleid; maar dat het bloed, bij de daarop volgende samentrekking der gezegde ooren van 't hart, niet weder terug gaat, wordt door een eivormig klapvlies belet; met dit klapvlies vergroeit, bij toeneemende jaaren, het eironde gat, en het Eustachiaansch klapvlies gaar geheel verloren — De Hoogleeraar BONN, toonde het eironde gat nog open, in een jongeling van 20 jaaren, op het *Anatomisch theater* hier ter stede, in het jaar 1793.

Van het bloed, door den holle ader, in den rechter boezem van 't hart gebragt, kan waar een klein gedeelte in de longen opgenomen worden; en alzoo gaat de grootste massa van het zelve, door de buis van BOTULUS, 't welk een vergingfel van den long-slagader is, (deeze buis is tuschen den long-slagader en den grooten slagader geplaatst,) de longen voorbij, en onmiddelijk in den grooten slagader: gezegde buis vergaat bij eerstgeborene kinderen, naa eenigen wecken, en wordt een band.

deezen bloedader wordt het kind het leven, het bloed, en de voeding aangebragt, uit den moederkoek: al het bloed dat tot de voeding van de vrucht overtollig is, wordt uit denzelven door den navelader, in den moederkoek, op de volgende wijze, teruggebragt.

In 't bekken van het kind begint uit den onderbuiksflagader, aan iedere zijde, een slagader, welke naast de pisblaas, tusfchen het buikvlies en de fpieren, naar de navel van het kind gaan, en van daar naar den navelstreng, in de geheele langte, naar den moederkoek, waarin dezelve zig dan, gelijk de navelader, in duizenden van kleene takken verdeelt, en met de uiterfte einden van den navelader famenftooten: hierdoor wordt een gefladige omloop van bloed uit de moeder naar het kind, en uit het kind naar de moeder daargesteld.

De pizak (*Eustach. tab. 14 fig. 10 — g*) of het worstvlies genaamd, wordt alleenlijk bij dieren, en niet bij menschlijke vruchtjens gevonden: maar het pisvat (*urachus*) hetwelk uit den bodem der blaas begint, is ook bij menschlijke vruchten (*).

Het nut van den navelstreng is, om den omloop des bloeds, tusfchen de vrucht en den moederkoek, te onderhouden (†).

Een groot gedeelte van deezen, in den grooten slagader geleide massa van bloed, moet weder naar den moederkoek terug gebragt worden: dat terugvloejen gefchiedt door de navelstrengs-slagaders, welke aan beide zijden van den blaasband, door de navelring heen gaan, en zig ook naar de geboorte fluiten: *BLUMENBACH, Anfangs grunde der Physiologie Seite 373: § 616 - 627.*

(*) Hier staat aantemerkten, dat dezelve zig bij menschlijke vruchten niet zoo als bij dieren in den navelstreng opent: deeze *urachus* begint van het bovenfte einde der pisblaas, is, aan de blaas, hol doch gefloten, drie of vier vingers breed naar boven, bevoorens zij uit de buikshalligheid komt, en alzo meer als een band der blaas te befchouwen: zeer zelden is het dat deeze buis tot in den navelstreng, bij menschlijke vruchten open blijft: in dit geval ontlast zig de pis door de navel:

(†) In den navelstreng ftingeren de slagaderen zig op verfcheidene wijzen om den navelader: dit omftingeren heeft meest plaats naar de vrucht heen: fomtijds zijn de vaten hier en daar knobbelachtig uitgezeet: eenvoudige lieden geloven door deeze knobbels het getal der kinderen te kunnen bepalen, welken een vrouw nog zal baaren.

Het lamsvocht.

Het eivormig hol van de te vooren beschrevene vliezen, is met een kleverig, wit, doorschijnend vocht opgevuld, heeft het wezen en den kleur van melkhui.

Dit vocht nu wordt het lamsvocht geheten: ik geloof dat het zelve uitwaasemt uit de uiteinden der slagaderen, welken aan de onderste vlakte van den moederkoek gevonden worden: (*) in het begin der zwangerheid is dit vocht meerder, in vergelijking van de vrucht; in het midden derzelve is het meestal gelijk met de zwaarte van het kind, en op 't laatste bedraagt het omtrent twee pond, daar het kind dan wel zeven ponden zwaarte heeft; somtijds is het meerder, somtijds minder: het is zonder reuk, heeft meer of min eenen zoutachtigen smaak, en zakt, onder water gemengd, op den grond: het meeste gedeelte van dit vocht is gelijkachtig: naa de overhaling blijft er een vast zout en aarde over.

In dit vocht ligt de vrucht, staande de geheele zwangerheid, tot aan de geboorte toe.

Het nut van hetzelfde is 1) dat het kind daardoor gevoed wordt: daar dit vocht gelijk is aan gelij, en in de maag nedergeslikt gevonden wordt, zoo is het niet meer te betwijfelen dat het de vrucht tot voedsel dient (†); 2) om alle geweld, hetwelk op de baarmoeder aangebragt wordt, van het kind aftekeeren; 3) ter verhoedinge der gevaaren welke de baarmoeder zoude ondergaan,

(*) De oorsprong van dit vocht is nog niet bekend: dat het zelve noch van de vrucht, noch van den navelstreng ontstaat, blijkt daaruit, dat het ook in het onbevruchte ei gevonden wordt: *BLUMENBACH Physiologie* seite 344 § 574.

(†) Daar de schrijver zoo even gemeld heeft, dat dit vocht in eene tegesfelde maate en zwaarte met het kind staat, valt dit weg: het hoofdnut van hetzelfde is om de tedere gelijkachtige vrucht te beschermen; want de kleine hoeveelheid, welke somtijds, (echter zoo zeldzaam dat men dit als tegennatuurlijk beschouwt,) in de maagen van ongeborene kinderen gevonden wordt, kan onmogelijk tot onderhoud vestrekken, dewijl men gezien heeft, dat het samenstel der melkvaten nog niet ontwikkeld en nog onbeduidend is; dat er nog geene bereiding van den chijl kan plaats hebben: het voorbeeld van kinderen die zonder hoofd geboren worden, is een bewijs daar van: *BLUMENBACH, loc. cit. seite 344 en 345 § 574.*

door het bewegen van het kind; 4) om de baarmoeder gelijkmatig uittezetten; 5) om de vrucht eene vrije beweging te geven; 6) om den moederkoek te ondersteunen; 7) om de waterblaas voor de geboorte te vormen, den weg tot de geboorte te bevochtigen, en de ongelijke vlakke des kinds met eenen gelijkmatigen aandrang uit de baarmoeder te helpen drukken.

De vrucht.

Daar wij nu de deelen betrekkelijk de vrucht beschouwd hebben, is het noodig, nog van de vrucht zelve, ten aanzien van den staat des ligchaams, en haare natuurlijke ligging te spreken.

Wat den staat des ligchaams aangaat, zoo vertoont het bevruchte ei zig, eenige dagen naa de bevruchting, onder de gedaante van een draadachtig ligchaam, hetwelk aan den bodem der baarmoeder ligt, in een klaar vocht drijft, en niet voor den zeventienden dag gezien kan worden; het schijnt een gelijkmatig rond ligchaam te zijn, welks waare grootte niet bepaald kan worden, en in de derde maand naauwlijks 3 duimen bedraagt: naa afloop der zwangerheid bedraagt de grootte des kinds in 't geheel 18 à 19 duimen, Parijsche maat, en is 6 à 7 ponden zwaar.

Betreffende de ligging, zoo heeft de vrucht in de eerste maanden der zwangerheid eene stelling als of dezelve uitwerping van drekstoffe wilde maaken; dat is, 't hoofd is naar boven gekeerd tegen den bodem der baarmoeder, en de billen zijn naar onder tegen den baarmoedermond; het aangezicht is tegen den buik der moeder gekeerd; de knieën zijn tegen het ligchaam opgetrokken; de handen zijn aan de oogen, en de elleboogen op de knieën; somtijds hangen de armen langs het ligchaam.

Hoe meer de vrucht in wasdom toeneemt, hoe zwaarder het hoofd wordt, en daarom zakt hetzelfde, door zijne eigene zwaarte, (*) naar vooren tegen den buik der

(*) Al is het hoofd, in vergelijkinge der andere deelen van het ligchaam in 't begin der zwangerheid opgeheven, begint het tog te zakken, als het vaster en zwaarder wordt.

moeder, en, van dag-tot dag meer, naar onderen tegen de schaambeenderen.

Deeze zakking is geheel volbragt, als het kindshoofd met den kruin op den hals der baarmoeder staat, met het aangezicht en den buik naar het heiligbeen, met den rug en het achterhoofd naar den buik en 't schaambeen gekeerd is: dit is de natuurlijke ligging des kinds — men gelooft in 't algemeen, dat deeze zakking tegen de 7^{de} 8^{ste} of 9^{de} maand, en ook wel in 't geheel niet, geschiedt.

Als deeze laatste zakking op den baarmoedersmond plaats heeft, is zij veelal vergezeld van eenige kleene weeën, en de beweging van het kind wordt sterker: uit dit verschijnsel ontstaat, bij veele vrouwen, 't geloof dat het kind zig gekeerd heeft.

Is er nu 't een of ander dat het keeren verhindert, dan wordt daaruit de niet natuurlijke ligging des kinds geboren, en hetzelfde komt alzoo in de geboorte niet met het hoofd voor.

Bij deeze ligging heeft de Voorzienigheid het geheele ligchaam, bijzonder het hoofd der vrucht, zeer voordeelig tot de geboorte voorbereid: in de ligging tot de verlossing verbeeldt het hoofd een half ronde bol, wiens bodem boven aan den hals van het kind is, en de ronde kruin naar onderen gekeerd,

De afstand van deeze half ronde bol van het eene slaapbeen tot het andere, bedraagt $3\frac{1}{4}$ duim, en die van het voorhoofd tot het achterhoofd, bij een welgevormd kind, 4 duim.

De langste middenlijn van het hoofd is de omtrek des aangezichts, en die van de onderkaak tot aan de kruin, en bedraagt $5\frac{1}{2}$ duim.

De zelfde afstand vindt men aan den ingang van het bekkenhol, op dat het hoofd zonder nadeel door deezen weg heen geperst kan worden: alzoo heeft de maker van dit kunstig gebouw der Natuur, die vier beenderen, welken het bovenste deel van 't bekkenneel vormen, met sterke doch buigzaame vliezen vereenigd, en hierdoor kan het eene wandbeen zig over het andere heen schuiven; het voorhoofdsbeen, ('t welk uit twee deelen be-

staat,) kan niet alleenlijk overëenschuiven, maar ook door middel van de zijdelijke fontenellen, over den voorrand der wandbeenderen; het achterhoofd kan ook naar vooren gaan, en over de achterranden der wandbeenderen gedrukt en geschoven worden; door dat overëenschuiven der bekkeneelsbeenderen, wordt de waare breedte van het hoofd, omtrent een duim, smaller.

De geheele oppervlakte des ligchaams is met een vettig smeer bekleed: deeze vettigheid is niet het manlijke zaad, 't welk zig onder de zwangerheid aan het kind zoude aanzetten, zoo als eenige Vroedvrouwen leeren; 't is ook niet het kaasachtige van 't lamsvocht, 't welk zig uit dit vocht aan de vrucht zoude zetten; maar 't is het natuurlijke vetachtige vocht der huidklieren, 't welk uit de huidklieren der vrucht wordt afgescheiden; dat zig door zijn eigenaartig vet niet met het lamsvocht kan vereenigen, en maakt het ligchaam der vrucht, hetwelk reeds buigbaar is, glibberig en tot den doorgang geschikt: mischien is ook het grootste nut daarin gelegen, dat het de vrucht in de 9 maanden dragts, voor het bederf bewaart.

Beschouwing der ontvanging.

T is waarschijnlijk dat in de blaasjens der eirnesten, van eene huwbaare maagd, al vóór de bevruchting van het rijpe ei, het vliezige ei met het kind, met den navelfstreng en den moederkoek, tegenwoordig zijn, en dat de zaadlucht, of het geestige van het zaad, alleenlijk door de bijslaaping van den man in de baarmoeder-trompetten, in het blaasjen van 't eirnest, en in het ei zelf, 't welk in het eirnest geplaatst is, indringt, en alzoo het hart van den toekomstenden mensch doet leeven: daar nu dit blaasjen van het eirnest door het nu leevende en opzwellende ei openbarst, wordt het ei door de franjen der trompetten omvat, en door de wormswijze spier-beweging dier vliezige buis, in de baarmoeder zelve overgebracht: de baarmoedersmond wordt door de prikkeling van het ei,

door middel der ploojen en ronde vleeschvezelen, vast toegesloten; de binnenste opening wordt door de taaje slijm der klieren, in den hals der baarmoeder, nog meer toegekleefd, en zoo is de ontvanging van den toekomstenden mensch volbragt. (*)

De kleene plaats in het eiernest, na dat het blaasjen zig afgescheurd heeft, vergroeit, naa de ontvanging, in een kleen wratachtig heuveltjen, 't welk in den beginne vliezig is, maar vervolgens vaster wordt en langen tijd een lidteken overlaat: dit heuveltjen wordt het geele ligchaam genoemd, en is altoos gelijk in getal met het getal der gedragene kinderen.

Als nu op deeze wijze de bevruchting geschied is, zoo zweemt, in de eerste dagen, het bovenste ei in 't vocht der baarmoders-holte.

Van de ontwikkeling der vrucht in 's moeders ligchaam.

Na dat het nu levende ei uit het blaasjen van het eiernest in het hol der baarmoeder is overgebracht, zoo dringen de door de prikkeling toevloeyende vochten, door de poriën van het ei in, zetten het zelve uit, en maaken het na eenige dagen na de bevruchting draadig, zoo dat het als dan voller en grooter wordt:

Is het ei zoo groot, als het hol der baarmoeder, zoo hecht het zig door middel der draaden, aan de binnenste vlakte der baarmoders-holte, en op deeze wijs geschiedt de gemeenschap tusschen de vaten der baarmoeder en het ei; zoodra de ontvanging geschied is, begint ook het, door de prikkeling des manlijken zaads, in beweging gebragte hart der vrucht, het vocht van

(*) Als de vrouw den man keeft toegelaten, en alle twee van de hevigste aller dierlijke drijven doordrongen zijn, wordt de baarmoeder in een onteekingachtige werking gebragt, neemt door middel van haare eigene levenskracht het uitgespoten manlijke zaad op, en geeft te gelijk een eigen vocht; de trompetten der baarmoeder worden slijf, en leggen haare franjen aan de eiernesten; uit één der twee eiernesten barst een Graafisch blaasjen, als eene rijpe zweer open, en liet daarin zijde eiwitachtige vecht wordt door de franjen der baarmoeder-trompetten opgenomen, en in de baarmoeder overgebracht: BLUMENBACH, *Anfangsgründe der Physiologi. Seite 338 § 567.*

den grooten slagader, en in alle overige slag- en bloedaderen te beweegen, waardoor dus de, in het begin der ontvanginge van het kind, eerste omloop der vochten voort gaat.

De voeding des kinds geschiedt in de eerste dagen, door het opzuigen des waterachtigen vochts, 't welk dan in de baarmoeder is, en vervolgens door den toevoer van bloed door den navelader: ook is het waarschijnlijk, dat een deel des moederlijken chijs, met het bloed, naar den moederkoek gebragt wordt, en dan naar het kind.

Wegens den waschdom der vrucht in 's moeders ligchaam, moet men in aanmerking neemen, dat naar de wetten der zwaarte zig dat gedeelte van het ei aan den baarmoedersmond hecht, waar hetzelve zig van het eiërnest heeft los getrokken.

En in dit punt, waar zig de losgetrokkene opening van het ei aan den bodem der baarmoeder hecht, begint gevolgljik de moederkoek.

Aan die zijde des moederkoeks, die naar het kind gekeerd is, begint uit de vaten deezer zelfstandigheid de navelstreng.

Dus gaat uit de vaten der baarmoeder het bloed in den moederkoek; en vandaar door de naveladeren, tot de vrucht: en zoo wordt de vrucht door den navelstreng gestadig gevoed, vergroot en uitgezet: dit zelfde geschiedt ook in den moederkoek, in de vliezen des kinds, en in de baarmoeder zelve, door de bloedvaten deezer deelen.

Door de twee navelslagaderen wordt het overtollige en tot voeding der vrucht onnutte bloed, uit de vrucht in den moederkoek, en uit deezen in de baarmoeder terug gevoerd.

Dit is het beloop van den wasdom der vrucht, en derzelve leven, in 's moeders ligchaam.

Ontleedkundige beschouwing der zwangere baarmoeder.

Eene bezwangerde baarmoeder verschilt met eene onbezwangerde, in haar figuur, ligging, vastheid, grootte, en voornaamlijk in de gedaante van den moedermond: beschouwt men de geheele zwangere baarmoeder, in de laatste maand der zwangerheid, zoo ziet men aan dezelve, dat haar figuur eivormig is, en zig als eene opgevulde blaas voor het gezicht opdoet: haare grootte strekt zig in den omtrek van de bovenste opening van het bekken, welk het onderste gedeelte der baarmoeder ondersteunt, tot over de navel, omtrent tot aan de hartkuil, uit.

De zwangere baarmoeder kan men voegelijk in drie gelijke deelen verdeelen, waarvan het bovenste den bodem, het middenste het ligchaam, en het onderste den hals uitmaakt.

De dikte is, aan het bovenste deel, bijzonder daar de aanhechting van den moederkoek is, aan de binnenste vlakke des bodems, het sterkste; de hals is meer uitgezet, en het overige deel der baarmoeder zet zig uit zonder verandering haarer dikte.

De verandering der grootte is merkwaardig: die holte, welke vóór de zwangerheid pas eene amandel konde bevatten, krijgt nu eene ruimte om 9 a 10 pond te besluiten: de baarmoedersmond, en bijzonder bij de eerste zwangerheid, ondergaat veel verandering; want derzelver dwarsfe spleet gaat over tot een ronde kuil, de hardheid verandert in eene sponsachtige zachtheid, en de kegelswijze gedaante wordt rond; tegen den laatsten tijd der eerste zwangerheid, vindt men den hals der baarmoeder in eenen vliezigen dunnen zak veranderd.

De bijzondere ligging der zwangere baarmoeder is, naar vooren toe, over de beenderen van het bekken, eenigzins schuin, in diervoegen dat de as van den bodem der baarmoeder vlak boven het midden der bovenste opening van het bekken rust: hiervan daan voelt men den bodem der baarmoeder, van buiten in den omtrek der na-

vel, en de baarmoedersmond ligt vlak boven de as der bovenste opening van het bekken.

Men ziet dus uit deeze as, waartoe de vóórberg des heiligen beens dient.

In deeze plaatfing wordt de zwangere baarmoeder van boven door het buikvlies gehouden, het welk als 't ware eene fchede over de baarmoeder vormt; het onderfte deel derzelve wordt door de bovenste opening des bekkens ondersteund: voor het overige maaken, van vooren en ter zijde, de breedte vleugels der darmbeenderen en van vooren de wanden der buikspieren, van achteren de lendenwervel, de meeste onderftenning en houding deezer ligging.

De zelfftandigheid der baarmoeder wordt in de zwangerheid niet dunner, maar zachter, en wordt tegelijk door den toevloed der vochten, sponsachtig: deeze vaten zijn in grooter getal dan men met het bloote oog zien kan.

Alle vaten zijn uitgezet; bijzonderlijk vormen de aderen eigen boezems: zoo ook moeten de zenuwen als ook de spiervezelen verlangd worden, welke laatsten men in de zwangerheid, beter dan buiten dezelve, kan toonen.

De mond der baarmoeder is, bij de geenen die voor de eerstemaal zwanger zijn, meestal geheel gesloten; maar bij haar welken meermaals gekraamd hebben, trekt dezelfde dwarfe pleet van den baarmoedersmond zig in eene ringswijze rondte famen; die rondte blijft echter open om dat de hals der baarmoeder zig bij deezen fluit: bij veelen derzelve, doet de baarmoedersmond zig open in het laatste der zwangerheid, zoodanig dat men, met den vinger, het hoofd des kinds, door de vliezen der vrucht heen, duidelijc kan voelen.

Het werktuiglijke der geboorte.

Heeft men nu alle de deelen, welken de verschijnsels der werkelijke geboorte laten zien, nauwkeurig beschouwd, zoo laat zig ligtlijk ontdekken, dat eenige deelen werkende, andere lijdende zijn. Het geheele werk der geboorte bestaat in eene geweldige krampachtige famentrekking van de deelen welken de vrucht omgeeven,

en waardoor dezelve met de haar zelve behoorende deelen, door den mondermond, de schede en de schamelheid wordt uitgeperst.

De werkende deelen der geboorte zijn de zig, door haare eigene levenskracht, samentrekkende baarmoeder, de buikspieren, en het middenrif:

De baarmoeder welke zig, door haar eigen vermogen, op alle punten samentrekt, en het hoofd des kinds, welks aanperfsing minder is, door de baarmodersmond-schede naar buiten perst:

De buikspieren en het middenrif, welken door een medelijgend gevoel op de baarmoeder, tegen den wil der baarende vrouwe, samentrekken, en in de gedaante eener pers, in eene diagonale lijn, samendrukken.

De lijdende deelen zijn niet alleenlijk de vrucht, derzelver vliezen, vochten en de moederkoek, maar ook de baarmodersmond, de schede en de schaamdeelen; doch deeze deelen lijden niet door de baarmoeder, maar door het nedergeperste vocht en de vrucht, wegens het verwijden.

De natuurlijke tijd van het verblijf der vrucht in 's moeders ligchaam, is 9 zonne-maanden, of 39 weken, welken uit 273 dagen bestaan.

De natuurlijke oorzaak, door welke eigenlijk na afloop van de 9^{de} maand de werkende deelen der daadlijke geboorte in beweging gebragt worden, is nog niet bekend; want de tegennatuurlijke oorzaak, naamlijk een tegennatuurlijke prikkeling in de werkende deelen, die eene ontijdige of vroegtijdige geboorte veroorzaakt, moet wel naauwkeurig van de hier bedoelde onderscheiden worden: eene geheele ontwikkeling van de vleeschvezelen der baarmoeder, schijnt hier de natuurlijke voorbeschikkende oorzaak te zijn; zoude nu ook de zwaarte der vrucht en haare deelen, de natuurlijke prikkelingen in de werkende deelen veroorzaken, of is het de na negenmaal opgehoudene maandlijksche bloedontlasting?

Beschouwt men de werking van de zig samentrekken- de baarmoeder, de buikspieren, en het middenrif, zoo laaten de verschijnselen der eigenlijke geboorte zig ligtlijk verklaren; want door dat de baarmoeder zig in alle pun-

ten famentrekt, vermindert de holte; derhalven wordt alles, wat in dezelve besloten is, door den baarmoedersmond naar beneden geperst, alwaar nog eene ledige, echter weinig tegenstand biedende, ruimte voorhanden is; hieruit laat zig nu de verwijding van den mond, het aanzetten van 't water, het nederzakken des hoofds, en de pijn aan den verwijden baarmoedersmond bij iedere, zoogenaamde vlaag, zeer duidelijk verklaren.

Hoe meer deeze geweldige famentrekking der baarmoeder vernieuwd wordt, hoe meer de mond zelf zig verwijdt, de pijn heviger, het water meer spannende, en het hoofd meer naar beneden in de schede gedrongen wordt: zoodra het hoofd den baarmoedersmond, om zoo te spreken, overwonnen heeft, breekt de waterblaas, verwijdt zig de geheele schede, de groote en kleene schaamlippen worden naar binnen getrokken, de opening der schaamelheid wordt grooter, of het al naar vooren onder het schaambeene dringende hoofd de bilnaad geweldig met zig naar vooren trekt, en dezelve breed maakt.

Vergelijkt men nu het maakfel, de gedaante, de ruimte en de diepte van het bekken, met de grootte en langte van het kinderhoofd, zoo zal men ook ligtlijk de werking, de verandering en de leiding, welke het gemelde hoofd onder de geboorte aanneemt, gewaar worden: want de grootte van het hoofd, welke gemeenlijk de bovenste opening van het bekken te boven gaat, is op eene voordeelige wijze, uit veele, over elkander heen schuivende beenderen, gevormd: deeze overëenschuiving der beenderen van het hoofd geschiedt door den stijven rand der bekken-beenderen, welke de groote maar beweegelijke en weekte beenderen tegenstand biedt; hierdoor verkrijgt het hoofd eene stompe kegelvormige gedaante, welke geschikt is om de tegenstand biedende zachte deelen te verwijderen.

Dit nu alzoo samengedrukte hoofd, wordt door de bovenste opening van het bekken in dier voegen geleid, dat het langste deel, naamlijk het aangezicht, aan het langste deel van het bekken beantwoordt, en aan de uitgeholtte vlakke des heiligen beens, nedergedrukt is: zoo als de

kruin des hoofds op de grootste kromte des heiligen beens staat, kan het niet meer in eene rechte lijn naar beneden geperst worden, om dat hetzelfde deeze kromte en het vereenigde staartbeen tegenstaat; maar naar vooren, onder den schaambeensboog, vindt het eene ledige, minder tegenstand biedende, ruimte.

Nu is het uitkomen van het hoofd voorhanden; dewijl het voorhoofd des kinds over de gladde uitgeholde vlakte, en de naar vooren tegen den boog der schaambeenderen gebogen vlakte des heiligen- en over het aanhangende elastische staart-been heen gleidt: de voorwaardsche buiging des achtersten deels van het bekken, geleidt het hoofd onder den boog der schaambeenderen, waar de kleinste diepte is, en waar ook de minste tegenstand voor het naderend hoofd gevonden wordt: hier buigt de nek zig, als om eenen as, naar boven; de kin wijkt van de borst af, en het voorhoofd wordt, tegelijk met het aangezicht, door de werking van de baarmoeder, uitgedreven, waarop het geheele gedeelte van het hoofd volgt: eene leiding, welke men, bij ieder natuurlijke geboorte, door het gevoel, en het gezicht, kan waarneemen.

Is het hoofd nu geheel uit de schaamelheid geperst, dan volgt het lijf op den, thans verwijden weg, zeer spoedig naa; alzoo gaat door de bovenste opening van het bekken de kruin, ter zijde de schouders, naar beneden, en daarom is het bekken van de eene zijde tot de andere iet wijder: niet alleenlijk gaat het aangezicht, ten eersten, door den uitgang van het bekken, maar men neemt ook duidelijk waar, dat terstond het lijf des kinds, door den uitgang van het bekken, in eene schuinse richting wordt uitgeperst, alzoo dat hetzelfde zig, met de schouders, meer naar achteren, naar den endeldarm, van vooren tegen de schaambeenderen keert: de oorzaak hiervan is, dat hetzelfde minder tegenstand in de middenlijn van het staart-been tegen den schaamboog, als in de middenlijn van het eene zitbeen tot het andere vindt.

De geheele samentrekking der baarmoeder perst voords zeer ligtlijk den moederkoek, aan welken ook een gedeelte van de vliezen en van den navelstreng gehecht is, buiten het

het hol van de baarmoeder, welke laatste samentrekking der baarmoeder de naweën veroorzaaken.

De kleene bloeding, die de kraamzuivering genoemd wordt, ontstaat uit die einden der slagaderen welken nog niet geheel samentrokken zijn, en zig uit den bodem der baarmoeder, in den moederkoek, hebben uitgestort; maar wanneer deeze zig samentrokken heeft, brengt zij dat vocht voor een gedeelte wederom naar haare voorige zelfstandigheid; voor een gedeelte echter ontlast het zig door de kraamzuivering.

Het leerstuk der werkdaadige natuurlijke verlossing.

Het leerstuk der natuurlijke verlossing wordt dat gedeelte der Vroedkunde genoemd, hetwelk de kundigheid bevat, waardoor een Vroedmeester het onderzoek van kraamvrouwen, de aanwijzingen bij dezelve, en de hulpmiddelen in natuurlijke geboorten noodig, uitvindt.

Eene natuurlijke geboorte is, wanneer het kind na 9 maanden tijds, zonder eenige bijzondere hulp, van zelf, gemakkelijk, en alleenlijk door de krachten der Natuur, in korten tijd, geboren wordt.

Zal nu de Natuur eene verlossing ligtlijk en zonder eenige kunst volbrengen, zoo is het noodzaakelijk, dat noch bij de moeder noch bij de vrucht enig gebrek plaats vinde: de goede ligging des kinds brengt het wezentlijkste nut toe tot eene gelukkige geboorte.

Eene natuurlijke ligging is, als het kind met den kruin in den baarmoedersmond treedt, met het aangezicht naar 't heiligbeen, en met het achterhoofd naar 't schaambeen gekeerd.

Hierdoor wordt het kind altoos, wanneer al het overige in eenen natuurlijken staat is, ligtlijk en in een korten tijd, zonder eenige hulp, ter wereld gebragt; hetwelk men overtuigend kan waarneemen, in het leger bij de soldatenvrouwen, op het land bij de boerinnen, en in de steden bij de slaavinnen der wellust; deezen baaren

dikwijls zonder eenige hulp, echter meestentijds gelukkig.

De Vroedmeester moet derhalven de algemeene omstandigheden eener verlosfinge gestadig, en alleenlijk als waarneemer, in het afgetrokkene voor oogen hebben, op dat hij oordeele of de Natuur in haare werking verhinderd of gestoord wordt.

Over de Weetenfchap hiertoe noodig, en over de geringe hulp, welk een Vroedmeester, in gevalle van eene natuurlijke geboorte, kan bijbrengen, zullen wij in het vervolg handelen.

Hoe men eene vrouw onderfiaan moet.

Het onderzoeken van den mond der baarmoeder door het voelen met den vinger, wordt in de Verloskunde onderfiaan genoemd.

Deeze oefening moet met veel naauwkeurigheid gefchieden, om dat het de voornaamfte grond is, waarop alle verdere voorzegging rust; de grond naamlijk van de kennis, door welke de natuurlijke en tegennatuurlijke toestand eener vrouwe, buiten en in de zwangerheid, vóór, in, en naa de geboorte eens kinds, op het zekerfte ingezien en voorzegd kan worden.

Heeft de Natuur den Vroedmeester eene finalle hand, met lange en gevoelige vingers gegeven, zoo is deeze, boven anderen, gelijk reeds gezegd is, tot de uitoefening zijner kunst bekwaam: de nagels der vingeren moeten afgekort zijn, en de vinger zelf, of wel de geheele hand, moet met vet of olie befmeerd, en alzoo glad gemaakt weezen, ten einde, zonder kwetsing of pijn te veroorzaaken; de bewuste gevoelige deelen te behandelen.

Het onderfiaan gefchiedt op drierleie wijzen: men noemt het naamlijk vingeronderfiaan, als het alleenlijk met den vinger gefchiedt: het handonderfiaan als het met de geheele hand gedaan moet worden, en de laafte wijze is

het instrumentaal onderslaan, als het naamlijk met den *Steinschen Pelyimeter* geschiedt.

De ligging eener vrouwe tot het onderslaan is vierderlei; 1) als zij op het bed op den rug ligt; 2) wanneer men haar op den rand der bedstede, of op eenen stoel laat zitten; 3) als men haar laat staan, met den rug leunende, en met de beenen uiteen gestrekt; 4) wanneer men haar dwars over het bed legt.

Gewoonlijk laat men haar, tot het onderslaan, op den rug op het bed liggen, zoodanig dat zij haar knie, aan die zijde daar men staat, om hoog trekt; men kan haar met den eenen arm, in de lendenen, om hoog tillen, en met de andere hand het onderslaan, op de volgende wijze, verrichten.

Bij het onderslaan met den vinger brengt men de hand naar de schaamelheid, zoodanig dat de duim aan den schaamberg; de wijsvinger in de schede, de middenste en de overige vingers op de bilnaad te staan komen.

Op deeze wijze brengt men den wijsvinger; zoo hoog mogelijk, door de schede tot aan den hals der baarmoeder; aldaar beweegt men denzelven deels om; deels in; en ook over den mond en den hals derzelve, ten einde haaren toestand naauwkeuriglijk te weeten — op dezelfde wijze brengt men den vinger in, en onderslaat men den moedermond; als men eene vrouw zittende, knielende, of ook staande onderslaat, maar, als de mond der baarmoeder nog hoog staat, en men niet met eenen vinger tot aan dezelve kan rijken, moet de geheele hand tot het onderslaan gebruikt worden: bij deeze wijze van onderslaan wordt de vrouw dwars over het bed gelegd, met de beenen vanëen gestrekt, latende de voeten op daartoe, ter zijde, gereedstaande stoelen zetten.

Als de hand met vet of olie besmeerd is, legt men den duim tuschen de andere vingers; zoo dat dezelve eene soort van kegel maaken: voords beweegt men den eenen vinger naa den anderen in de schaamelheid, en brengt als dan, den duim, tuschen de vingers gebogen, en tevens de geheele hand in de schede, tot aan den moedermond toe.

Daar nu de wijsvinger ligtlijk, maar de geheele hand zeer pijnlijk naar binnen gebragt wordt, moet men, zo de nood het niet vereischt, geen vrouw met de hand onderflaan.

De in deezen aangestelde verzoeken leeren, dat men, met twee of drie vingers, niet hooger kan komen dan met den wijsvinger alleen; derhalven moet men het voor eenen algemeenen regel houden, dat het onderflaan eener vrouwe, of met den wijsvinger alleen, of des noods met de geheele hand moet geschieden.

Somtijds is, in de schede, de eene of andere plooi gezwollen, hetwelk verscheiden bedrogen heeft, alzoo dat zij die plooi voor den moedermond gehouden, en gemeend hebben, dat dezelve wel open, maar ledig was: men moet, om dit te vermijden, in zulk een geval, altoos hooger voelen, en wel waarneemen wat men voelt.

Het kan ook nog als een algemeene regel in het onderflaan eener vrouwe worden aangenomen, dat men somtijds noch met den vinger, noch met de hand in staat is te voelen wat boven de schaambeenderen is, als men de vrouw op den rug laat liggen.

In dat geval moet men haar dwars over het bed op de knieën en de elleboogen laten liggen, en haar dan van achteren onderflaan: in dier voegen geraakt men ligtlijk over de schaambeenderen naar boven.

Wij zullen bij het onderwijs in de keering zien, dat het in zekere gevallen, zonder deeze ligging, in weêrwil van alle moeite, onmogelijk is, een kind te haalen.

Het onderflaan met den bekken-meeter van STEIN, wordt alleenlijk in de zwaarste verlosingen gedaan, als naamlijk het bekken te naauw is.

'T nut hetwelk door het naauwkeurig onderflaan wordt aangebragt, breidt zig over de geheele verloskunde uit; 't is veelal het eenige zekere middel, om met den staat der vrouwe bekend te worden; want in de zwangerheid wordt men door 't onderflaan gewaar of eene vrouw waarlijk zwanger is, dan of zij mischien aangetast is van eene andere ziekte, welke haar heeft verleid, om

zig te verbeelden dat zij bevrucht is — hoe verre de zwangerheid gevorderd is — en welke eene soort van weeën er tegenwoordig zijn — of er niet eene ontijdige geboorte voor handen is — en bij de geboorte toont het onderslaan aan, of de verlossing voordgaat — of de weeën waar of valsch zijn — of de baarmoeder recht of scheef staat — of het waare of onwaare water is weggegaan — of de vochtblaas goed of kwalijk is gevormd — of het kind natuurlijk, dan wel tegennatuurlijk inzakt — of het bekken goed dan wel gebrekkig is; waaruit men kan opmaken, of het eene ligte, dan zwaare, of tegennatuurlijke geboorte zal worden.

Naa de verlossing: of de baarmoeder zig samentrekt — of de koek los is, dan wel nog aan de baarmoeder hangt — of de bloedvloed eener zwangere vrouwe uit de schede, of uit het hol der baarmoeder ontstaat — of er tweelingen, dan eene *mola* daar bij is — alle deeze voorzeggingen, kunnen uit het naauwkeurig onderslaan opgemaakt worden.

Dit onderslaan heeft niet alleenlijk zijn nut in de zwangerheid, maar men trekt er ook buiten dezelve nut van, om dat men daardoor kan zeggen, of er eene ziekelijke gesteldheid in de schede, in de blaas, in den aars, of in 't bekken plaatst heeft — of een vrouw al eens moeder geweest is — of zij alleenlijk de zuivering heeft, dan wel of zij wezentlijk moeder is — voor het laatste ontdekt men nog eene soort van onvruchtbaarheid en van bloedvloed.

Hieruit blijkt genoeg, dat het onderzoek en de kennis der vrouwlijke omstandigheden, in de geheele Verloskunde, alleenlijk uit het wél verrichte onderslaan afgeleid kan worden.

Wil dus eene vrouw hetzelfde niet toestaan, zoo kan men haar met alle billijkheid aan het gevaar en eigene verantwoordelijkheid overlaten: de schaamachtigheid moet zekerlijk de grootste en eerste deugd der vrouwen zijn; maar, de Godheid, de Natuur, en de religie vorderen geene eerlijkheid die schadelijk is.

Tekens der ontvanging.

De tekenen dat eene vrouw door den bijslaap bevrucht is geworden, zijn zoo wel onder den bijslaap, als in de eerste dagen naa de bevruchting, geheel onzeker.

Vrouwen, welken voor het eerst bevrucht worden, kunnen onmogelijk een zeker teken daarvan: die, welken meer gekraamd hebben, hebben uit bijzondere tekenen dien bijslaap onderscheiden, in welken zij bevrucht zijn geworden.

Eenige hebben in deezen bijslaap eene kleene misfelijheid gevoeld, welke zij noch in voorgaande, noch in volgende vermengingen gevoeld hebben; en die mislijheid hebben zij met deezen of dien uitgerekenenden dag van verlossing overëengebragt; anderen hebben eene bijzondere huivering; anderen eene krampachtige, eenigzins pijnlijke beweging in den onderbuik, welke langzaam over den geheelen buik kruipt, en somtijds van eene bezwaarlijke pisontlasting verzeld gaat, waargenomen: nog anderen hebben eene bijzondere warmte bespeurd: eenigen zijn, op den eersten en tweeden dag naa 'de bevruchting, zeer gevoelig in den onderbuik geworden: de meesten willen den anderen dag eene bijzondere bemaauwdheid, vergezeld van eene krachteloosheid waargenomen hebben, welke zelfs de zwaarte haarer klederen lastig maakt.

Deeze tekenen neemt men echter niet waar bij alle bezwangerden, om dat de gevoeligheid der zenuwen ongelijk is; en kan dit wel voornaamlijk van de krampachtige beweging der trompetten ontstaan, welke 't bevruchte ei uit het eiernest naar de baarmoedersholte overbrengt.

Maar alle deeze tekenen zijn onzeker: want vele vrouwen zijn, bij alle dezelve, echter niet zwanger bevonden geworden: anderen daarentegen hebben in geenen bijslaap iet bijzonders gevoeld, en zijn echter zwanger geworden: 't schijnt dat de Natuur geweigerd heeft, ons het waare teken der bevruchting bekend te maaken, om de vruchtjens, welken in de eerste maand der zwangerheid ligtlijk afgedreven kunnen worden, voor de boosheid te beschermen.

De tekens der zwangerheid.

Eene vrouw, welke in hare baarmoeder een bevrucht ei draagt, wordt van den tijd der bevruchting af, tot hare verlossing toe, zwanger genoemd.

Natuurlijk, en zeker altoos, geschiedt de ontvanging in de baarmoeder: tegennatuurlijk, en ongelukkig, is zij, buiten de baarmoeder, als het bevruchte ei in het eiernest, in eene van de trompetten, in het buikhol, of in de holte van het bekken wordt gevonden; daarom wordt de ontvanging en de zwangerheid naar die verschillende plaatsen in eene natuurlijke en tegennatuurlijke verdeeld; ten tweeden, verdeelt men de zwangerheid, ten opzichte van het in de holte der baarmoeder gehouden ligchaam, in eene waare, in eene onwaare, en in eene vermengde.

Eene waare zwangerheid is die, waar een dood, of een of meer levendige kinderen in de holte der baarmoeder gevonden worden.

Eene onwaare is die, waar een *mola*, of een ander tegennatuurlijk ligchaam, zonder vrucht, in de baarmoeder plaats heeft.

Vermengd wordt de zwangerheid genoemd, als zij bij de vrucht, nog een of ander tegennatuurlijk ligchaam bevindt.

De tekens der zwangerheid zijn zeer verschillende, naar dat de vrucht levendig of dood; naar dat eene vrouw van één of meer kinderen zwanger is; naar dat de vrucht in de baarmoeder, of buiten dezelve is; of naar dat eene *mola* alleen, of met een kind samen in dezelve is.

Wij zullen derhalven beginnen met de tekens eener waare, natuurlijke zwangerheid, dat is, met een leevend kind: deeze tekens worden verdeeld in zekere en twijfelachtige.

Maar even als de tekens der bevruchtinge twijfelachtig zijn, zoo zijn ook de tekens der zwangerheid, tot de vijfde maand, twijfelachtig en onzeker.

Als onzekere kenmerken van zwangerheid worden, van de Schrijvers, de volgende omstandigheden opgegeven:

- 2) Als de buik eenigzins samenvalt;
- 2) Als de moedermond zig meer naar beneden in de schede plaatst;
- 3) Als de baarmoedersmond of de hals zig sluit;
- 4) Als de maandelijkse bloedontlasting geene plaats meer heeft;
- 5) Als de navelkuil zig meer vertoont, en als in verderen tijd de geheele navel uitpuilt;
- 6) Als de billen grooter worden;
- 7) Eene opzwellings der borsten;
- 8) Als de vrouw zig ziekelijk gevoelt; eenen afkeer voor vleesch heeft; aan braaken in den vroegen morgen onderhevig is; als zij geen' lust tot de gewoone, maar trek in ongewoone spijsen heeft; als zij treurig, krachtloos en slaaperig is; als zij hoofdpijn en tandpijn heeft, in slaauwte valt, veel braakt, vlekken of uitslag in 't aangezicht, bleke of roode wangen met ingevallen of opgezette blaauwe oogleden heeft:

Een van deeze agt tekens, zeggen de Schrijvers, be-
duiden echter volstrekt niets: zij moeten allen met een
zieklijken toestand plaats hebben, zal men in de eerste
drie maanden, met zekerheid zeggen, of een vrouw
zwanger is. (*).

Al zijn ook alle deeze tekenen aanwezig, zoo kan
men tog niet met zekerheid bepalen, dat eene vrouw
zwanger is; want die tekens kunnen allen door eene ziekelijke
uitblijving der maandstonden; of door eene *mola* ontstaan:
des kan men de zwangerheid, tot in de vijfde maand,
onmogelijk zeker stellen, om dat de zekere tekenen in
deeze maand eerst kennelijk worden.

De zekere tekens der zwangerheid zijn, 1) als de
buik opzwellt, 2) het bewegen der vrucht, 3) de ver-
andering van den mond der baarmoeder

Het opzetten of zwellen van den buik is, als zig na

(*) Men moet des binnen deezen tijd voorzichtig zijn met te oordeelen, daar
het op de eere eener vrouwe aankomt; en bij zulke, die ter dood zullen veroordeeld
worden, moet men zoo lang wachten, tot dat men zekere tekens van zwangerheid
heeft: want hoe veelmaals heeft men onschuldige maagden voor bezwangerd
gehouden; zwangeren voor waterzuchtigen, en zo omgekeerd: en is niet ten tijde
van BASTOLINI, een met eene tweeling bezwangerde vrouw, opgehangen?

de derde maand der zwangerheid, de buik in de gedaante eener buiten het bekken uitpuilende bol vertoont, en maandliks, op het gevoel, grooter wordt.

De beweging der vrucht is, als de zwangere tegen het midden der vijfde maand voor de eerste maal waarneemt, als of zig een spin of vischjen in de baarmoeder bewoog, en die beweging maandliks sterker wordt; zoo dat men dezelve eindelijk door eene op den buik liggende hand kan waarneemen.

Bij het veranderen van den moedermond, zwelt deszelfs kraakbeenige hardheid tot eene sponsachtige weekheid, de stamswijze gedaante wordt kegelvormig, en de dwarse spleet trekt zig tot eene ringvormige opening: dit samentrekken neemt men bij eerstbaarenden aan den rand der lippen, en bij haar die meer gebaard hebben, aan den hals der baarmoeder waar.

Zoodanig zijn de zekere, en volstrekt niet twijfelachtige kentekenen der zwangerheid, en het daarzijn van een leevend kind: deeze tekens worden, tot aan de verlossing toe, allengs kennelijker, dewijl de buik alle maanden hooger opgroeit, en het bewegen der vrucht ook sterker wordt.

De mond der baarmoeder verdwijnt meer in de breedte, en als het hoofd des kinds intreedt, kan hetzelfde reeds, door de dunte van den hals, gevoeld worden.

De tekens, bij de zwangerheid, wegens het aanwezen van één, twee of meer kinderen; de tekens der zwangerheid van eene doode vrucht, van eene onwaare zwangerheid, van eene *mola*, van eene buikontvanging, en eene over-bevruchting, zal ik opgeeven, wanneer ik des-aangaande afzonderlijk zal spreken.

De tekens, of eene vrouw van een meisje dan van een jongen zwanger is, zijn door geen' Vroedmeester te bepaalen: er zijn gevallen dat vrouwen, die meer zwanger geweest zijn, uit eigene waarneemingen kunnen zeggen, of zij, bijvoorbeeld, een jongen draagen, dewijl zij eenige bijzondere omstandigheid gevoelen welken zij niet bespeurd hebben, bij de zwangerheid van een meisje.

Tijdrekening der zwangerheid.

Men wordt wel eens door eene vrouw geraadpleegd; bepaaldlijk om te zeggen in welke maand van zwangerheid zij zig bevindt: in dit geval moet men 1) uit het opzetten des buiks; 2) uit den tijd van het uitblijven der maandstonden; 3) uit den tijd waarop de vrouw de beweging des kinds gevoeld heeft; 4) uit de gedaante van den moedermond, en 5) uit het voor 't gevoel duidelijk geworden hoofd der vrucht, de begeerde rekening op den tijd der verlossing maaken.

In de eerste drie maanden is de buik smal; in de vierde staat hij boven de schaambeenderen; in de vijfde tusschen de schaambeenderen en de navel; in de zesde tot aan de navel; in de zevende, tusschen de navel en de hartkuil; in de agtste tot op de helft van de negende maand, tot aan de hartkuil: in de andere helft van de negende maand, zakt hij weder tusschen de navel en de hartkuil af.

De vrouwen gevoelen de beweging der vrucht meest in de helft der zwangerheid, dat is na de 18^{de} week.

Het uitblijven der maandstonden, moet men met het begin der beweging van de vrucht samen houden; want de maandstonden blijven in de eerste maand der zwangerheid niet altoos weg: en als het geschiedt, zoo rekent men een halve maand van dien tijd af, (alzo zal men hoogstens op naauwlijks veertien dagen, minder of meer, den waaren tijd treffen) om dat men niet zeker weet, hoe veel weken vóór het uitblijven der maandstonden de vrouw waarlijk ontvangen heeft.

Bij het onderzoeken van den moedermond is, in de eerste vijf weken, waarteneemen, dat dezelve iet weeker is, dan buiten de zwangerheid: bij maagden is hij zoo als reeds gezegd is, als een puntig kraakbeen te voelen: naa de vijfde en in de overige maanden, wordt hij meer en meer korter, maar in de breedte dikker, en zoo zacht als een spons: in den laatsten tijd wordt hij

dun als een vlies, en blijft, bij die voor de eerste maal zwanger zijn, tot aan de verlossing gesloten: bij haar die meermaals gekraamd hebben, neemt men waar dat de moedermond en de hals dikwijls, reeds eenige weken vóór de verlossing, open zijn, onder de gedaante van eenen vleezigen ring: hoe dunner nu de moedermond is, en hoe meer zij in zijne natuurlijke hardheid en gesteldheid verandert, hoe nader het tijdstip der geboorte dáár is.

Voor het laatste wordt nog het voelen van 't hoofd des kinds in aanmerking genomen: is hetzelfde door den moedermond zeer duidelijk te voelen, zoo toont dit de zesde voorbijgaande maand aan.

Uit deeze tekenen, over 't algemeen, kan men genoegzaam, echter niet zeker, den dag der geboorte bepaalen, eenige Schrijvers meenen, dat dezelve juist op dien tijd moet komen, waarop de maandelijksche bloedontlasting, van de negende maand, komen moest.

Bezorging staande de zwangerheid.

De bezorging eener zwangere vrouwe is ontegensprekend eene der gewigtigste bezigheden, welke een Vroedvrouw of Vroedmeester moet kennen, om dat zij veel geraadpleegd worden, van jonge vrouwen, die gaarne willen weten hoe zij zig, staande de geheele zwangerheid, moeten gedraagen, en ook, omdat eene goede voorzorg gedurende dien tijd veel toebrenge, tot eene goede en gelukkige geboorte: alzoo moet de bedoelde bezorging ook altijd als een wezentlijk stuk in de Verloskunde beschouwd worden: ik zal derhalven het noodigste hier aantekenen, dat is, ik zal aantekenen wat een zwangere vrouw, ten opzichte der lucht, der spijs en drank, der lichaamsbeweging, ten opzichte van den rust, van den slaap, van de onaangename ontmoetingen des bijslaaps, van de ontlasting der kleederen, en het aderlaten, staande geheel de zwangerheid, te doen of te laten heeft.

Beschouwt men de bezorging der zwangere vrouwen in 't algemeen, zoo bevindt men dat dezelve in niets

anders bestaat, dan alleenlijk in het rechtmatig doen gebruiken van de natuurlijke dingen, waardoor de bezwangerden het miskraamen wordt verhinderd, en de vrucht gezond wordt gehouden.

Eene zwangere moet zig alzo in eene getemperde lucht ophouden: vochtige en koude lucht veroorzaakt gemeenlijk sterk hoesten, waardoor de vrouwen dikwijls een miskraam krijgen.

De spijs moet voedend en ligt te verteeren zijn, om dat men bij zwangere vrouwen veelal een zwakker maag vindt, dan bij anderen, en zulke spijs geeft, aan moeder en kind, beter voedend sap; echter moet dezelve niet met veele specerijen of zuur vermengd zijn: heeft een vrouw intusfchen een sterk verlangen naar de eene of andere spijs, hetwelk men de belustheid der zwangere vrouwen noemt, zoo kan zij haar verlangen desaangaande wel voldoen, mids altoos slechts weinig van het geen zij begeert, te laten gebruiken.

Die vrouwen, welken ligchaamsbeweging gewoon zijn, is dezelve gezond; maar volbloedige en zwakke vrouwen kan de beweeging eene vroegtijdige geboorte veroorzaken, wanneer zij te sterk is: onder die sterke en onmaatige ligchaamsbeweegingen, behoort het lang dansen en het hard rijden op steenwegen; een en ander is de baarmoeder, door het sterke slooten, nadeelig; maar vooral moeten de kraamvrouwen zig wachten voor alle sterke inspanning van ligchaamskrachten, en voor het tillen van zwaare lasten.

De rust is de zwangeren, in de eerste tijden, noodzakelijk, ten einde de vrucht niet afgedreven worde: het naar bed gaan moet derhalven niet tot laat in den nacht uitgesteld worden, op dat de slaap niet te kort zij.

Sterke onaangename ontmoetingen, als aanleiding tot gramfchap, schrikken enz. moeten door zwangere vrouwen zorgvuldiglijk vermijdd worden, om dat zulke aandoeningen veelmaals eene ontijdige geboorte veroorzaakt hebben.

Daar het bij zwangere vrouwen niet zeldzaam is, dat zij in zwijm vallen, is het noodig dat zij wat *tinctur*,

castor. en azijn, tegen den omftander der baarmoeder, als ook *liquor Hoffm.* of, *spirit. nitr. dulc.* en een vlug zout bij zig draagen.

Daar het nog niet uitgemaakt is, of de fterke verbeeldingskracht der zwangeren, oorzaak der moeder-vlekken op de vrucht is, zoo is het aanteraaden, dat de zwangere vrouwen, alle fchouwfpelen, affchuwelijke beelden, of andere dergelijke gelegendheden welken fchrik veroorzaaken, of eene fterke verbeelding naar zig trekken kunnen, te vermijden.

De bijfleep des mans moet zoowel in de eerfte dagen naa de bevruchting, als in de laafte twee maanden der zwangerheid, geene plaats hebben; in 't eerfte geval kan door te veel vermenging eene vroegtijdige verlofing, en in het tweede geval kan door het famendrukken des buiks, de baarmoeder nadeel, of ook wel eene barfting toegebragt worden.

De natuurlijke ontlafting moet, bij zwangere vrouwen, zelfs door weekmaakende clyfteren bevorderd worden: men kan de hardlijvigheid voorkomen, door het gebruik van gekookte fruit, als appelen, pruimen enz., ook door 't gebruiken van kalfsvleesch-foup, en spinagie.

De kleederen der zwangere vrouwen moeten altoos wijd zijn; de keurslijven moeten afgelegd worden; des winters moeten zij broeken draagen, en den buik in eene breede zwachtel losjens inwikkelen, om deszelfs bloote deelen voor koude te bewaaren: de kousbanden moeten niet ftijf omgebonden worden, ten einde de zwelling der beenen voortekomen.

Het aderlaaten, 't welk men gewoonlijk op de helft der zwangerheid doet, kan alleenlijk bij volbloedigen, en die, buiten de zwangerheid, de maandlijkfche bloedontlafting zeer fterk, of eene ontlafting van vocht uit de fchede hebben; of bij haar, die door gevaarlijke ziekten aangevallen worden, welken de aderlating noodzaakelijk maaken, plaats hebben: de zwakke bezwangerde vrouwen is het altoos na-deelig: wordt daarentegen het aderlaaten als eene noodige zaak aangezien, zoo behoeft men daarmede niet tot de helft der zwangerheid te wachten, om dat bij veele vol,

bloedigen, als, tegen de derde maand de aderlating verzumid wordt, miskraamen of vroegtijdige verlosfingen het gevolg is: het aderlaaten moet op den arm, en niet op den voet geschieden.

Het bloed der zwangeren overtrekt zig in de laatste maanden met zulk een korst, als in het zijdewee plaats heeft: men dienen haar derhalven oplossende kruiden in kalfssoep voor, 't welk haar zeer veel nut zal doen.

De tekenen der geboorte.

De tekenen waaruit men besluit of de dag der verlossinge eener zwangere vrouwe nabij is; als ook de tekenen welken het daadelijk begin, den behoorelijken voorgang en de haastige voleinding der verlossing bepaalen, zijn de eerste omstandigheden, waarna een Vroedmeester door de zwangere vrouw gevraagd wordt.

De bepaaing des geboortendags, bevat gewislijk het onzekerste van alle andwoorden.

Echter kan men, gelijk reeds gezegd is, uit den tijd wanneer de maandelijksche bloedontlasting heeft opgehouden, als ook uit de beweeging des kinds, uit het aanwasfen of de hoogte der zwangere baarmoeder, uit het onderzoeken van den baarmoedermond, en laatstlijk uit de voorzeggende weeën, den tijd der geboorte raaden. Veel zekerder evenwel kan men eene vrouw, tegen het einde haarer zwangerheid, vooruit zeggen, of zij hoop op een natuurlijke geboorte heeft; dan naamlijk, als men door middel van het onderslaan, de geboortewegen in eenen goeden staat, en de vrucht in eene goede ligging vindt.

Het begin der geboorte kent men onstrijdig uit de volle loop der zwangerheid, en uit de tegenwoordigheid der waare geboorteweeën, waar door de baarmoedermond zig opent, en het water gespannen wordt.

De voorgang der geboorte openbaart zig door het aanhouden, de gestadigheid, ja de verzwaring en vermeerdering der weeën; door het groejen van 't water, en het voordrukken van het hoofd des kinds.

Eene haastige voleinding der verlossing wordt beloofd, door eene met bloed vermengde slijm, door schuddende weeën, door de verandering der stem, het verwijden der schaamleelen, en het uitpuilen der bilnaad.

Wij zullen alle deeze verschijnsels eenigzins wijdlooper verhandelen, ten einde den Leezer de duidelijker omstandigheden daarvan voorteleggen, en hem alzoo eene nauwkeuriger en duidelijker begrip van dezelve te geeven.

Na de agtste maand der zwangerheid neemt men waar, dat de baarmoeder den hoogsten graad haarer uitzetting heeft gekregen; dan is het onderlijf, van het schaambeen tot in het midden, tusssen de navel en het borstbeen, op het hoogste gezwollen, en in den omtrek van de navel vormt zig eene stompe ronde verheffing, welke omtrent tot aan het kraakbeen des borstbeens gaat; het bovenste zijdelijk gedeelte des onderlijfs, in den omtrek der onwaare ribben, is het meeste verwijd en opgevuld; daarom wordt bij zwangere vrouwen het ademhaalen meer dan gewoonlijk kort en lastig.

Op de hoogste uitzetting der baarmoeder volgt, naa verloop van tijd, de langzaame nederzakking van dezelve: naamlijk de bovenste rondte van het onderlijf begint dagelijks dieper, tegen de navel te zakken, waardoor deeze derhalven meer vooruit puilt: de spanning onder de korte ribben gaat weg, en de zwangere vrouw haalt den adem gemakliker in: niet te min verwekt het bedoeld zakken der baarmoeder nieuwe verschijnselen: want het onderlijf puilt zoo ver uit, dat de vrouw genoodzaakt wordt krom te gaan; de schaamlippen en de onderste leden beginnen te zwellen, en in de schede vertoont zig een taaiachtige witte slijm, (*) die dagelijks vermeerdert: de zwangere vrouwen hebben een meer dan gewoone aandrang, tot ontlasting van pis en drekstoffe — op dit kleene verschijnsel vertoont zig een ander, hetwelk voor de zwangeren merkwaardiger en gevoeliger is: meestal des

(*) Deeze slijm ontstaat uit de slijmklieren van den baarmodersmond, en der schede; indien het hoofd de terugvoerende aderen een weinig samendrukt, wordt de terugvoering des bloeds, uit de slagaderen in de aderen, verhinderd, en alzoo scheiden de slagaderen meer slijm in de klieren af.

avonds, naa gedaanen arbeid, gevoelen zij eene korte; doch snelle, en veelal aanhoudende pijnlijke spanning, die in de lendenen en den omtrek der navel begint, en in het bekkenhol, met een gevoel van nederdrukking, eindigt.

Geduurende deeze geringe, bij de vrouwen als dan nog onbekende pijn, wordt haar aangezicht rood; de lippen van den mond drukken zig samen, en de vrouwen grijpen schielijk naar het eerste wat haar voorkomt, en houden het zoo lang vast, als de nederdrukkende pijn duurt; het verdwijnen dier pijn brengt alles weder in de vorige toestand en rust. Deeze kleene duidelijke nederwaarts dringende weeën, noemt men de voorzeggende: zij beginnen gemeenlijk tegen den avond en verliezen zig in het bed, door de uitgestrekte ligging des ligchaams: die geenen, welken meer gekraamd, en een slap ligchaams-gestel hebben, gevoelen deeze voorzeggende weeën minder, dan die voor de eerste maal zwanger zijn.

Deezen worden door de gezegde weeën dikwijls bedrogen, dewijl zij gelooven, dat de tijd der verlossing daar is.

Om die voorwerpen haare vrees te beneemen, en met zekerheid te kunnen bepaalen of de geboorte nog te verwachten is, moet men de binnenste schaamdeelen raadpleegen.

De onderzoekende vinger vindt als dan

1) De schede meer dan gewoonlijk verwijd; de voorste plooijen geheel verdweenen; de achterste zijde hooger dan de voorste; het bovenste einde naar den moedermond toe is ruimer, dan het buitenste; de hoek, die de schede met den baarmoedersmond vormt, is meer gepunt.

2) De baarmoedersmond, die in den natuurlijken staat, buiten de zwangerheid, hard, puntig, en langachtig, met zijne dwarsse spleet naar beneden hangt, is nu zacht, dun, bolrond, en breed uitgezet:

3) De opening van den baarmoedersmond wordt bij verscheidene zwangeren, ten tijde der voorzeggende weeën, en tegen het einde der zwangerheid, zeer onderscheiden

gevoeld: bij die welken voor de eerſtemaal zwanger zijn, blijft het hoofd des kinds, in den tijd der waare weeën, overal, en des geheel, met den baarmoedersmond bedekt, en deeze op zig zelf geheel geſloten; maar bij vrouwen die meer gekraamd hebben, en bij welken gevolgtijk de deelen meer verſlapt zijn, is de baarmoedersmond overal gelijklijk wijs en dun, offchoon hij reeds eenigzins open ſta; echter vertoont hij zig niet, gelijk anders, als een dwarsſe ſpleet, maar als eene kleene, dunne, eivormige, vlezige, ronde mondig, waardoor men met moeite, een of twee vingers kan heen brengen.

Deeze monding bevindt zig midden in het bekken, doch meer achterwaards naar het heiligbeen: ſomtijds vindt men den moedermond bij zulke ſoort van vrouwen, geheel ſlap hangende, gelijkende naar een' trechter, welke van onder in zijnen omtrek wijs, en van boven ſmal is, om dat de hals der baarmoeder zig laater, dan derzelve lippen, verwijsdt.

In die gevallen, waarin de opening van den baarmoedersmond, des Vroedmeesters vinger doorlaat, vindt men in denzelven eene dunne en ſlappe huid, en achter deeze het golvende lamsvocht, waarin men een hard tegenſtandbiedend ligchaam ontmoet, hetwelk 't hoofd der vrucht is, dat op den rand der bovenſte opening van het bekken rust, zig, door het ſtooten van den vinger, ſomtijds naar boven beweegt, en weder naar onder valt: hoe onbeweegeliker men nu het hoofd bevindt, hoe meer de geboorte nabij is.

In zulk eene omſtandigheid worden de binnenſte ſchaamdeelen op 't einde der zwangerheid, en in den tijd der oorzeggende weeën, bevonden.

Wanneer bij het begin der weeën, met den vinger, noch eene merkelijke verwijsding van den baarmoedersmond, noch eene groeijing van het water gevoeld wordt, kan men de komende vrouw met zekerheid zeggen, dat het geboorte uurtjen nog niet dáár, maar echter aanſtaande is.

Deezen nu zijn de verſchijnselen en tekens der naderen verlosſing, en de veranderingen in de inwendige ſchaam-

deelen, welken dagelijks aanmerkelijker worden, dewijl de baarmoedersmond zig alle dagen meer en meer opent, en in het bekkenhol afzakt.

Op deeze wijze gaan de bevruchten in eene gestadige verwachting voort, tot dat de tijd der zwangerheid geheel afgelopen is; en nu neemt de zaak eerst eene ernstige gedaante aan.

Meestentijds trekt de Natuur het gordijn onverwachts op, en de geboorte stelt zig in, op de volgende wijze:

In den beginne gevoelt de baarende vrouw langzaam weêromkomende weeën, of krampachtige samentrekkingen van de baarmoeder, en van het onderlijf.

Deeze weeën houden niet lang aan, en zijn ook, ieder op zig zelve, kort; zij zijn ook niet hevig; maar naa verloop van tijd worden zij sterker, pijnlijker, houden langer aan, volgen schielijk op elkander, en noodzaaken de baarende, in weêrwil van haar zelve, den adem in te houden; zoo lang de vlaag duurt is het onderlijf op 't aanraaken hard; deeze pijnlijke, krampachtige samentrekking van de baarmoeder (welken door de baarende, wegens het sterk intrekken van de werktuigen der ademhaaling, ondersteund wordt), noemt men arbeid.

Onderzoekt men met den vinger het werken van deeze weeën, zoo gevoelt men 1), dat de baarmoedersmond eene ronde en gelijke verwijding ondergaat; 2), dat dezelve in het begin der weeën gespannen, stijf en verwijd wordt, waarop eene terughouding des adems, en eene nederdrukking in het onderlijf volgt; 3), dat de blaas met vocht gevuld is, het hoofd des kinds bedekt en in de opening van den baarmoedersmond ingedrukt wordt.

Bij het nalaaten van deeze vlaag, wordt de vochtblaas als ook de baarmoedersmond, slap; het geheele onderlijf is op het aanraaken weder zacht, en veroorloft de baarende het genot eener aangename rust.

Buiten de vlaagen, kan men nu, duidelijker dan te vooren, de ligging des hoofds waarneemen; dewijl het door de verwijding van den baarmoedersmond, dieper en sterker, in de bovenste opening van het bekken nederzak

De naaden, fontanellen, als ook het kloppen, zijn als dan merkelyk te onderscheiden.

Naar maate het hoofd sterker in het bekkenhol zakt, naar maate schuiven de naaden en fontanellen zig overëen, aan den kruin ontstaat, in den beginne, eene plooi, van de overëengeschovene bekleedselen des hoofds, en die plooi vormt zig, voor en naa, tot een rond gezwel.

Naar gelang van dit overëenschuiven der beenderen van het hoofd, gaat het voordrukken van hetzelfde spoediger voort: zijne beweeging is als volgt: door de bovenopening van het bekken, en zelfs door het bekkenhol, wordt het zoo lang, in eene rechte lijn, nedergedrukt, tot het aan de onderste bogt des heiligbeens komt: nu gaat het niet meer in eene rechte lijn voort, maar op eene wijze, van welke wij in het vervolg zullen spreken.

In deeze ligging past het hoofd naauwkeurig in het hol van 't bekken, en nu is geen baarmoedersmond meer te voelen: indien het hoofd dieper afzakt, word dezelve allengs zoo verwijd en dun, dat hij geheel en al verdwijnt: daarna kent men de geheele verwijding van den baarmoedersmond aan den, met bloed vermengden, slijm, met welken de onderzoekende vinger des Vroedmeesters overtogen wordt.

De vochtblaas is bij dit voordgaan des hoofds grooter geworden; dezelve blijft gestadig uitgezet, alleenlijk wordt zij onder de vlaagen iet stijver; doch zonder, als te vooren, bij het ophouden der vlaagen weder te verflappen.

Nu is het tijdstip der geboorte voorhanden; de baarende als ook de omstanders, hooren, onder eene sterke vlaag, zeker geluid, en daarop volgt, uit de schaamelheid, met eenig geweld, een stroom van eenige oncen waters (*).

Hierop worden de weeën heviger; komen sneller, aanhoudend, met zwaare pijnen en fidderingen der leden: deeze weeën of vlaagen, noemt men fidderende weeën.

(*) In de natuurlijke geboorte breekt het water meestal dan, als de moedermond zoo verwijd is, dat dezelve, met de schede en de baarmoeder, eene holte maakt.

De weeën maaken den loop van den geboorte-arbeid met nadruk roerend en treurig; de pols wordt hard, schiekelijk en vol; de oogen, als van bloed overstroomende, flikkeren; de wangen worden rood; het aangezicht gloeit; het zweet breekt overal, bijzonderlijk in het aangezicht, uit; de leden sidderen, voornaamlijk de knieën; de barende vrouw beeft; rilt zonder koud te zijn; zij knarst met de tanden, en trekt de lippen samen; haar gelaat wordt wild, haar stem helder; met hangende haren huilt zij als eene mismooide, en bereikt alzoo den hoogsten, en bijna ondraagelijken graad der sidderende weeën, waardoor als dan, bij eerstbaarenden, het toomtjen der bilnaad stuk scheurt, en de vrucht, als mede het daarbij zijnde vocht, met het grootste geweld, zonder vreemde hulp, door de verwijde schamelheid wordt uitgedreven.

Naauwlijks is nu het kind geboren, of ook al het pijnlijk gevoel laat oogenbliklijk af, en de lijderes geniet terstond de aangenaamste, onbeschrijfelijkste, en langgewenschte rust: eene zachte stilte verkwikt het afgematte ligchaam; de hitte vermindert; het zweet en de roodheid der wangen verdwijnen; de oogen worden slaaperig; op het bleke gelaat vertoont zig nu de zachtste vergenoegdheid; de liefdearmen der nieuwe moeder omvatten met vreugde het wêlgemaakte kind, en zij sluimert voords, zachtken en dankbaarlijk, in.

Onderzoekt men nu, terstond naa de geboorte des kinds, de inwendige schaamdeelen der verlostte vrouwe, zoo bevindt men den baarmoedersmond te gelijken aan een slapen, afgesneden darm, in de schede hangende, waarvan het achterste gedeelte langer en dunner schijnt te wezen dan het voorste: de hals der baarmoeder begint zig, voor het eerst, samen te trekken; door deeze heen, slingert de navelstreng, in eene grootere holte, aan wier bodem de moederkoek vast zit.

Het uitblijven der weeën, de rust en de sluimering duuren slechts eenen korten tijd; meestal naa verloop van een half uur wordt de blijde moeder wakker, dewijl zij nieuwe pijn gevoelt: de te vooren krampachtige, en

pijnlijke beweging der baarmoeder, en de deels vrijwillige, deels gedwongene terughouding des adems, het gevoel der nederdrukking van een ligchaam, 't welk uit de schede poogt te persen heeft op nieuw plaats; doch alles in eenen zeer gemaatigden graad.

Hierdoor wordt de moederkoek, uit de baarmoeder, door derzelver mond, in de schede gedreven, uit welke men dezelve dan vervolgens, door zachtlijk aan den navelstreng te trekken, kan uitneemen, tevens met de daaraan hangende vliezen.

Deeze pijnen noemt men de naweeën, welken door middel van de afdrijving des moederkoeks, met deszelfs vliezen, de nageboorte uitmaaken.

Alzoo eindigt de Natuur, door zig zelve, dat is zonder vreemde hulp, de geheele geboorte.

Na het wegneemen van den moederkoek, bespeurt men, door den onderzoekenden vinger, dat de hals van de baarmoeder zig samentrekt: de samentrekking van den moedermond geschiedt langzaam, en eerst naa verloop van eenige dagen.

Na het ontlasten van den moederkoek, vloeit uit de ledige baarmoeder, in 't eerst, eene menigte van helder bloed.

Deeze bloedvloed vermindert in weinig tijds; naa eenige dagen wordt het bloed waterig, en vervolgens geheel wit: die ontlasting duurt meestal tot de vierde week, wanneer dezelve langzaam ophoudt — De geheele toedragt van zaaken noemt men kraamzuivering: indien er stukken bloeds uitvloejen, gevoelt de vrouw eenige snijdende krampachtige pijnen, in den omtrek der inwendige schaamdeelen, vooral wanneer deeze stukken in menigte uitgedreven worden: dit duurt echter zelden langer dan vier-en-twintig uren: bij vrouwen, welken voor de eerstemaal kraamen, is dit met meer pijn vergezeld, dan bij die welken meermaals gebaard hebben.

Omtrent den derden dag naa de geboorte, overvalt de kraamvrouw eene korte rilling, waarop eene sterkere hitte volgt, die naa vier-en-twintig uren met een maatig zweet, opgezette borsten, en ophoopig van melk eindigt:

dit verschijfel wordt de melkkoorts genoemd, en is echter meestal zoo draagelijk, dat er geene geneeskundige hulp bij nodig is.

Naa het eindigen der melkkoorts en der kraamzuivering, bekomen alle de deelen hunnen natuurlijken toestand weder; de moeder zoogt haar kind, en beiden neemen dagelijks in gezondheid en krachten aan.

Alleenlijk blijven de uit- en in-wendige schaamdeelen eenigzins slap en verwijd: aan den baarmoedersmond voelt men eenige kleene lidtekens, het welk de zekerste blijkt is, van dat eene vrouw gekraamd heeft.

Ziedaar de verklaring van alle de verschijfelen, welken in den geboorte-arbeid, ingevolge de wetten der Natuur voorvallen, en welken de Heer Profesfor SAXTORPH, met het penceel der Natuur, zoo bijzonder naauwkeurig heeft afgetekend.

De voorbereiding eener baarende vrouwe.

Zoodra men door de opgenoemde verschijnselen vermoedt, dat de geboorte zekerlijk begint, moet de zwangere vrouw zig,

1) Licht kleeden: zij moet niets dan een wijden rok aanhebben, daar onder een laken, in drieën gevouwen, over het bloote lijf, ten einde naderhand te dienen tot een' sluitband: zij moet volstrekt geene andere kleederen aan hebben, dan welken eerbaarheidshalven noodig zijn; ook noodig zijn om de ontblooting voortekomen, en om zig tegen de koude te beschermen.

2) De voeten moeten van den enkel tot boven de knie gezwagteld worden, om de uitzetting der aderen te vermijden, of zoo deezen reeds uitgezet zijn, voor het openbarsten te bewaaren.

3) Eenige Vroedvrouwen, binden de baarende eenen doek stijf om den hals, ten einde daardoor het zwellen van denzelven voortekoomen; dan, dit verhindert zekerlijk den terugvloed des bloeds, en is alzoo niet noodig, niet alleen, maar ook hoogst schadelijk.

4) De volbloedige vrouwen, maar voornaamlijk die voor de eerstemaal baaren, moeten vóór de bevalling adergelaaten worden.

Men zorgt echter dat hetzelfde bij zwakke en uitgemer- gelde zwangeren niet geschiede.

5) Alle baarende vrouwen moet men, vóór de bevalt- ling, een zacht clysteer, uit olie en melk, of ongezou- weernat bestaande, toedienen: dit is alle baarenden dien- stig, op dat de drekstof in den endeldarm de geboorte niet verhindere, of dat staande den arbeid dezelve niet uitgeperst worde.

6) Allen moet men waarschouwen om haar water zoo veel te ontlasten als mogelijk zij: wil dit niet vrijwillig gaan, zoo moet men het, vóór de geboorte, door den katheter ontlasten.

7) Om eene baarende vrouw te versterken, laat men haar goede soupen, of de zwakken eenige teugen goeden wijn neemen: den volbloedigen, daarentegen, is de wijn schadelijk: voor het overige zijn de heete, zogenaamde geboorte-bevorderende druppelen, of poeders, altoos na- deelig, en wel bijzonderlijk den volbloedigen.

8) Eene baarende moet zig, in het begin der weeën, onthouden van alle vast en sterk voedsel.

De noodige hulpmiddelen.

Zoo dikwijls eene Vroedvrouw bij eene baarende vrouw wordt geroepen, moet zij de volgende hulpmid- delen bij de hand hebben:

1) Zij moet zorgen voor een goede ligplaats, 't zij den Steinschen geboortestoel, het zij, en beter, een rustbank of ledikant, met een matras van stroo of paardenhair.

2) Een met pijpen voorziene clysteerspuit of, eene clysteerblaas met zijn pijp.

3) Eene schar met breede en botte punten, om den navelstreng doorteknippen: deeze moet geene scherpe punten hebben, op dat een kind, hetwelk met handen en voeten sterk leeft, daarmede niet gestoken worde —

de schar moet aan het einde een weinig krom staan, op dat, als de navelstreng om den hals des kinds gestrengeld is, men denzelven gemakkelijk kan doorsnijden.

4) Er moeten platte catoenen bandjens, ter bindinge van den navelstreng zijn: want noch dikke, breede banden, noch zijden, noch garen, zijn daartoe dienstig: met de eersten kan niet vastgenoeg gebonden worden, en het laatste snijdt den navelstreng door.

5) Een tinne of ijvoiren spuit, met eene pijp, gelijkstaande met den bogt der schede; hebbende eenen ronden knop met kleene gaatjens doorboord, tot het inspuiten van azijn of iet anders in de baarmoeder, en om, in gevalle van nood, wanneer zekere godsdienst het vereischt, het kind te doopen.

6) Eenige strooken linnen, die, zoo als in het tweede Deel gezegd zal worden, bij het keeren des kinds in eene tegennatuurlijke geboorte, om den voet welke uitgehaald is, gestrikt kunnen worden.

7) Den geest van *Ammoniac sout*, om de zwakke baarende vrouw, of het eerstgeboren kind, onder den neus te houden.

8) Eenige stukken zwam om de bloeding, indien de navelstreng uitscheurt, te stillen: voeg hier, als iet hoogst noodzaaklijks, bij, goeden wijn-azijn, linnen drukdoeken, en eenige lakens: ook moet boomolie, en ongezouten boter bij de hand zijn, om zoo wel de schaamdeelen der baarende, als de eigen handen, ter ondersaanninge, te besmeeren.

Maar wordt een Vroedmeester bij eene zwaare verlossing geroepen, zoo moet hij de werktuigen, in het tweede Deel beschreven, medebrengen: de Vroedvrouw of baker moet zorgen voor warm water, of, bij zwakke kinderen, voor warmen wijn, om het kind aftewasschen; ook moeten koolen en de bakermant gereed zijn, als mede eenige kommen met warm water.

Men moet mede voor de kleederen der barende zorgen, ook daarvoor dat het kind in de luuren gebragt kan worden: de baarende kan men op een bereiden schaaphuid leggen, of op vuile lakens, om het onderliggende bed, door de afloopende vichten, niet te bezoedelen.

Van de weeën.

De weeën eener baarende vrouw zijn pijnen, welken door de krampachtige samentrekkingen van de baarmoeder, van het middenrif, en van de buikspieren ontstaan, terwijl de baarende, tegen haaren wil, den adem moet inhouden, ten einde de vrucht tot het uitperfen te dwingen.

De weeën kan men, met betrekking tot haaren oorsprong, in drie classen verdeelen, naamlijk in waare, in onwaare, en in vermengde.

De waare weeën zijn waare krampachtige samentrekkingen der baarmoeder: zij zijn daaraan kennelijk, dat de baarmoedersmond zig, staande die weeën, verwijdt; de blaas van het lamsvocht vooruit schuift, en uitgezet wordt: zij neemen haar begin aan de lendenen, gaan benedenwaards naar de richting der baarmoeder, dat is naar den schoot der baarende, welke een gevoel heeft als of haar iet uit het lijf wilde dringen.

Onwaare weeën kent men aan een pijnlijk gevoel, omtrent de navel, of in den omtrek van het bekken, waardoor noch de baarmoedersmond verwijdt, noch de blaas met het lamsvocht uitgespannen wordt; kramppijnen in de darmen, ophooping van pis en drekstof enz. kunnen de oorzaak daarvan wezen.

Derzelver kenmerk is, dat de baarmoedersmond zig, bij haar aanwezen, niet verwijdt; in tegendeel heeft men dien daardoor nog meer samengetrokken gevonden.

Vermengde weeën zijn nu eens waare, dan eens valsche geboortepijnen, welken den baarmoedersmond of samentrekken, of verwijden, of ook wel eens onveranderd laten.

De waare weeën hebben, ten opzichte van den tijd waarin zij beginnen, ten opzichte van haare werking en eigenschappen, van de kunstoevenaaren onderscheidene bijnamen ontvangen: men noemt haar voorzeggende, aanvangende, beevende, en naaweeën: alle deeze zijn of zwakke, of middenmaatige, aanhoudende, of uitzettende weeën.

De voorzeggende weeën komen somtijds eenige weeken, somtijds eenige dagen vóór den tijd der geboorte, veelal des avonds, en gaan des nachts over, door het liggen op den rug: men moet voorzichtig zijn dat men deeze voorzeggende weeën niet voor waare weeën beschouwe, ten einde de zwangeren niet, noodeloos, tot het verarbeiden derzelven te vermaanen; want de mond der baarmoeder opent zig staande dezelve, bij eerstkraamenden, niet, en bij haar die meer gekraamd hebben, en eenen eenigzins open baarmoedersmond hebben, wordt hij door die weeën niet verwijd, om dat zij alleenlijk op den bodem der baarmoeder werken.

De eerstbeginnende geboorte-weeën zijn geheel zacht, kort, en zetten lang uit.

Deeze eerste voorbeduidende weeën beginnen met zekere pijnlijkheid, van de lendenen af, benedenwaarts in de richting der baarmoeder voordgaande, (zijnde wel niet staande de geheele verlossing aanhoudend, maar echter in ongelijke tuschenposingen, en van onderscheidene hevigheid vergezeld), in welke zig de baarmoedersmond eenigzins opent; de buik valt samen, en er ontstaat aandrang tot ontlasting van pis; uit de opgezwollene schaamdeelen wordt veel slijm ontlast; de daarop volgende weeën duuren langer, komen dikwijls, en zijn sterker: de baarenden zeggen, dat haar het kruis als 't ware stuk breekt; het onderste gedeelte van den vliezigen zak, waarin het kind ingesloten is, wordt door den mond der baarmoeder in de schede gedreven — deeze zijn de voorbereidende weeën — nu bedaaren dezelve een tijd lang, worden kleiner en minder; doch hierop beginnen zij sterker en dringender te worden, zij persen met groote hevigheid op de baarmoeder, en deeze weder op het kind, zoo dat nu de vliezige zak meerder, en tot barstens toe, gespannen wordt, tot dat eindelijk hier nog eene rilling, knersing der tanden, en beeving der knieën bijkomt: nu wordt het hoofd tot op den schaambeensboog gebragt, dewijl hetzelfde voordrukt, draajende zig als het ware, om den kruin, als om een as; komt met het aangezicht eerst ten voorschijn, en zoo wordt het kind,

onder geleide van eenen bloedvloed, geboren: bij deeze beevende weeën siddert de baarende met het geheele ligchaam; de knieën beeven, en deeze weeën zijn nu op het hevigste, zijn zeer sterk en langduurig, en volgen schielijk op elkander; (*) de baarende moet (zij wille of niet) haaren adem inhouden, en op dat geene, wat in het hol der baarmoeder geplaatst is, drukken: dit drukken noemt men, het persen eener baarende vrouwe.

Dit persen bestaat alzoo uit eene sterke inademing, waardoor het middenrif en de buikspieren, deels willekeurig, deels krampachtig, met een groot geweld, op de zig samentrekkende baarmoeder drukken, 't welk gevolglijk dit samentrekken der baarmoeder met alle de gevolgen der samentrekking vermeerdert.

Het verwijden van den baarmodersmond, het uitpuilen van het water; het breeken der vochtblaas, het nederdrukken der voorhanden zijnde vrucht, met één woord, de geheele verlossing, wordt door medewerking der baarende vrouwe, zeer veel bevorderd.

Het persen zonder waare weeën is van geenerleie goede uitwerking, ja daar het zeer afmattende is, de hitte en derhalven den omloop der vochten vermeerdert, zoo kan het ontijdig overdreven en onnoodig persen der baarende vrouwen zeer schadelijk, althans der geboorte niet bevorderlijk zijn.

Dus moet dan eene vrouw de eerste weeën met weinig moeite, maar naarmate dezelve langer en sterker worden, sterker verarbeiten, indien anders de geboorte en ligging des kinds natuurlijk is.

Maar is die ligging tegennatuurlijk, dan moet men de baarende alle persen verbieden; zij moet trachten de weeën, zonder medewerking, voorbij te laten gaan; want hoe meer dezelve het kind, in eene tegennatuurlijke ligging,

(*) Op het hevigste zijn de weeën, wanneer de basis des bekkeneels over den voorberg des heiligen beens gaat, om dat de baarmodersmond dan meest verwijd is: naderhand zetten de weeën een tijd lang uit, om dat dan de hals der vrucht, welke minder dik dan het hoofd is, in de schede geplaatst is: het ophouden der weeën is de baarende vrouw zeer aangenaam, en nuttig, om dat zij tijd wint, tot het verzamelen van nieuwe krachten, ten einde des te sterker de laatste beevende weeën, welken de sterksten zijn, uithouden en te verwerken.

in het bekkenhol neêrdrucken, hoe moeilijker het keeren der vrucht wordt, dewijl daardoor al het lamsvocht uit het hol der baarmoeder ontlast wordt, en de baarmoeder zig geheel om de vrucht samentrekt.

De wilde weeën moet men de vrouwen ook niet laten verarbeiden, maar dezelve door de, in het tweede Deel deezes Werks, aangewezene middelen, verhelpen.

De naweeën zijn die samentrekkingen der baarmoeder, welken zig, kort naa dat het kind geboren is, op nieuw verhellen, en dienstig zijn om den moederkoek uittedrijven.

Het vocht.

Zoodra de waare weeën den baarmoedersmond verwijden hebben, voelt men in denzelven eene met vocht opgevulde blaas.

Deeze blaas heeft juist de grootte van den verwijden mond der baarmoeder: buiten de weeën is zij slap, maar staande dezelve wordt zij sterk opgespannen.

Bij eene natuurlijke hoofd-geboorte moet de blaas rond, klein, hard en gespannen wezen; zij moet van zelve breeken, als de geheele mond der baarmoeder door het hoofd des kinds verwijden wordt.

Het water moet op ééns breeken, en omtrent eenige oncen bedraagen — men onderscheidt deeze vochtblaas in een goede en in eene gebrekkige: het afloopende vocht kan men onderscheiden in het waare en in het valsche.

Eene kwalijk gevormde waterblaas is eene lange, of eene breede en flappe blaas, welke zig staande de weeën niet sterk opspant, langzaam breekt, en waaruit geene groote hoeveelheid van water op eenmaal uitspoot, maar dat zig geduurig, voor en naa, ontlast: dit noemt men het sluipend water.

Het water van deeze soort, is het kenmerk van een scheefstaand hoofd, of eene kwaade ligging des kinds.

Daar nu dit vocht het beste middel is, om door hetzelfde den mond der baarmoeder langzaam te verwijden,

en zoowel deeze als de fchede glibbrig te maaken, zoo moet men, in eene tegennatuurlijke geboorte, het water nooit met opzet breeken, maar hetzelve alleenlijk aan den zorg der Natuur overlaaten.

Het vocht wordt, ten opzichte van den kleur, verdeeld, in goed of slecht gekleurd vocht: het goed gekleurde is gelijk aan melkhui; het slecht gekleurde is, daarentegen, groen geel.

De gevallen waarin men het water moet breeken, zijn zes in getal: naamlijk 1) als de vliezen te dik en te taai zijn, dan dat dezelve met het vocht buiten de fchaamelheid zouden uitpersen: 2) als de vrouw te veel vocht heeft, hetwelk haar eene flapte der baarmoeder veroorzaakt: 3) als de geboorte, wegens een wijd bekken, zeer fchielijk gefchiedt: 4) als men het kind moet keeren: 5) als er een bloedvloed, of, 6) als er ftuipen plaats hebben, veroorzaakt door de groote gevoeligheid van den baarmoedersmond.

Van deeze zes gevallen zullen wij, bij het leerftuk der zwaare geboorte, opzettelijk fpreeken.

Men breekt de vliezen of het water, indien men met den vinger, onder de weeën of vlaagen, tegen het hoofd des kinds drukt.

Maar zijn de vliezen te taai, zoo kan men haar met de nagels der vingers ftukken knijpen; of, is de vochtblaas reeds zoo ver dat men haar ziet, zoo kan zij met de fchaar doorgeknipt worden.

Zo eene Vroedvrouw, nog vóór het breeken van 't water, ziet, dat er eene tegennatuurlijke verlosfing zal gefchieden, waarbij een Vroedmeester noodig is, zoo moet deezen nog vóór het breeken der vliezen geroepen worden; om dat de tegenwoordigheid van het lamsvocht het werk zeer vermindert.

Voor het overige is het een onnozel zeggen, of een vooroordeel, dat er kinderen zonder lamsvocht in de baarmoeder kunnen weezen (*).

(*) Sommige Vroedvrouwen gelooven zekerlijk, dat er vruchten zonder het lamsvocht zijn: een voordwendfel, dat ik a 100, bij kwalijke verlosfingen moest hooren; dan, in dit geval fliipt het water, door de flichte ligging des kinds,

Het geen nu gezegd is, is te verstaan van het waare lamsvocht, het welk in 't hol van het lamsvlies, naast de vrucht, geplaatst is: van het zogenaamde valsche water dient geweeten te worden, dat het een helder, tusfchen de vliezen der vrucht, of tusfchen de baarmoeder en het buiten-vlies des kinds, geplaatst vocht is, het welk dikwijls veele dagen, fomtijds ook slechts eenige uren, vóór de geboorte ontlast wordt; dat het helder is, gelijk ik reeds gezegd heb, en geene slijmige vlekken, gelijk het waare vocht, in 't linnen naalaat: dit, soms eenige dagen vóór de geboorte zig ontlastend vocht, veroorzaakt der baarende vrouwe dikwijls geen geringen schrik; echter gaat het van geenig gevaar hoegenaamd vergezeld: is dit valsche water tusfchen de baarmoeder en het buitenste vlak van het vaatvlies geplaatst, zoo gaat het, in den laafsten tijd der zwangerheid, fliipend af; maar dat, hetwelk tusfchen de twee vliezen der vrucht geplaatst is, wordt, in korten tijd, en dikwijls onder de weeën, duidelijc voelbaar, met eene breeking der vliezen, even als het waare lamsvocht zig ontlast, het welk ik eenige keeren zeer duidelijc waargenomen heb.

Door het onderslaan der nog tegenwoordig zijnde vochtblaas erkent men, ontwijfelbaar, of het waare dan of het valsche vocht ontlast is: daarenboven moet men onderzoeken, of het vocht natuurlijc, zonder reuk, of zonder rotting, dat is niet stinkend is, waaruit men den toefland der vrucht kan opmaaken, naamlijc of dezelve levendig, dan reeds dood is: het met het *meconium* vermengde vocht, is meestal een teken dat het kind met den fluit vóór de geboorte ligt.

langzaam en onbemerkt uit de baarmoeder, daarom vindt men weinig, of geheel geen water, als het met de geboorte lang aanhoudt: is het hoofd te groot, zoo perst zig voor hetzelfde weinig waters aan, en de vliezen van het vocht kleeven er aan vast: ook in dit geval hebben Vroedyrouwen geloofd, dat bij het kind geen water is.

De ligging tot de geboorte.

In natuurlijke geboorte is voor eene baarende vrouw verkiezelijk, de geboortestoel, het kunstige geboortebed, of, en beter, een rustbank of ledikant, dewijl laatstgemelden aan alle zijden eenen vrijen toegang vergunnen.

Bij eene tegennatuurlijke geboorte, wanneer het kind gekeerd, of als er eene kunstbewerking gedaan moet worden, moet men gebruik maaken van het kunstbed, of de lijderes dwars op het bed leggen.

Eene vrouw kan de eerste weeën liggende, zittende of staande verarbeiden; maar men moet, hoedanig de plaatsing ook zij, de lendenen ondersteunen, en de bovenste en onderste leden vasthouden, op dat zij genoegzaam persen kan.

Op een bed, rustbank of ledikant, legt men de vrouw op de linker-zijde, en men maakt een touw of koord aan het voeteneind der bedstede wel vast, het einde van dit touw moet de lijderes in de hand neemen, om zig onder de vlaagen daarbij vasttehouden: men laat de lendenen door een' helper ondersteunen, en de knieën moeten tegen het lijf gebogen worden: door dusdanige ligging worden de spieren van den buik, van de lendenen, het darmbeen en de deiën verflapt.

Zit de vrouw op den geboortestoel, zo moet zij de ruggestreng tegen de leuning van den stoel ondersteunen, de handen aan de twee armen, of handvatfels des stoels, houden, en de voeten op de aan denzelfen zig bevindende voetbank zetten.

Om dat de knieën onder de weeën en het persen sterk beeven, moet de lijderes zig, hoedanig de ligging ook zij, door eene helpende hand, in ieder vlaag, laten vasthouden.

De beste soort van eenen geboortestoel, of een kunstbed, is die, welke door den Heer Profesfor *STEIN*, een der beroemdste Verloskundigen in *Duitschland*, is uitgevonden: zie zijne korte beschrijving van een nieuwe geboortestoel en bed: om een goed begrip van beiden te hebben, zijt

dezelven, op de eerste Plaat achter dit werk, in zijn geheel voorgesteld.

Zoo haast het hoofd door de weeën in de schede is gedreven, zoo dat het door de twee leden des wijsvingers gevoeld kan worden, is het tijd, om de vrouw in de ligging, tot de verlossing dienstig, te brengen. (*)

Nu moet men de vrouw, als er geene tegen-aanwijzing plaats heeft, laten verkiezen, in welke ligging zij baaren wil; 't best is op de linker zijde, om dat het gemaklijk voor de helpende hand is; doch in de ligte en natuurlijke geboorte is de ligging bijna het zelfde.

Die geenen welken aan eene schielijke geboorte-uitzaking, of breuk, onderhevig, of ook zwak zijn, een bloedvloed, jigt, en dergelijke hebben, moeten nooit in den stoel, maar altoos in het bed verlost worden: de vrouwen zijn in den stoel meer aan koude onderhevig, en krijgen naa de verlossing, sterke rillingen: echter is het ook waar dat de vrouwen de weeën, in den stoel, sterker kunnen verwerken dan in het bed.

De baarende moet tot het voorkomen des hoofds, uit den uitgang des bekkens, recht op zitten (beter is het echter te liggen, om dat bij het zitten, het hoofd te veel tegen de bilnaad wordt aangeperst), maar zoo als het hoofd in den uitgang des bekkens treedt, moet de geboortestoel van achteren verlaagd worden, om de lijderesse eene horifontale ligging te geeven: aldus begeeft zig het hoofd des kinds ligter onder den boog der schaambeenderen heen, en indien het dus voordgaat, kan de bilnaad door hetzelfde niet inscheuren.

Wanneer men derhalven een rustbank of ledikant heeft, is

(*) Eenige Vroedvrouwen zijn gewoon, om, naa het breeken der vliezen, de vrouw in de houding tot het persen dienstig, te leggen, haar daartoe aantemoedigen, en daarmede niet afteelaaten, voor dat de verlossing gedaan is; maar daar bij zwaare verlossingen de vliezen dikwijls eenige dagen vóór de geboorte barsen, is het vroegtijdig aanpersen tot de verlossing volstrekt vermoedend en schadelijk; somtijds gaat het hoofd des kinds tegelijk met het water af, somtijds volgt het op eenige weeën, naa dat de vliezen gebroken zijn: waaruit de bedriegelijkheid deezer regelen blijkt: van daar ook het zeggen dat de vrouw twaalf of meer uren in arbeid heeft gezeten, of ook dat de zij in tegenwoordigheid der Vroedvrouw, het kind bijnaa op den grond heeft laten vallen.

is het altoos minder omslagtig, en voor de baarende nuttiger, dewijl zij de weeën sterker verarbeiden kan, en naa dat dezelve wat bedaaren, zig gemaklijker kan nederleggen om te rusten; ook behoeft men haar niet zoo veel te ontblooten.

Dit liggen is alzoo voor het kind, voor de moeder, en voor den helper, verkiezelijk; ook is het nuttig bij het keeren des kinds: bij het geiniss van een rustbank, moet men zig van het zoogenaamde korte bed bedienen, waarvan wij, in het leerstuk over het keeren der vrucht, meer zullen zeggen.

Voor het overige kan eene vrouw ook, in dergelijke legersteê, vierderleie liggingen neemen; naamlijk op den rug, op de rechte, of op de linker zijde, op de knieën en elleboogen: de laatste zullen wij voortaan de buikligging noemen.

Van wat nut deeze liggingen zijn, en in welke gevallen men dezelve noodig heeft, zullen wij bij het handelen over de tegennatuurlijke verlosingen zien.

Over de hulp in de geboorte.

Heeft men de tot hier beschrevene algemeene omstandigheden wêl ingericht, en heeft de baarende vrouw het hoofd des kinds zoo ver in het hol van 't bekken ingeperst, dat men het met den halven wijsvinger kan voelen, zoo brengt men de lijderes in de, tot de geboorte bepaalde, ligging.

Wordt zij in den stoel verlost, zoo moet op den grond, onder het lijf der vrouwe, iet gezet worden, waarin het tegenwoordigzijnde vocht, en dat, hetwelk zig naa de verlossing ontlast, ontvangen kan worden.

De Vroedmeester ontbloot nu den arm, en bedekt zig tot op de voeten met een laken, doet een lederen voorschoot aan, ten einde zig niet met het, onder de verlossing ontlastend vocht, te betmetten.

Dus gekleed zet hij zig op eenen laagen stoel, tussehen

de beenen der baarende, in dier voegen, dat hij met zijnen schoot recht onder de schamelheid geplaatst is.

Eene helpster houdt van achteren, door de uitsnede van den stoel, de lendenen en het kruis der baarende.

Eene andere hulp, of ook wel twee, houden de bevende knieën vast, de overige aanwezenden zorgen, om, op bevel des Vroedmeesters, het noodig gereedschap afantegeeven.

Het gewoone gebruik, dat eene helpster de baarende, onder iedere wee, de schouderen naar beneden drukt, op dat zij geen dikken hals zoude krijgen, is overtollig; want eene bescheiden baarende vrouw kan dit zelve verrichten; en de menigte van vrouwen, welken de lijdere omringen, veroorzaaken haar meer wanorde en beangstiging, dan voordeel, voornaamlijk door haar gewoon nutloos, overstandig gesnap: het sterke buikhouden dat zij wel eens, voorgeeven te doen, is pijnlijk, en dient tot niets.

Zoo als de Vroedmeester nu waarneemt dat het hoofd des kinds op de bilnaad begint aftezakken, en dezelve naar buiten drukt, zoo moet hij deeze onder ider vlaag met een met pomade besmeerden linnen drukdoek ondersteunen.

Nu wacht hij verder af dat de weeën het gehele hoofd uit de schamelheid geperst hebben; laat hier op den linnen drukdoek, waarmede hij de bilnaad ondersteunt, wegvallen, en vat het hoofd ter zijde om de ooren, zoo dat hij hetzelfde behoorelijk naar zig kan trekken.

En alzoo wordt het kind in zijnen schoot geperst.

Daar dit alleenlijk het natuurlijk verlossen op den geboortestoel betreft, en hier te Lande weinig op die wijze verlost wordt, zullen wijser nog bijvoegen, iet over het behandelen der verlossingen ter deezer stede, waarbij wij zullen zien, hoe veel gemakliker en voordeeliger voor de baarende, en nietminder voor de helpende hand, deeze dan de andere wijze is:

Zoodra de Vroedvrouw, aan de voorgemelde tekenen ziet dat de geboorte zal voordgaan, wordt de baarende

op een ledikant, rustbank, of ook in eene bedstede gelegd; op een matras, gedekt met een laken, ook wel met nog één of twee vuile lakens, of een oude deken op hetzelfde; zij ligge naa genoeg horifontaal op de linker zijde, en de knieën naarboven krom getrokken: een ander laken, in drieën gevouwen, wordt de lijderes los omgelegd; de Vroedvrouw plaatst zig voor het bed aan het voeten cinde, vóór den rug der baarende; met de eene hand ondersteunt zij door een op de hand liggenden drukdoek, de bilnaad; moedigende de lijderes aan om de weeën te verarbeiden: eene andere helpende hand, ondersteunt de baarende in de lendenen en het kruis: wordt nu het hoofd des kinds, door de schede heen, naar buiten geperst; zoo omvat de vroedvrouw het hoofd op de navolgende wijze: de eene hand legt zij, oplitgenderwijze, onder de kin, de andere onder het achterhoofd aan den hals, hierop maakt zij den eenen arm des kinds uit de schede los, ondersteunt dan het kind, door dat zij op de eene hand de kin, of anders ook de borst van het kind laat rusten; nu omvat zij het kind van vooren op de borst, van achteren op den rug, haalt het verder uit, en bindt den navelfstreng, knipt denzelven door, en geeft het kind aan de baker over.

Op deeze wijze wordt de geboorte des kinds volbragt: daarop nu volgt het wegneemen van den moederkoek, de bezorging van het kindjen, en van de verlostte vrouw: 't een en ander zal ik nu vervolgends beschrijven.

Het uithaalen van den moederkoek.

Bevindt het kind zig nu geheel buiten het ligchaam der moeder, zoo moet men zijnen zorg richten naar het ontlasten van den moederkoek, dan naamlijk, wanneer er geene tekenen van een tweeling zijn.

Meestal drijven de naweeën der zig samentrekkende baarmoeder den moederkoek van zelf naar de geboorte af, en kan men de Natuur, met een goed gevolg, toe

hulpe komen door de lijderes, het reeds genoemde; in drieën gevouwen, laken, om 't lijf aantefluiten; hierdoor helpt men de spieren van den buik, wier veerkracht door de zwangerheid verminderd is, en bewerkt men tevens dat de weeën sterker op de baarmoeder werken, om den nog in zig houdenden moederkoek uitte-drijven: daarna wacht men een quartier of een half uur.

De tegenwoordigheid der naweeën, de afloop des bloeds, en het gevoel van de zig samentrekkende, baarmoeder, toonen aan, dat men de nageboorte zekerlijk volbrengen kan.

Men moet den moederkoek nooit afhaalen, bevoorrens de baarmoeder zig heeft samentrokken; men ontdekt dit samentrekken als volgt: indien men één of twee handen op den buik der vrouwe, onder de navel legt, en onderzoekt, of de baarmoeder zig, tusfchen deeze en het fchaambeën, als een vliezige bol heeft samentrokken, zoo is dit het eenigfte, en zekerfte teken, dat de behoorelijke tijd tot het uithaalen van den moederkoek daàr is.

Heeft nu de baarmoeder zig samentrokken, en de moederkoek van dezelve losgelaten, zoo is de beste wijs, om deezen aftehaalen, de volgende:

Men windt den navelftreng om twee vingeren van de rechter of de linker hand, fluit dan de hand dicht, gaat daarop met den wijs- en middenften vinger der andere hand, langs den navelftreng, door de fchede, in den baarmodersmond, en drukt met die hand den streng uit den moedermond, achterwaards naar het heiligbeën: de andere hand, om wier vinger de navelftreng gewikkeld is, moet een weinig opgeligt worden, en zoo trekt men, echter niet te sterk, aan den navelftreng: onder deeze bewerking kan men door eene helpende hand, den buik der kraamvrouwe zachtlijk laten wrijven.

Voelt men nu dat de moederkoek zig, op zulk eene wijze, laat aftrekken, zoo vat men met de, in de fchede zijnde vingers, den moederkoek zelven, en trekt dien vervolgens met de aanhangende vliezen der vrucht, geheel uit de fchede.

Kan men op deeze wijze den moederkoek niet naar buiten brengen, zoo moet men ten eersten het sterk trekken aan den navelfstreng nalaaten, en zig richten naar het geene, in 't vervolg, over het terugblijven van den moederkoek zal gezegd worden.

Heeft men eindelijk den moederkoek naar buiten gebracht, zoo beziet men denzelven wel naauwkeurig, naamlijk of hij in zijn geheel is, en of zijne kleur en zelfstandigheid natuurlijk en gezond zijn; want uit den toestand der nageboorte kan men den toestand der baarmoeder opmaaken.

Over het terugblijven van den moederkoek.

Dat de moederkoek en vliezen der vrucht, zoo wel naa de natuurlijke als naa de tegennatuurlijke verlossing, door de nawecën en de geheele samentrekking der baarmoeder, of van zelven uitgedreven, of door eene zachte trekking aan den navelfstreng uitgetrokken kan worden; hebben wij zoo even gezien; ook zijn de tekens opgegeven, uit welken men kan opmaaken, of de baarmoeder zig heeft samentrokken, en de moederkoek losgelaten heeft, hetwelk veelal of onder de geboorte, of een quartier of een half uur naa dezelve geschiedt.

Echter zijn er gevallen, zoowel naa de natuurlijke als ook naa de tegennatuurlijke; naa zwaare als ook naa vroegtijdige verlossingen, waarin men noch door het sterk trekken aan den navelfstreng, noch door 't wachten van een geruimen tijd, den moederkoek naar buiten kan brengen: dezelve kan of nog geheel aan de baarmoeder vastzitten; of hij kan voor een gedeelte, of half, of geheel van dezelve los zijn, en zig, zoo los, in de baarmoeder ophouden.

De oorzaaken der zwaarigheden in het uitbrengen des moederkoeks zijn of in deezen zelven, of in de baarmoeder te zoeken: eene krampachtige samentrekking des baarmoedersmonds, deszelfs zwelling, eene verlamde zig niet samentrekkende baarmoeder; eene bijzondere inzakking

der baarmoeder over den moederkoek, 'en het scheefstaan; zijn de gebreken aan de baarmoeder.

Als de moederkoek te groot is, of, als bij tweelingen beide koeken aanëen gegroeid zijn; als de moederkoek zig van de baarmoeder, wegens zijnen vasten samenhang, naa de geboorte, niet allost (gelijk in ontijdige geboorten;) dezelve niet aan den bodem, maar op eene andere plaats der baarmoedersholte is vastgehecht; als dezelve uit den onderrand zijn begin neemt; als de navelstreng afscheurt, zoo legt de oorzaak der zwaare uitbrenging aan den moederkoek zelven: in alle deeze gevallen moet men onderzoeken, of de moederkoek geheel, half, of voor een klein gedeelte los is, dan wel nog geheel aan de baarmoeder vast zit: dit onderkent men zeer ligtlijk door de hand, welke in het hol der baarmoeder gebragt is.

Vindt men den moederkoek geheel los, 't welk men uit de kraamzuivering, uit de naweeën, uit een bol rond ligchaam, hetwelk door de baarmoeder boven het schaambeek wordt gemaakt, kan besluiten, zoo vat men denzelven aan den rand, sluit hem tuschen de vingers, en trekt hem dus langzaam uit; maar kan de hand, wegens eenen kramp in den baarmoedersmond, niet in de baarmoeder gebragt worden, zoo moet men de lijderes pijnstillende middelen geeven, en haar in een laauw-warm half bad zetten; maar is de moederkoek nog geheel vast aan de baarmoeder gehecht, zoo moet men denzelven nooit met eenig geweld aftrekken, maar hem alleenlijk aan de Natuur overlaaten, tot dat hij zig zelven los maakt.

Trekt men eenen nog vastzittenden moederkoek geduurig aan zijnen streng, zoo brengt men hem wel naar buiten, maar door dit ontijdig aangebragt geweld, trekt men ligtlijk de binnenste vlakke der baarmoeder mede naar buiten, zoo dat somtijds de geheele baarmoeder, als eene slaapmuts die bij zijnen punt aangevat is, omgekeerd, buiten de schamelheid hangt: onkundige Vroedvrouwen hebben wel eens de omgekeerde en naar buiten hangende massa der baarmoeder voor eene *mola* aangezien, en tot groot nadeel der ongelukkige moeders met geweld aan dezelve getrokken, waarop de gevaar-

lijkste toevallen volgen kunnen, als eene vreeslijke bloeding, ontsteeking der baarmoeder, verettering, verharding, versterving, zweeren, kanker, en laatstlijk de dood.

Het verschil tusschen eene *mola* en eene omgekeerde baarmoeder is ligtlijk te kennen; want eene *mola* is ongevoelig als men er aan knypt; heeft niet die oneindig veele openingen in haare vlakke, welken geduurig bloed ontlasten, en voelt men op de zijde van eene *mola* in de schede, zoo kan men zeer ligt in den moedermond, en in het hol der baarmoeder komen; daar men in tegendeel bij eene omkeering der baarmoeder, eenen blinden, de stompen hoek in de schede gewaar wordt, welken met de schede vereenigd is.

Wordt men in zulk een toeval geroepen, zoo moet men aanstonds de omgekeerde baarmoeder met eenen fijnen, met vet gesmeerden linnen lap, geheel bedekken; voords twee vingers naast de baarmoeder in de schede brengen, en zig nu eens aan de eene, dan eens aan de andere zijde bevljtigen, om de omgekeerde baarmoeder opwaards te drukken, ten einde dezelve weder, van buiten naar binnen, omtekeeren.

Het is een groote misflag, als men het naar binnen drukken in 't midden deezer masfa begint; want daardoor kan men dezelve in 't geheel niet inbrengen, en men verwekt, door de ruwe aanvatting, de kwaadaarstigen toevallen.

Heeft men nu het inbrengen, op de zijde, grootendeels ten wege gebragt, zoo brengt men de eene hand, wèl besmeerd, in het midden der baarmoeder, om dezelve zig te doen ontwikkelen; men laat de hand een tijd lang in het hol van dezelve; laat de buik intusschen wrijven, tot dat men voelt dat de baarmoeder zig samentrekt; en nu is het tijd, om de hand terug te haalen.

De baarende vrouw moet hierop eenige dagen stil liggen; geduurig moet men haar, zoo wel staande als naa het terug brengen der baarmoeder, geestige zenuwmiddelen laten rieken en inneemen; want somtijds zijn er sterke bezwijmingen en beklemmingen der borst aanwezig, en een gevoel, als of aan het hart geknepen wierde, (gelijk

zij zig gemeenlijk uitdrukken): zekere Verloskundige van den eersten rang, heeft waargenomen, dat zulk eene vrouw over bezwaarlijke ademhaaling klaagt, en spoedig daar op sterft. (*)

Eenige Schrijvers stellen wel vast, dat het terugblijven des moederkoeks, vree-lijke toevallen ten wege brengt, zoo wel als het geweldig lostrekken van denzelven: maar de ondervinding van de geoefendste Vroedmeesters wederlegt deeze meening rechtstreeks: de Heer **LEBMACHER** heeft den moederkoek, zonder nadeel of enig kwaad gevolg, 6, 8, 10, ja 15 dagen in de baarmoeder zien blijven: ik heb hem eenmaal 4 dagen, en op een andermaal 5 dagen, ook zelfs 7 dagen in de baarmoeder gelaten — De Heer **WEIZENBORN** zegt, dat men de nageboorte altoos, in alle omstandigheden, zonder enig gevaar, aan de Natuur alleen overlaaten moet, en dat deeze, het zij vroeg of laat, zonder kunst-hulp, denzelven uitsloot: van gelijk gevoelen zijn **OSIANDER** te *Göttingen*, en **V. DER HAAR** — Even als mijn waarde Leermeester, de Heer **LEBMACHER**, heb ik waargenomen, dat alleenlijk die vrouwen met een teruggeblevenen moederkoek, aan eene ontfeeking van den baarmoeder slierven, bij welken verscheiden Vroedvrouwen vruchtloos getracht hadden den moeder-

(*) De zenuwen der baarmoeder hebben op de zenuwen van het hart, en op die der longen, eene groote werking — Niet zelden ontstaat het schielijk sterven der baarende vrouw door eenen bloedvloed, scheuring of verlamming der baarmoeder: de door eenen onnatuurlijken bijstand gellorvene vrouwen hebben geen teken van bererte of andere ziekten aan den gebad: die voorwerpen wier schielijke dood vergezeld was van bezwimmigen en een scheuring der baarmoeder; doch waarbij ik geen grooten bloedvloed zag, hebben mij dit geleerd; en ook heb ik bij eene niet zwangere vrouw, door het inbrengen eener niet omgekeerde, maar sterk en geheel niet getrokken baarmoeder, eenen schielijken dood zien ontstaan, offchoon een der minste Heelmeesters, het terugbrengen ligtelijk deede, en zijne liederes veld bloed verliete, zonder kwaad gevolg te vreezen: de liederes was, naa het terugbrengen, eerst zoo wel, dat zij eenen snuiffen vrasde, en terwijl zij het zelve in den rook optook, streef zij schielijk, ja nauwelijks een half uur naa de terugbrenging, met eenige trekkingen: De Heer **HALLER** zegt: „De wonden der baarmoeder veroorzaken de hevigste toevallen, en een „spoedige dood”: en **IG. J. H.** heeft de wonden der baarmoeder, met de wonden van het hart vergeleken, wegens de gelijkheid der toevallen.

BLUMENBACH zegt: „De menigte der zenuwen van de baarmoeder is zeer groot, waardoor de medewerdige medelidenheid der baarmoeder, met de meeste deelen des lichaams, wordt onderhouden.”

koek uittrekken; en in de ligchaamen van de, aan de bedoelde toevallen gestorvenen, heb ik, meestal, alleenlijk aan de mond en hals der baarmoeder, de ontsteeking waargenomen.

Heeft men zig nu bepaald om den moederkoek terug te laten, zoo moet men alle geweldige pogingen, om denzelven los te maaken, vermijden, en alleenlijk aderlatingen (zoo het noodig is), klyfteen, weekmaakende pappen, inspuitingen met azijn en water, of het afstrekfel van *china*, wrijvingen, lauwwarme half baden, en uitwendige *antiphlogistische middelen*, gebruiken, om de ontsteekingen der baarmoeder voortekoomen, en vervolgens de geheele losfing van den moederkoek aan de Natuur overlaaten, tot dat hij van zelve, of door zachtlijk aan den navelstreng te trekken, uit de baarmoeder ontlast wordt: maar heeft de moederkoek zig half los gelaten, 't welk men aan den hevigen bloedvloed waarneemt, zoo moet men den buik wrijven, het fluitlaken fterk aanhaalen, waaronder dikke drukdoeken, van buiten op de baarmoeder geplaatst zijn, koud water met azijn over den buik en de deiebeen en leggen, het zelfde in de baarmoeder inspuiten, inwendig tinctuur van caneel of dergelijken geeven, tot de bloeding ophoudt, en de baarmoeder zig famentrekt; dan gaat veelal de moederkoek van zelve weg, of men kan hem met geringe moeite uithaalen.

Er zijn gevallen, waarin eene misvormige gedaante der baarmoeder ontstaat, wanneer naamlijk op die zelfde plaats, waar de moederkoek vastgehecht is, dezelve lam wordt, en het overige gedeelte zig famentrekkende, den moederkoek als het ware in eenen bijzonderen zak insluit: gaat men dikwijls en gestadig met de hand over de opening van deezen zak heen, zoo twijfelt men den moederkoek te ontdekken: in dergelijk geval moet men zig naauwkeuriglijk naar den navelstreng richten; deeze is de zekerste wegwijzer naar den zak, en den moederkoek.

Wat de genezing aangaat, men gebruikt het half-bad; maar men inwendig opium heeft gegeven; men poogt

de opening van den zak, met den vinger, meer en meer te verwijderen, tot dat men eindelijk den moederkoek langzaam naar buiten brengt.

Over de bezorging eener kraamvrouw.

Als eene vrouw van haare vrucht en van den moederkoek verlost is, wordt zij *kraamvrouw* genoemd.

Het rechtmatig verzorgen eener kraamvrouw in de zes niet natuurlijke, en de rechtmatige verzorging, in de natuurlijke omstandigheden des kraambeds, maaken, naa de geboorte, de laatste bezigheid des Vroedmeesters uit: is de baarmoeder van de vrucht en van den moederkoek ontledigd, zoo moet men ten eersten de schaamdeelen met warm boterbier zuiveren, dezelve en den ingang der schede ook met warme doeken voor den toegang der lucht bedekken.

Maar zijn de schaamdeelen door eene zwaare verlossing gekneusd, gezwollen, en ontstoken, zoo moet men salie met wijn, en ongezoute boter kooken, de drukdoeken daarmede bevochtigen, dezelve weder uitdrukken, en ze dan op de schaamdeelen en tegen den ingang der schede leggen.

In het bed, boven op het laken, en ter plaatse alwaar de kraamvrouw komt te liggen, moet men, een opgevouwen laken leggen, eerst warm gemaakt, om de ontlasting der kraamzuivering in hetzelfde te ontvangen, zonder het bed morsig te maaken.

Het bed zelf, als ook de lakens, moeten warm gemaakt worden; koude, en te groote hitte, doen de kraamzuivering te lang aanhouden.

In dit bed moet de kraamvrouw naa de verlossing gelegd worden: zij moet gemakkelijk liggen, met de beenen recht uit, en niet over elkander geslagen, echter moet zij dezelve ook niet te veel vanéen strekken: voorts moet zij stil liggen, niet veel spreken, en als zij slaapen wil en kan, moet zij daarin niet verhinderd worden.

De onderliggende lakens moeten tweemaal daags veranderd worden: de kraamzuivering neemt, door de warmte van het bed, ligtlijk eene kwaaden reuk aan, 't welk zeer nadeelig voor de kraamvrouwen is, daarom moet men haar dagelijks de schaamdeelen met warme melk en water zuiveren.

Het hemd der lijderesse moet men tot omtrent op de hoogte van de navel opspelden, en het onderste gedeelte des ligchaams met een laken omwinden; dit laken kan men, als 't vuil geworden is, gemakkelijk wegneemen.

Om haar rust te verschaffen, moet alle gesnap vermijd; vengsters en deuren moeten dicht gehouden worden, en met gordijnen behangen zijn, op dat door het in- en uit-gaan der menschen, de koude lucht niet op de kraamvrouw valle: de geene die uit eene koude lucht komt, mag niet aanstonds bij haar gebragt worden.

De lucht in het vertrek moet altoos gelijkmatig zijn: de koude en overtollige hitte in de vertrekkén zijn der kraamvrouwen zeer nadeelig, om dat het een of ander oorzaak kan wezen van eene ontsteeking der baarmoeder en der borsten.

Een kraamvrouw is over 't geheel zeer gevoelig; alzoo moet haar niets bejegenen, dat aanleiding kan geven tot verdriet, droefenis, of al te groote vreugde; want dit is dikwijls oorzaak van doodelijke ziekten.

Tot spijs moet eene kraamvrouw, van de verlossing af, tot naa de voleindiging der melk-koorts, alleenlijk vleeschmat, gekookte fruit, of melk met wittebrood, van drie tot drie uren, gegeven worden: alleenlijk de zwakken, en die, welken door eenen bloedvloed veel geleden hebben, moeten voedende spijsen eeten: naa dat de melk-koorts over is, kunnen zij gebruik maaken van goed vleesch en van meelspijsen.

Water is het beste drinken voor eene kraamvrouw; dan het moet nooit geheel koud zijn: naa de melk-koorts kan men haar goed bier, of wijn met water laten drinken, naamlijk die vrouwen, welk zulk drinken gewoon

zijn; doch des morgens vroeg en 's avonds, zijn eenige kopjens van een aftreksel van den heemstwortel, om de uitwaasfeming te onderhouden, zeer goed.

De ontlasting moet in de eerste dagen, in 't bed, op een ondersteekbekken gedaan worden, op dat de kraamvrouw niet, door opteslaan, koud worde: heeft zij, in vier-en-twintig uren naa de verlosling, geene ontlasting gehad, zoo is haar, een uit melk, olie, en suiker, weekmaakende klysteer noodig; daardoor wordt niet alleenlijk de ontlasting, maar ook de hitte, welke bij de melk-koorts plaats heeft, zeer verminderd.

Die kraamvrouwen, welken zelven haar kind zoogen willen, moeten, in de eerste veertien dagen, de borsten altoos met een vierdubbeld serviet, wèl bedekt houden; zij moeten voords een borstrok aanhebben, welken zij van onderen naar boven vastmaaken, waardoor de borsten ondersteund, en mede voor de ontblooting bewaard blijven; zij moeten noch zalven, noch pleisters, noch oliën, noch kruiden op dezelveu leggen, 't welk niet dan kwaade borsten veroorzaakt.

De eerste waterachtige melk moet niet uitgezogen worden; derhalven kan het kind, aanslonds naa de geboorte, aangelegd worden.

Die kraamvrouwen, welken haar kind niet zelven kunnen zoogen, moeten wel de borsten met zachte linnen doeken dekken, maar zig verder van alle voedende spijsen en soupes onthouden, tot dat de melk uit de borsten verdweenen is: zij moeten de borsten zoo veel mogelijk voor de koude lucht bewaaren, dezelveu niet veel met de handen bevoelen, dewij daardoor, even als door de koude, ligtlijk eene ophooping van melk in de borsten ontstaat; ontlast de melk zig door de tepels, zoo moet er dikwijls een droog warm gemaakt serviet over de borst gelegd worden: de nattigheid kan in de borsten ook eene melk-ophooping veroorzaaken: alle andere middelen, om de melk te verdrijven, zijn gevaarlijk: het onthouden van spijsen welken veel voedsel geeven, en het veel thee drinken zijn de zekersten.

Is de kraamvrouw anders wèl, zoo heeft zij geene

geneesmiddelen noodig; maar zijn naa de verlossing de pijnen te hevig, zoo moet men haar eenige pijnstillende middelen toedienen.

Is bij de kraamzuivering de reuk sterk, en gaat de zuivering in eene te kleene hoeveelheid af, zoo is het dienstlig, de kraamvrouwen kervelkruid, in goede sounp gekookt, te laten drinken.

Het is een gevaarlijk gebruik, de kraamvrouwen een doek stijf om het lijf te binden, ten einde daardoor den buik dunner te maaken, of, zoo als men zig verbeeldt, de baarmoeder vasttehouden.

Door dit sterk binden wordt de kraamzuivering somtijds teruggelouden, en de baarmoeder ontstoken: de ondervinding heeft geleerd, dat door dit binden het lijf niet dunner gemaakt kan worden: beter en nuttiger is het voorgemelde sluitlaken, ten einde de spieren van den buik te onderstennen, op dat dezelve haare veerkracht wederkrijgen.

Reeds op den zesden of zeveden dag naa de verlossing kan eene kraamvrouw opstaan, zoo zij anders zeer wel, en de melk-koorts over is; doch zij moet de koude lucht mijden.

De meeste kraamvrouwen zijn wel eens van gevoelen om zes weeken naa de geboorte te purgeeren: dit is voor gezonde ligchaamen niet noodig, en zoo het al geschiedt, moet het met zachte laxeermiddelen en niet met sterk prikkelende middelen gedaan worden: deezen aangaande, moet men eenen Geneesheer en niet eene Vroedyrouw raadpleegen.

Nuttiger is 't voor een kraamvrouw dat zij, op het einde van haar kraambed, wanneer de kraamzuivering gedaan is, gebruik maakt van een lauw-warm bad, om daardoor het ligchaam te zuiveren.

Eene kraamvrouw moet zig niet te vroegtijdig in de koude lucht begeeven, en het huis niet verlaten, vóór dat de kraamzuivering geheel opgehouden heeft; waarom eenige gewoon zijn, als het weder des zomers voordelig is, eerst in de vierde of vijfde week, en des winters in de zesde week, haaren kerkgang te doen.

Eene kraamvrouw moet het bijslaapen niet toelaaten; vóór dat de kraamzuivering geheel opgehouden is: er zijn voorbeelden dat eene al te vroege bijslaap de kwaadaartigste gevolgen gehad heeft.

De bezorging van het eerstgeboren kind.

Als de moeder verlost is, wordt het kind naast de vrouw in het bed gelegd.

Zo het hoofd des kinds nog met de vliezen, als met een muts overtrokken is, moet men die vliezen afnemen, opdat het kind adem kan haalen.

Het afbinden van den navelstreng, het afwaschen der smeerige bekleedselen, het schouwen van 't ligchaam, het kleeden des kinds, het ontlasten van het *meconium*, zijn de eerste bezigheden voor de vroedvrouw, nopens het eerstgeboren kind.

De navelstreng moet zes duimen breed, van de navel des kinds af, met een smallen band gebonden worden: boven deeze binding wordt hij afgesneden: het stuk dat zig boven deeze binding bevindt, moet tegen het kind aan terug gelegd, en nog eens aan de eerste binding gebonden worden; in dier voegen is men verzekerd, dat de binding niet zal los laten. (*)

Men moet den navelstreng niet binden, vóór dat het kind tekens van leven geeft.

Is het kind zwak, en bleek van aangezicht, zoo moet men het aan den navelstreng laten liggen, als de moederkoek nog aan de baarmoeder vast zit, om den omloop des bloeds tusfchen moeder en kind te onderhouden. (†)

(*) Hier verdient aangemerkt te worden, dat men gewoon is, het afgesneden deel van den navelstreng, dat nog aan den moederkoek vast zit, ook te binden: maar heeft de moederkoek zig reeds van de baarmoeder losgelaten, en als er niet nog een kind voorhanden is, zoo is deeze binding niet noodig: om dat bij een losgeganen moederkoek, het bloed zig alleen uit de navel-aders ontlast, welken in den moederkoek gepiaatst zijn; dus moet dezelve natuurlijk kleiner, en des te ligter naar buiten gebragt worden: ik heb deeze binding bij meer dan zes honderd kinderen nagelaten.

(†) Maar is de moederkoek reeds ontlast, zoo is deeze raad vruchtloos, en

Ondertusſchen moet men het kind in met warmen wijn natgemaakte doeken leggen; geest van *ammoniac zout* onder den neus houden; (*) zout in den mond leggen, een klyſteer met zout apliceeren, in den mond en den aars lucht blaazen, met ſchuiers de voetſolen wrijven, de leden, naar het hart toe, veel met doeken wrijven, ſomtijds de borst met de hand zachtlijk drukken, en weder los laten; als er dan tekens van leven komen, kan zulk een zwak kind van den navelſtreng los gemaakt worden.

Maar is een kind zwak; geeft het ſtaauwlijks een teken van leven, en neemt men waar, dat het aangezicht geheel blaauw of zwart opgelopen is, zoo moet men den navelſtreng, zonder denzelven eerst te binden, op de gewoone plaatſt affnijden, en laten uit den navelſtreng, eenige oncen bloeds loopen; hierop binde men den navelſtreng, en zoeken het kind op eene zachte en verſchillende wijze te prikkelen. (†)

Het afwaſſchen van den kleurigen vettigen ſlijm, en de aan denzelven nog klevende bloederige vuiligheid, wordt in het bad gedaan: tot zulk bad moet men rein; echter niet te heet water gebruiken.

zelfs ſchadelijk, om dat het bloed van 't kind, door de ſlagaderen in den koek, maar niet uit den koek door de naveladeren naar het kind kan komen, en het kind alſoo zoude kunnen doodbloeden: de wijze om den moederkoek in warme aſch, of denzelven het kind op den buik te leggen, is geheel verwerpelijk; het eerste is vergeefſche arbeid, en het tweede ſchadelijk, om dat de koek, door zijne zwaarte, het ademaalen nog meer verbindert.

(*) Echter moet men deezen ſcherpen geest niet in den mond van het kind laten loopen: ik heb, even als Profeſſor L E B M A C H E R, waargenomen, dat die kinderen welken met het leven daaraf zijn gekomen, den geheelen mond met de ſlechtſte zweeren bezet hadden, zoo dat zij door pijn niet konden zuigen, en ſomtijds daar aan ſtierven.

(†) Eene vrouw had reeds drie kinderen wel gemaklijk, maar te vroegtijdig, ter wereld gebragt: de kinderen waren altoos geheel blaauw van aangezicht, leefden eenige dagen, de ademaaling was met lange tuſſchenpoozingen en zwaar, gelijk bij ſtervenden, zij waren lam tot dat zij, even als beroerenden, ſtierven: zeker heelmeeſter opende 't hoofd van het derde kind, toen het dood was, en zag alle vaten van den *pia mater* vol bloed ſtroomen, ook eenig bloed uit de vaten: bij het vierde kind beval mijn groote leermeeſter L E B M A C H E R, dat de Vroedvrouw vóór de binding van den navelſtreng eenige oncen bloeds zoude laten uitloopen: dit kind is, ſchoon alle de vaten in het aangezicht vol bloed ſtroomden, in het leven gebleven.

In 't water moet een kussen of toegevouwen linnen doek, op het hoofd des kinds, 't welk buiten het water is, gelegd worden; of men neemt alleenlijk botelbier met een klein gedeelte goede brandewijn, en wascht het kind met eenen spons, daarin natgemaakt, van het hoofd tot de voeten: bij kinderen die zwak zijn, kan men meer brandewijn gebruiken.

Bij dit waschen onderzoekt men het ligchaam des kinds, van het hoofd af, lid voor lid, tot aan de voeten, of er ook een lid te veel of te weinig, of gebrekkig is; of er op het hoofd of aan andere plaatsen ook gezwellen zijn; of ook eenig lid gebroken, ontwrigt of gekneusd is; of zig ergens een moedervlek, of ander nadeel laat zien; bijzonderlijk of de openingen voor de pis en drekstof wel open zijn.

Zoo één van deeze gebreken aanwezig is, moet zulks, bij tijds, aan eene Heelkundigen bekend gemaakt worden.

De tongriem moet alleenlijk losgemaakt worden bij kinderen die niet luide schreeuwen, niet goed kunnen zuigen, en de tong niet buiten den mond over de onderkaak brengen; deezen zijn blijken, dat de tongriem gebrekkig is.

Een wel gereinigd kind wordt voords door de baker gekleed: over 't algemeen is wegens het kleeden des kinds het volgende waarteneemen:

1) Het stuk van den navelstreng moet in een zacht linnen lapjen gewikkeld, en glad tegen de borst aan gelegd worden; voords wordt over hetzelfde een vierkant drukdoekjen, en over dit een navelband van vier vingers breed, om het lijf des kinds gelegd; hierdoor voorkomt men eene navelbreuk, welke anders, door 't schreeuwen des kinds, ligtlijk ontstaat:

2) Het hoofd wordt bedekt met eene linnen muts; of met een zoo genoemd vaderliefje; op de fontanellen kan men voor de warmte, een afzonderlijk linnen lapjen leggen, 't welk aan de muts vast gemaakt wordt: de plaats der fontanellen moet vooral warm gehouden worden.

3) Om

3) Onder elken der armen, welken langs het ligchaam hangen; tusſchen de beenen, die uitgetrekt naast elkan- der moeten liggen; tusſchen ieder plooi aan het ligchaam; achter de ooren, onder den hals, onder de knieën, en aan de holte onder het ſtaartbeen, moet men een zach- linnen lapjen leggen, ten einde het kind, op die plaat- ſen, door de uitwaſeming niet ſmarre.

Alle deeze bijzondere kleedings-gedeelten worden door een' luur vastgehouden.

4) Het kind moet niet te ſlijf in de luuren gewon- den worden, voornaamlijk niet op de borst, en over de maag, op dat het gemaklijk kan ademen, en niet, zoo dikwijls als het gezogen heeft, braaken moete: de doeken om den hals moeten mede niet te ſlijf digt gemaakt worden, om den terugvloed van het bloed, des het aangezicht en het hoofd, niet te hinderen.

5) Zoodra het kind in de luuren is, moet men het eenige keeren een lepel vol ſyroop van rhabarber geeven, om daardoor de darmen van de zwarte drekſtoffen te zuiveren, bevoorens het aan de borst gelegd wordt.

6) Een eerstgeboren kind moet niet dan naa verloop van eenige uren, om te zuigen, aangelegd worden, zoo het de eerſte, laxeerende, moedermelk niet kan hebben; maar kan het deeze krijgen, dan kan men het terſtond naa de geboorte aanleggen.

7) Het kind moet, in 't bed, niet op den rug, maar nu eens op de rechte, dan eens op de linker zijde gelegd worden, zoo dat de ſlijm die zig uit den mond ontlaſt, (vooral bij het braaken) ligtiijk afgelcheiden kan worden, om dat het kind anders, als het op den rug ligt, dien 'ſlijm moet verzwelgen, en daardoor zeer ligtiijk kan ſtikken.

8) Om dat de kinderen de pis- en drek-ſtof dikwijls in de luuren laaten gaan, moeten zij ook dikwijls verſchoond worden, anders wordt de huid rood, en er komen zwee- ren bij, die ligtiijk kwaadaartig worden.

9) Het ſtuk van den navelſtreng, 't welk van tijd tot tijd droog wordt, en zig in zes of zeven dagen afſcheidt, moet, bij het kleeden van 't kind, niet getrokken wor- den, om dat, als hetzelve zig te vroeg afſcheidt, eene doods-

lijke bloeding, een zweer, of navelbreuk kan veroorzaakt worden.

10) Dagelijks moet een kind, 'smorgens, 's middags, en 'savonds, met een spons, in laauw water natgemaakt, over het geheele ligchaam gewasfchen, en daarna weder gedroogd worden: de luuren moeten, als zij omgeslagen worden, niet koud, maar ook niet te warm weezen.

11) Het strooijen van loodwit in de ploojen van het ligchaam, waar naamlijk het kind smart, is zeer nadeelig; want het terughouden der uitwaasfening geeft aanleiding tot veele ziekten.

12) De bovenfte leden moeten in 't geheel vrij blijven: het overige gedeelte des ligchaams, met de beenen, kan eenige maanden lang in de luuren gelegd worden: de navelband moet langen tijd gedragen worden, vooral bij sterk fehreeuwende kinderen.

13) De wieg, of het bed, waarin het kind gelegd wordt, moet, ten opzichte van het licht, zoodanig staan, dat het zelve op 't achterhoofd des kinds valt, dewijl het in de oogen nadeelig is.

14) Het wiegen der kinderen is voor dezelve, wanneer het zachtlijk gedaan wordt, eene aangename beweging: sterk wiegen is in 't geheel fchadelijk; want eerstlijk wordt het kind daardoor duizelig, en ten tweeden maakt het wiegen eene fchudding der hersenen, waardoor het geheele zenuwgeftel lijdt: over dat deel der wieg, waar het hoofd des kinds ligt, moet men eenen boog maaken, over welken men een gordijn kan leggen.

15) Slaapen moet een kind zoo veel het wil en kan: nabij een kachel of een heet vuur moet zulks echter niet gefchieden, ook niet in zeer koude vertrekken.

16) Geduurende de eerfte maanden kan een kind, alleenlijk door de moedermelk, genoeg gevoed worden; 't is nadeelig hetzelve vroeg met pap vol te stoppen: als een kind drie of vier maanden oud is, en de moeder of minne geen melk meer heeft, zoo kan men hetzelve een befchuit, in water gekookt, geeven, en 't voords aan eene vaste orde in het eeten en drinken gewennen, gelijk ook in het flaapen.

Naa het pap eeten moet men het kind water, of water en melk, of goed bier laten drinken, om de pap in de maag te verdunnen: alle de bekende mondstopfels, van brood en suiker gemaakt, zijn schadelijk.

Op deeze wijze laat men meestal een kind bezorgen tot in de negende maand: zoo het zuigt, moet het dan gespeend worden: de rechte tijd om te speenen is, als de tanden doorbreken; want deezen hinderen 't kind en de moeder in het zuigen, en de Natuur eischt vastere spijzen.

17) Het kind moet, als 't wakker is, niet altoos op éénen arm gedragen worden, op dat het in den rug niet scheef worde: men moet het nu eens op den rechter, dan eens op den linker arm draagen.

18) 'T is niet goed een kind aan het schrikken te maaken; want daaruit zijn doodlijke vallende ziekten ontstaan.

19) Een kind moet dagelijks, voor 't minste tweemaal, afgang hebben; en in het tegengestelde geval, geholpen worden door clysteeren, of laxeerende syroopen.

De bezorging des kinds staande den tijd der zooginge.

De weldaadige Natuur heeft de vrouw zulk een ligchaam gegeven, dat zij, als zij moeder wordt, geschikt is, om zelve haare kinderen te zoogen: is derhalven eene maagd of vrouw moeder geworden, en is zij gezond, heeft zij ook anders geene dringende bezigheden die haar het zoogen verbieden; zoo is zij door de wet der Natuur gehouden, zelve dien plicht te vervullen; want de melk, welke het kind in 's moeders ligchaam gewoon geworden is, is het kind veel beter, dan die van eene minne, of van eenige andere melk van dieren: zelfs bevrijdt het zuigen van 't kind de moeder niet zelden van zwaare ziekten, welken haar anders door den toevloed der melk zouden overkomen, als deeze zig eenen anderen weg tot ontlasting moest baanen: deeze

sterke toevloed van melk vindt men meestal bij eerst-kraamende vrouwen; daarom is 't noodig, dat de bedoelde overvloed haar door het zuigen van een volwasfen mensch, of door jonge honden, of door eenen zuigpomp enz. weggenomen worde.

Tien of twaalf uren naa de geboorte laat men het kind, voor de eerstemaal, aan de borst leggen, en men speent het eerst naa negen maanden, of, als het zeer zwak is, eerst naa verloop van een jaar: in het eerste vierdedeel jaars laat men het om 't andere uur, in het tweede vierdedeel jaars, om de drie uren, en in het derde of vierde vierendeels jaars, slechts drie keeren daags zuigen: er is een oud spreekwoord, het welk zegt, *zoo als men de kinderen gewent, worden zij*; zal derhalven eene moeder een goede orde in het zoogen van haar kind in acht neemen, zoo moet zij het aan gemelden tijd gewennen, en daardoor kan zij haare bezigheden ook beter verrichten, tevens genoeg slaapen, en ook weten hoeveel melk haar kind dagelijks gebruikt.

Maar er zijn zekere gevallen, in welken de moeders het zoogen haarer kinderen verboden wordt, en gevolgtijk noodzaakelijk haare plaats door eene Min moeten laten waarneemen; deeze gevallen zijn,

1) Als de vrouwen geene tepels aan de borsten hebben, of dat dezelve te diep zitten, te dun zijn, en door een zacht wrijven niet stijf worden: eene kleene ontsteeking, of afgaan der huid kan in korten tijd genezen worden.

2) Als de borsten sterk ontstoken, zweerend, verhard, kankerachtig, te mager, of te vet, te stijf, of ook wanneer er in 't geheel geene borsten voorhanden zijn.

3) Wanneer de melkwegen vergroeid, of door gestolde melk verstopt zijn, en daarom geheel geen, of slechts weinig melk afscheiden.

Andere gevallen zijn er, in welken het zoogen, of voor de moeder, of voor het kind, of ook voor alle twee nadeelig kan wezen; als,

1) Bij vrouwen die een gebrek in de longen hebben: zo deeze zoogen kunnen zij ligtlijk in eenen hoest, bloedspuwing, of in eene longteering vallen: zijn die ziekten

vóór den zoogtijd tegenwoordig, zoo zullen zij door het zuigen des te erger worden.

2) Bij vrouwen welken met ervelijke famielie-ziekten behebd zijn, als met de podagra, met de vallende ziekte, zwaarmoedigheid, met de engelsche ziekte, met krop- kliergezwellen enz. op dat dit kwaad niet te zekerder van de moeder tot het kind overga: ook bij moeders, welken door de venusmet aangestoken zijn, om dat zij, met het kind te gelijk, in den zoogtijd genezen kunnen worden.

3) Bij vrouwen welken haare krachten door eene voorgaande zwaare verlossing verloren hebben, of van eene lange of korte en gevaarlijke ziekte hersteld zijn, of van dezelve overvallen worden; of wier zenuwgestel te gevoelig is, en waardoor veelen aan toevallen der baarmoeder onderworpen zijn.

4) Bij vrouwen welken, door het zoogen, in eene zwaare ziekte staan te vallen, om dat hetzelfde bij veele moeders eene uitteering, longteering, of de moederplaagen naar zig trekken: bij anderen veroorzaakt het zweet, en eene al te groote verzwakking.

5) Bij vrouwen welken, staande den zoogtijd, zwanger worden; want een zoogende vrouw wordt ligtlijk van eene miskraam overvallen, en haare melk is voor 't kind schadelijk.

6) Eindelijk bij alle vrouwen welken flechte melk hebben; wanneer dezelve naamlijk te dik, en noch door geneesmiddelen, noch door een goeden leefregel van haare scherpte gebeterd kan worden.

De verkiezing eener minne.

De verkiezing eener minne is voor het kind van 't grootste gewigt: als men te vooren ziet, dat eene vrouw haar kind niet kan zoogen, moet men, eenige weken vóór de geboorte, voor eene Min zorgen, welke men tot aan de verlossing der vrouwe laat wachten, om dat men niet ten allen tijde goede minnen kan bekomen.

Bij het verkiezen van eene minne, moet men acht geeven, op 1) den ouderdom; 2) ligchaamsgesteldheid; 3) den tijd haarer laatste verlossing; 4) de gesteldheid der borsten, der tepels, en der melk zelve; 5) den staat der gezondheid, en eindelijk 6) op de gemoedsgesteldheid.

1) De ouderdom — De beste minnen zijn die, welken van twintig tot dertig jaaren oud zijn: de melk eener te jonge, of te oude minne is of niet toereikende of niet voedende genoeg.

2) Ligchaamsgesteldheid — De minnen welken een sterk, bloedrijk gestel hebben, met bruin hair, en niet te vet, of niet te mager zijn, zijn verkiezelijk: zwakke minnen hebben melk, die ligtlijk zuur wordt: vette en al te magere minnen hebben zeldzaam genoeg melk. (*)

3) De tijd der laatste verlossing — Eene Min moet niet vóór de zes weeken naa haare kraamzuivering, en niet langer dan drie of vier maanden naa haare verlossing, aangenomen worden, om dat in het laatste geval haare melk te oud zoude weezen, en zij ook somtijds het zoogen niet zoude kunnen uithouden.

4) De gesteldheid der borsten, enz. — De borsten eener goede minne, moeten middenmatig groot, en op het gevoel zacht weezen: groote, met vast vet opgevulde borsten, geeven zeer weinig melk: ook is het noodig dat beide de borsten tot het zuigen geschikt zijn. (†)

De tepels moeten noch te groot, noch te klein zijn, en vooral niet diep in de borsten liggen, om dat het kind dezelve dan niet goed kan vatten; echter

(*) Het is niet goed, als eene Min, welke in het begin mager was, vet wordt, dewijl men dan het kind veelal mager ziet worden.

(†) Men kan de borsten onderscheiden, in melk- en vleesch-borsten; melkborsten zijn die, welken op het gevoel zacht zijn: deeze borsten zijn buiten de zwangrheid klein, en plat neêrgedrukt: maar worden zulke vrouwen zwanger, en zijn zij verlost, zoo zetten de borsten zig langzaam uit, alzoo dat zij van melk overstromen, en dezelve in eene groote menigte uitgeeven: de vleesch-borsten, in tegendeel, zijn meest vast, wel gevormd, zacht voor het gevoel, en sraai voor het gezicht; maar de menigte vets is, aan de behoorelijke afscheiding der melk, hinderlijk; zulke minnaen zijn niet in staat het kind genoegzaam melk te geeven; al zuigt het enkele dagen, blijft het echter hongerig.

verdient hierbij in aanmerking genomen te worden; dat de tepels door het zuigen van een kind grooter worden: bij een zacht wrijven moeten zij ook min of meer stijf worden: de melkopeningen moeten niet verstopt zijn.

De melk moet men onderzoeken naar gelang van haare menigte, als ook naar gelang van haare bestanddeelen: om bij eene Min de veelheid der melk naartesporen, moet men al haar melk op eenmaal laten uithaalen, en dan zien, in hoe veel tijds de borsten zig, als te vooren, aanvullen: doch jonge gezonde vrouwen, en die voor de eerstemaal zoogen, ontvangen dagelijks meer melk, wanneer zij goed eten en drinken hebben.

Als de benoodigde hoeveelheid der melk noch te dun, noch te dik, noch te scherp is, zoo bezit zij de beste bestanddeelen.

Dit neemt men waar door den reuk, den kleur, en door den smaak der melk: goede gezonde melk moet aangenaam zoet smaaken, en geen' reuk hebben: haar kleur moet wit zijn: geheel blaauwe melk is te dun, en de geele kleur is een teken van te veel vetzigheid, of dat de melk oud en bedorven is.

De dikte en dunte der melk kent men door de volgende proeven: men laat eenige droppels melk op de nagel van den vinger, of op den rand van een glas vallen: als nu de melk, wanneer men den vinger of het glas zachtlijk omkeert, onbeweegelijk daarop zitten blijft, zoo is zij te dik en te vet; vloeit zij daarentegen terstond af, zoo is zij te dun, en niet voedzaam genoeg; maar zij is goed, als ze op den nagel staan blijft, zoo lang men den vinger recht houdt, en als zij langzaam afvloeit, wanneer de vinger scheef gehouden wordt. (*)

Naar de verschillende zelfstandigheid der melk, moet men de Min ook eene verschillende levenswijs voorschrij-

(*) Eenigen laaten een deel melks in een teug azijn vallen, en daarin stollen, als wanneer men uit het meerder of minder gedeelte des droppels kan opmaaken, of de melk te dun, dan te dik is — anderen gieten wat melk in een glas water: zakt zij als dan op den grond, zoo is zij te zwaar; maakt zij veele draaden, zoo is zij te slijmerig; blijft zij op het water staan, zoo is zij te dun; wordt er eene wolk gemaakt, door geheel het water heen, zoo is zij goed.

ven; geschikt naamlijk naar den toestand, dat is, naar mate het kind dezelve noodig heeft; want niet voor ieder kind is dezelfde melk even voor- of naa deelig.

5) De staat der gezondheid — Al heeft eene Min de beste borsten en melk, moet men haar echter niet neemen, wanneer men aan haar eene voorgaande, of tegenwoordige ziekte ontdekt: vooral moet men onderzoeken, of zij de witte vloed heeft, en of zeker lidteken, of eerig ander teken van venusziekte, als groote wratten, lieschoulen, en dergelijken aan haar te vinden zijn: (*) men moet bij allen, welken de Min kennen, vragen of zij ook iet van eene haar aanhangende ziekte weten; zoo ook brengt het ongedierte op 't hoofd en aan de schaamtheid, eene Min met reden in een slecht vertrouwen; even als het onaangenaam rieken uit den mond en de keel, 't welk veelal een scorbutische of venerische gesteldheid aanwijst: bijzonderlijk als de tanden bedorven zijn, welken men derhalven voornaamlijk eerst moet onderzoeken.

6) Het gemoedsgestel — De zwaarmoedigen, toornigen, tot den drank genegen, luië, slaaperige, en al te verliefde Minnemoders, zijn voltrektelijk aftekeuren: men wordt het gemoedsgestel best gewaar, door een onderzoek naar haare wijze van leeven.

Deezen nu zijn de noodzaakelijke eigenschappen, welken eene Min moet bezitten, zal zij geschikt wezen om aan het groote oogmerk te voldoen.

Het gebeurt somtijds dat men eene Min, welke het kind reeds zoogt, om gewigtige oorzaken moet laten gaan, en eene andere neemen: wij zullen eenige gevallen opgeeven, waarin dat verwisselen noodzaaklijk is.

1) Wanneer, staande het zoogen van 't kind, de melk weggaat: in dit geval worden de minnen meestal vet,

(*) De venusziekte is tegenwoordig onder de minnen algemeen, en men kan door die, doorgaands listige vrouwlieden, ligtlijk bedrogen worden, wanneer zij de tijd en 't uur, tot het visiteren bestemd, weeten: zij pleegen zig de schaamdeelen uittevenschen, in de schede een sakt spous te sterken, en dan schoon linnen aantelden: men moet derhalven, vooral de schede, door de Vriendvrouwen laten onderzoeken, en altoos een vrakend oog over haer linnen houden, gelijk men ook altoos liet onderzoeken onverwachts moet laten doen.

en het kind wordt, onder een aanhoudend sterk schreeuwen, mager.

2) Als een Min zwanger wordt: bij zulk eene vermindert de melk, of dezelve is voor het kind onaangenaam.

3) Wanneer eene Min, de maandelijksche zuivering heeft, en het kind als dan lastig, en niet wél wordt; maar blijft het in dien tijd gezond en vrolijk, zoo is 't niet noodig, om gemelde reden, van Min te verwisfelen.

4) Als er eene ontsteeking der borsten plaats heeft.

5) Als eene Min door 't zoogen, of door eene andere oorzaak, in eene ziekte valt, die gevaarlijk, of langduurend wordt.

Deezen zijn de gewigtigste gevallen, waarom men van minnemoeder moet verwisfelen — wat verder haare spijzen aangaat, dezelve moeten, in de eerste dagen, zacht zijn, om dat het eerstgeborèn kind, in den beginne, dunne melk noodig heeft: den overigen tijd moet zij gezonde, aangenaame, en genoegzaam voedende spijzen gebruiken: het beste is haar zulke spijzen te laten gebruiken, als zij te vooren gewoon was: hierom worden minnen, ten platten lande geboren, van de zachte spijzen ligtlijk ziek; beter verdraagen dezelve grove meelspijzen.

Goed water is de minnen gezond, goed bier, of wijn met water, is dezulken onder het middagmaal niet schadelijk, welken voorheen gewoon waren het te drinken.

Ligchaamsbeweeging is der minne altoos nuttig; maar zoo zij daardoor verhit is, moet zij het kind niet terstond daarop laten zuigen, om dat de verhitte melk het wichtjen nadeelig is.

Door het veele zitten, wordt de melk te dik en lijmrig; daarom moet het veele zitten vermijid worden.

De slaap moet genoegzaam, maar niet te veel zijn; want het is, even als 't veele zitten, voor de melk zeer nadeelig: men moet het kind niet bij de Min in het bed laten slaapen, op dat het door haar, in den slaap, niet

gedrukt worde: men kan het wiegjen voor de bedstede plaatsen.

Het laat naar bed gaan is alle zoogende vrouwen schadelijk; daarom doet men wel, als men het kind aan eenen bepaalden tijd van zuigen, of van drinken gewent: de Min kan dan in de overige uren genoeg slaapen.

Zij moet vrolijk van gemoed, en opgehelderd van geest zijn; want toorn en schrik zijn voor het kind wezentlijke vergiften: is zij echter tot gramschap vervallen, of heeft zij geschrikt, zoo is het noodig dat haare borsten uitgemoelken worden, en men het kind niet late zuigen, vóór dat de gemoedsrust bij de Min hersteld is.

Tegen het afloopen van den zoogtijd, dat tegen het einde van de negende maand is, moet het kind van lieverleê aan zachte spijsen gewend worden, om dat men dan, naa het speenen, gemaklijker gebruik van dezelve kan maaken.

Van de voeding des kinds met melk van dieren.

Somtijds is men verpligt een kind alleenlijk met melk van dieren te voeden: menigvuldige waarneemingen hebben geleerd, dat onder de verscheiden soorten van zoogdieren, de koe de beste melk tot dat einde geeft; en daar men dezelve op alle plaatsen, en ten allen tijde gemaklijk kan bekomen, is zij te meer verkiezelijk.

Wordt alzoo een kind met koemelk gevoed, zoo moet dezelve in de eerste drie of vier weeken met een derde waters vermengd worden, op dat zij mager zij, en door het kind ligtlijk verteerd kan worden: men maake de melk lauw-warm, om dat de kinders aan warmte gewoon zijn, en de melk als dan eenigzins gelijkheid hebbe, met de moedermelk — Men geeve het wicht deeze melk in kannen, met een tuit, welke tuit bedekt is met een door-gaat lederen lapjen; men kan deeze kannen klein en plat laten maaken, zoodanig, dat zij in den boezem gedragen kunnen worden, en men daardoor in staat

is, dit vocht ten alle tijde warm te houden, en te geeven: des zomers laat men de melk met een weinig suiker opkooken, als wanneer zij niet ligtlijk zuur zal worden.

De melk- of zoog-kannetjens, moeten schoon gehouden worden, waartoe men twee of meer kannetjens in voorraad laat maaken, op dat men dezelve geduuring kan afwisselen.

Hoe veel van deeze melk men een kind, in den tijd van vier-en-twintig uren, geeft, tekent men op een daartoe dienend maatjen aan, op dat men zien kan, of het kind, voor zulk eenen tijd, zijne benoodigde hoeveelheid heeft ontvangen: een eerstgeboren kind heeft, in vier-en-twintig uren, van één tot twee pond van dat vocht noodig; wordt het ouder, dan van drie tot vier pond, en tegen de zesde maand, vijf of zes pond: deeze melk is echter zelden genoegzaam om het kind te voeden, dewijl zij niet zoo voedend is als die der menschen; men moet derhalven nog melk met beschuit daarbij voegen: deeze beschuitpap wordt op de volgende wijze bereid: in een half pond melk moet een lood beschuit, op een zacht vuur kooken, en omgeroerd worden; zij moet zoo lang kooken, tot er eene korst rondsom de pot zit: aldus genoeg gekookt zijnde, moet het papjen echter zoo dun zijn dat het rondsom de lepel afloopt — het gereedschap, waar in de pap gekookt wordt, moet altoos schoon gehouden worden, en zoo dikwijls men het kind dit voedsel zal toedienen, moet men hetzelfde versch bereiden, dewijl de bewaarde en opgewarmde pap voor het wichtjen te zwaar om te verteeren is.

Het zoogenaamde mondstopfel, uit suikerbrood bestaande, is niet alleenlijk gevaarlijk voor het kind, om dat het er ligt een stuk afknaagt, hetzelfde nederzuigt, en door deezen weg, als men daar niet op let, zig zelf verslikt; maar ook, om dat, door de suiker, te veel zuur in de eerste wegen komt, welk het kind zeer schadelijk kan weezen.

De vroegtijdige geboorte.

Als de geboorte vóór het einde der negende maand geschiedt, worden die kinderen, als ook dezelve geboorte, *vroegtijdig* genoemd.

Eigenlijk is de zevende, agtste, en de helft der negende maand, de tijd der geboorte: eene vrucht vóór de zevende maand ter wereld gekomen, wordt een miskraam genoemd: men heeft waargenomen, dat de vroegtijdige geboorten meest op het einde der zevende maand voorvallen.

Dezelfde oorzaken van zulk eene geboorte kunnen ook, wanneer zij, in eenen minderen graad, in de baarmoeder plaats hebben, of als zij eerst naa de zesde maand de baarmoeder overvallen, tot eene vroegtijdige verlossing aanleiding geven.

Daar nu somtijds kinderen, uit geheime inzichten, der waereld, of den kwaaddenkenden vader, voor vroegtijdig geboren, opgedrongen worden, moet een Vroedmeester, bijzonderlijk in gevallen van openbaare rechtspleeging, met groote bedachtzaamheid, en naa het naauwkeurigst onderzoek, over het eerstgeboren kind oordeelen.

De grootte van een vroegtijdig, maar dood ter waereld gekomen kind, is niet altoos gelijk aan den tijd der zwangerheid, maar aan dien tijd, op welken de vrucht in de baarmoeder gestorven is: leevende vroegtijdig geboren kinderen, zijn altoos kleiner, dan ten bestemden tijde geboren: de vroegtijdig geboren ontbreken meestal, even als bij de ontijdigen, de nagels op de vingers: de eerstgemelde slaapen aanhoudend door, en moeten tot het gebruik van voedsel opgewekt worden; zij zijn veelal te zwak om de melk uit de borsten der moeder te trekken, en hebben, tot op twee maanden naa de geboorte, naauwlijks eene hoorbaare stem, dewijl hunne longen nog te zwak zijn, om zig behoorelijk uittezetten, en sament te trekken: om dezelfde reden haalen zij ook bezwaarelijk adem. (*)

(*) Men wil waargenomen hebben, dat zevenmaandskinderen soms zoo welkomen als tijdig geboren geweest zijn; maar hier kunnen vergissingen plaats

De voorzeggijg, of een vroegtijdig geboren kind in het leven zal blijven, wordt door een ervaaren Vroedmeester niet opgemaakt uit de sterke ledemaaten, maar alleenlijk uit het gemakkelijk ademhaalen des kinds.

Daar de vroegtijdige verlosfingen meestal met eenen sterken bloedvloed vergezeld gaan, moet men bij het behandelen van zulk eene verlosfing, als ook bij ontijdige geboorten, den aandacht daarop gevestigd houden.

Voor het overige is de toedragt van omftandigheden, bij de vroegtijdige geboorten, even als die bij de tijdigen; zij gaat naamlijk langzaam vóór (*) en de moederkoek volgt zelden aanftonds op de geboorte: 't is noodig te weten, dat men in de zevende of agtste maand beter met de hand in de baarmoeder kan komen, om, als het noodig zoude zijn, een tegennatuurlijk liggend kind te keeren, 't welk bij ontijdige geboorten wel eens 't geval kan weezen.

De ontijdige geboorten.

Als eene zwanigere vrouw vóór de zevende maand der zwangerheid verlost, heeft zij eene ontijdige geboorte, 't welk men *abortus*, of misdragt noemt; maar valt de geboorte voor naa de zevende, en vóór het einde van de negende maand der zwangerheid, zoo is dezelve eene vroegtijdige geboorte.

Meestal neemt men deeze miskraamen waar, in de derde of vierde maand, zelden in de vijfde, meestal ook ontmoet men de miskraam op de dagen waarop, buiten de zwangerheid, de maandlijksche bloedontlasting geschiedt.

hebben, gelijk zulks het geval was bij de vijf- of zes-maandskinderen, door CARDANUS en anderen leevend gezien; alhoewel ik niet wil lochenen, dat beide gevallen mogelijk zijn — In zeker boek, aan HYPOCRATUS toegeschreven, leest men: „De agtmaandskinderen sterven zekerder, dan die in de zevende maand „geboren zijn;” dan, deeze waarneeming is valsch, en de ondervinding wederlegt haar: want hoe tijdiger een kind geboren is, hoe sterker deszelfs longen zijn, en des te zekerder kan het ook in 't leven blijven.

(*) Zonder twijfel, dewijl het kind door zijne zwaarte, den baarmoedersmond, welke op deezen tijd nog dik is, niet kan verwijden.

Men heeft waargenomen, dat een zevenmaandskind in het leven kan blijven; maar die vóór de zevende maand geboren worden, sterven allen, dewijl hunne longen niet sterk genoeg zijn om adem te haalen.

Alles wat de baarmoeder, vóór het einde der zwangersheid, eene krampachtige samentrekking kan veroorzaken, kan men als eene afgelegene oorzaak der ontijdige en vroegtijdige geboorte aanzien.

Echter kunnen deeze gelegenheidgeevende oorzaken zelden, eene hevige samentrekking der baarmoeder veroorzaken, zoo er niet, behalven dat, eene bijzondere voorbereiding tot dezelve in het maakfel der baarmoeder tegenwoordig is (*).

Dergelijke voorbereidende oorzaken, bestaan in eene bijzondere prikkelbaarheid, slapheid, stijfheid, verharding of gebrekkelijkheid, van de baarmoeder.

Wanneer eene vrouw dikwijls eene miskraam heeft, kan men zekerlijk tot zulk eene voorbereiding besluiten, bijzonderlijk als de miskraamen op eenen gezetten tijd komen, of in eene zelfde maand voorvallen.

Die miskraamen, welken uit eenen bloedvloed ontstaan, en van denzelven vergezeld gaan, komen veel meerder voor, dan welken zonder dien vloed voorvallen: over 't algemeen is een miskraam gevaarlijker dan eene ontijdige geboorte, om dat meestal een bloedvloed vóór, in, of naa dezelve aanwezig is; om dat zij langzaam voordgaan; om dat de kleene moederkoek meestal terug blijft, en om dat de kunst noch van buiten, noch van binnen, de lijdere, in dat geval, groote hulp kan toebrengen.

Hoe grooter het kind is, dat is, hoe later de miskraam voorvalt, des te gevaarlijker is de bloeding: zijn, bij den vloed, waare weeten tegenwoordig, zoo is er geen hoop meer om de misdragt voortekomen: somtijds laat de bloeding eener zwangere vrouw, als er geene

(*) Schandelijke vrouwen trachten zig te vergeefs door sterke middelen, en andere handgrepen, van de verborgene zwangersheid te ontslaan: soldaaten- en boeren-vrouwen, zijn aan honderden oorzaken van miskraamen, zonder gevolg, blootgesteld, om dat de bedoelde voorbereiding, in haare baarmoeder, zeldzaam tegenwoordig is.

weeën bij zijn, zig nog, zonder eene opvolgende miskraam gelukkiglijk stuiten; maar ook volgt de miskraam somtijds, eenige dagen, naa het ophouden van den vloed.

Dit zijn de waarneemingen in deezen, door mij, en door de beroemdste mannen, opgetekend: de beoordeeling en vereischte behandeling van dit toeval, vordert de grootste naauwkeurigheid van den Vroedkundige.

De tekens van een aanstaande miskraam zijn, in de eerste twee maanden, buiten de geringe weeën der baarmoeder naauwlijks kenbaar: een miskraam daarentegen van meer maanden, wordt gemeenlijk voorgegaan van eene melk-koorts, eene onverwachte opzwellings der borsten, (welke echter weder verdwijnt,) eene huivering, koude der ledemaaten, krachtloosheid, en dergelijken.

Volgen de waare weeën, welken uit de lendenen naar den schoot trekken, zoo neemt de miskraam haar begin: voelt men dat de baarmoedersmond zig verwijdt, en zig in denzelven eene kleene vochtblaas opspant, zoo is de miskraam reeds in werking, en zal ongetwijfeld voortgaan.

De hulp en het hoofdoogmerk moeten, door den Vroedkundige, alleenlijk op den bloedvloed gericht worden, welke zekerlijk altoos een miskraam, van meer dan drie maanden, vergezelt.

Daarom moet men hier aanstonds de behoorelijke middelen tegen den bloedvloed, naar vereisch van omstandigheden, aanwenden: bij voorbeeld; *spirit vitrioli: lijsip: levi tinct. cinam*; voorts moet men de amandelmelk laten drinken, een sluitlaken om het lijf leggen, en hetzelfde wél aanhaalen; doeken met azijn en water op het lijf leggen, en de knieën eene horizontale ligging geeven; de lijderes rust verschaffen, en de misdragt aan de Natuur overlaten.

Zoo bij den bloedvloed geene waare weeën tegenwoordig zijn, wordt dezelve veelal door het gebruik der gezegde middelen gestild, en men keert hem gelukkiglijk af; maar zijn waare weeën tegenwoordig, zoo gaat de miskraam zekerlijk voort, en men moet dezelve, gelijk reeds gezegd is, geheel aan de werking der Natuur toebetrouwen, bijzonderlijk als de vloed bedaart, of wel geheel opgehouden heeft.

Buitendien kan men, tot in de zesde maand toe, de hand niet in den baarmoedersmond brengen, indien men niet, met het grootste gevaar, den nog zeer naauwen baarmoedermond wil verwijden; en met een paar vingers is in de baarmoeder zeer weinig uittevoeren.

Echter kan men somtijds daarmede in denzelven voelen, ten einde sterker weën te verwekken; en zoo 't mogelijk is mag men het voorkomende deel met den vinger zachtlijk trekken, want hoe klein 't kind nog zij, kan het in alle liggingen door den mond heen gedrukt, en derhalven ook doorgetrokken worden; bijzonderlijk als men het met de blaas, welke het insluit, zachtlijk kan aanvatten; echter moet alle geweld vermijdd worden, wanneer het kind niet gereedlijk wil volgen.

De van verscheiden Vroedkundigen, aangeprezene, dunne, finale, lange, raavenbeks-wijze tang, moet, in alle gevallen, met de uiterste omzichtigheid gebruikt worden; wanneer men met dezelve de kleine vrucht uit de baarmoeder wil uithaalen; en dit uithaalen is bovendien alleenlijk noodig in dat eenige geval, waarin men op geene wijze, hoegenaamd, de bloeding kan stillen.

Meest al blijft de kleine naageboorte terug; doch ook deeze moet niet met geweld uitgetrokken worden, bijzonderlijk als de bloeding ophoudt, dewijl men den dunnen navelfstreng zekerlijk zoude affcheuren: het beste is, de naageboorte te laten zitten, als wanneer zij zig, voor en naa, met de kraamzuivering zal ontlasten.

De voorbehoedende middelen zijn, dat men de volbloedingen alle zes weeken eene kleine aderlating doe, en de vrouwen, welken van een zwak lichaamsgestel zijn, alzoo ook een zwakke baarmoeder hebben, versterkende middelen toedien (*).

Van

(*) Vrouwen, welken eenmaal aan een miskraam geleden hebben, zijn dezelve meermaals onderhevig: ik heb, even als de beroemde WERLHOFF, en de kundige ZIMMERMAN, waargenomen, dat de elkander opvolgende en met een bloedvloed vergezelde miskraamen niet te genezen zijn, wanneer de moeders zig niet van het misbruik der melk, koflij, en van den bijllaap othouden: door een en ander te vermijden, en verder door het gebruiken van den koortsbast met de *tink. cinamon*, heb ik eenige vrouwen gelukkige moeders, van tijdige kinderen, zien worden.

Van overtijdige geboorte.

Al heeft de Natuur het baarende geslacht, zoo wel bij menschen als bij dieren, eenen bepaalden geboortetijd gesteld, is het echter door onwedersprekelijke en allernaauwkeurigste waarneemingen bewezen, dat de natuurlijke tijd, door, voor ons nog onbekende, oorzaken, tot in de tiende, ja zelfs in de elfde maand, en daar boven, verlengd kan worden: dat de zwangerheid echter ook dien tijd nog te boven zoude kunnen gaan, schijnt met de waarheid niet overëentekomen.

Men heeft waargenomen, dat zulke te laat geborene kinderen, naa de zesde of zevende maand, en vóór de geboorte, uitdrukkelijke tekens van beweging hebben gegeven, en ook tekens van eene veel grooter volkomenheid van ligchaam, dan zij gewoonlijk met zig ter wereld gebragt hebben: in 't algemeen waren zij sterker van natuur, en hadden ook hardere beenderen: bij eenigen was de fontanel reeds vol gewassen, het hoofdhair was lang, en gekleurd, de stem sterker, de oogen, en het aangezicht leevendiger, en veelen hadden ook tanden in den mond, die reeds ontbloot van het tandvleesch waren; maar gelijk somtijds de eerste geboorte, alhoewel dezelve natuurlijk zij, voor vroegtijdig wordt opgegeven, ten einde de gevolgen eener te vroeg gevierde liefde voor de wereld te verbergen, zoo verklaren dikwijls listige weduwen, welken naa den dood haarer mans baaren, het geboren kind voor overtijdig, op dat zij dit kind nog op de rekening van haare overledene mans kunnen stellen — Een Verloskundige, welke dergelijke gevallen in rechtspleegingen worden opgedragen, moet daarom den tijd, toen de vrouw het eerste gevoel van zwangerheid gehad heeft, en de wijze van dat gevoel zelve, als ook het ligchaamsgestel van het kind, met de grootste naauwkeurigheid onderzoeken.

Wat nu de hulp bij eene overtijdige geboorte aangaat, deeze moet ingericht worden overeenkomstig de

grootte en de gedaante des kinds: de overrijdige geboorte kan, even als de natuurlijke, dat is tijdige geboorte, ligt, zwaar, of tegennatuurlijk zijn.

Wegens de levenslange zwangerheid, dat is eene zwangerheid, welke het geheele leven door duurt, leezen men, over de ziekten der vrouwen.

De geboorte van een dood kind.

De hoofd-geboorte van een dood kind, gaat in 't geheel langzaamer voort, en is ook moeilijker, dan de geboorte van een leevendig kind.

Ik versta hierbij, wanneer de zelfde omstandigheden bij de moeder, en de zelfde grootte bij het kind plaats heeft, als bij een leevendig kind: ook als het doode kind eene natuurlijke ligging met het hoofd heeft; want als men een dood kind, door keering, uit de baarmoeder moet brengen, zoo is de geboorte gelijk aan die van een levendig kind; en de hoofd-geboorte van een klein dood kind, zal zekerlijk ligter zijn, dan de hoofd-geboorte van een groot leevendig kind.

Zelden wordt een dood kind, staande den geheelen tijd der zwangerheid, terug gehouden: het hoofd is derhalven kleiner, dan het hoofd van een tijdig geboren kind: dit moge wel de oorzaak zijn, waarom men niet zelden de geboorte van een dood kind zoo ligtlijk als die van een levendig kind daarstelt.

Als een kind eenige weken vóór de geboorte sterft, en dus een gelijk groot hoofd heeft, als een leevendig kind van denzelfden tijd, is de hoofd-geboorte altoos zwaarder, en van langer duur.

Men heeft waargenomen, dat het hoofd van een dood kind zig niet meer in een punt vormt, als het door den baarmoedermond en door den ingang van het bekken geperst wordt, even als het hoofd van een levendig kind; en dit is de oorzaak, dat over 't geheel, de natuurlijke hoofd-geboorte van een dood kind langzaam en zwaarder is.

Er zijn dringende oorzaaken, om een dood kind, door zijne eigen tekenen van een leevend te onderscheiden; dewijl veeltijds, in het eerste geval, zoo wel het hoofd, als de borst, in eene zwaare verlossing, van hunne inhoudende deelen ontlast moeten worden.

Een kind kan in de zwangerheid, of ook ten tijde der verlossing, sterven.

De tekens van een dood kind in de zwangerheid zijn de volgende:

1) Als de vrouw de beweeging des kinds gevoeld heeft, doch dezelve nu niet meer gevoelt: eenige gevoelen de beweeging des kinds van dag tot dag minder; anderen gevoelen in de baarmoeder, eene zeer sterke beweeging des kinds, en daarop beweegt het zig niet meer: deeze sterke beweeging schijnt eene stuipachtige beweeging van de stervende vrucht geweest te zijn.

2) Wanneer het kind zig, des morgens vroeg, niet meer beweegt, als men eene koude hand op het lijf des moeders, omtrent de navel, legt.

3) De buik wordt niet meer grooter, maar valt meer samen.

4) De navel, die te gelijk met den buik uitgezet was, verkrijgt zijne kuil weder.

5) Wanneer de vrouw zig schielijk van de eene zijde, op de andere ligt, zal zij een zwaar ligchaam in haar gevoelen, 't welk naar die zijde valt, waarop de vrouw zig keert.

6) Soms tijds gevoelt de vrouw eene koude in de baarmoeder.

7) Onder eene koortsachtige rilling, zwellen haare borsten op, doch worden echter spoedig weder slap, en laten eene waterachtige melk uit de tepels uitvloejen.

Deezen zijn de tekens eener doode vrucht, staande de zwangerheid, welke door de Schrijvers aangetekend zijn: wanneer nu alle deeze tekens samen komen, en men daarbij nog weet, dat er eene oorzaak van de dood des kinds vooraf gegaan is, zoo kan men dien dood nog zekerder vermoeden.

De overige tekens van den dood eens kinds zijn, als

eene vrouw loodkleurig is, en rondsom de oogen blaauw wordt, luide adem haalt, hartkloppingen heeft, uit den mond riekt, hoofdpijn en oorfluisingen heeft, bedwelmd wordt, dikwijls moederkrampen gevoelt, en aan slepende koortsen onderworpen is.

De vrucht, al is dezelve dood, kan niet zoo schielijk in verrotting overgaan, als zij geene gemeenschap met de buitenlucht kan hebben; maar zijn de vliezen der vrucht gebroken, zoo gaat zij in eenige dagen tot bederf over, en nu ontstaan de gezegde toevallen: brengt men de vrucht niet spoedig naar buiten, zoo veroorzaakt zij eene ontsteeking der baarmoeder, welke voorts versterking derzelve, en den dood der moeder ten wege kan brengen.

Meest echter veroorzaaken de doode kinderen eenen miskraam of vroegtijdige geboorte, om dat het bloed niet meer van de moeder tot den koek, en uit denzelven naar het kind overgaat; hierdoor verzamelt het zig in de baarmoeder, welke door de menigte van bloeds toefamentrekking aangeprikkeld wordt.

Intusschen zijn er voorbeelden, dat doode kinderen langer tijd in de baarmoeder zijn gebleven, in welke zij verhard, en als 't ware versteend worden.

Nu volgt de waarneeming der tekens, of een kind reeds dood in den baarmoedermond is ingezakt, of wel nog leevend, maar eerst naderhand, onder de geboorte, in het bekken, hoe zeer nog vastzittend, gestorven is.

1) Als voor en naa uit de schaamte, na dat het water gebroken is, een stinkend, rottig, wankleurig vocht uitvloeit, welk vocht men alleenlijk door de ondervinding, van andere stinkende zaaken, leert onderkennen: men moet dit vocht wel onderscheiden van het *meconium*: dit is dikker, stinkt niet, en is groen van kleur.

2) Als de opperhuid zig loslaat, of aan de onderzoekende hand hangen blijft; echter moet hier de rottig, stinkende lucht bij tegenwoordig zijn.

3) Noch het hoofd des kinds, noch een ander deel in den baarmoedermond voorkomende, zwelt op, al zit het nog zoo vast.

4) Men kan het voorkomend hoofd voelen, en men

bevindt dat het zig niet puntig opdoet: maar als men de bekkeneels-beenderen overëenschuift, hoort men een bijzonder geluid van die beenderen, en voelt men een bijzondere beweging, als of het bekkeneel ledig ware: somtijds laten die beenderen zig met de hand, zeer ver, over elkander drukken.

5) De fontanel is ook nog niet dicht gedrukt, door overëenschuiving der beenderen; en men voelt in haar ook geene klopping: het zekerste is, dat men op de zijde des aangezichts voelt, of de slaap-flagaderen zig niet meer beweegen.

6) Maar heeft het kind eene ligging, dat men den navelstreng kan voelen, en deeze werkelijk nog slaat, zoo is zulks een teken, dat het kind nog leeft; doch in tegendeel, is 't geen zeker teken dat het kind dood is, als de navel-flagaderen niet meer kloppen; dewijl ik zelf een leevend, alhoewel een zwak kind, door het keeren ter wereld gebragt heb, welks uithangende navelstreng noch in de baarmoeder, noch buiten dezelve klopte.

Komt het aangezicht voor, zoo kan men onderzoeken of de tong zig beweegt, als men een vinger in den mond steekt.

Komt de borst voor, zoo voelt men of het hart zig beweegt — Komt de buik voor, zoo komt ook meestal de navelstreng voor, welken men dan voelen kan.

Komen de ledemaaten voor, zoo toont de pols, en de opzwellling der deelen, of het kind leeft, dan wel dood is.

Met alle deeze tekens, zoo wel als uit het stinken; naamlijk, een reuk naar dien van eenen rottig cadaver gelijkende; als ook uit het geel groene vocht, hetwelk zig uit de baarmoeder ontlast, heb ik met zekerheid, zonder mij te bedriegen, den dood van het kind opgemaakt: alhoewel ik toestem, dat het kind zonder het gezegde vocht, en de boven beschreven reuk, dood kan weezen.

Als men nu bij deeze tekens de ligging des kinds in aanmerking neemt, ook den tijd, geduurende welke het in deeze verkeerde ligging, in het bekken, geplaatst is

geweest; (*) als men daar bij de oorzaken waarneemt, welke ten opzichte der moeder, den dood des kinds kunnen veroorzaaken; zoo heeft men eene bijhulp, om het leven of den dood des kinds te kunnen opmaaken.

Vervolgens moeten wij nu ook de tekens bepalen, welken aanwijzen dat het kind leeft, en in den ingang van het bekken geperst is; doch naderhand, onder de geboorte, nog in het bekken zijnde, is gestorven.

In de geboorte van een leevend kind, worden de bek-keneels-beenderen in de fontanel, in diervoegen, over-ëen gedrukt, dat men weldra in 't geheel de fontanel niet meer kan voelen: op de samengedrukte fontanel vormt de huid van het hoofd des kinds, in den beginne eene breede plooi; dit gezwel wordt grooter, breeder, en rondër, tot het eene kegelvormige gedaante verkrijgt, welke op het aanraaken hard is: als dit gezwel geheel week en *ödematisch* wordt, voords zig onder de weeën, meer tot een punt vormt, zoo is dit een reden om te vermoeden dat het kind dood is.

Zoo lang zig nog geene tekens van verrotting opdoen, is het besluit wegens den dood des kinds, zeer onzeker.

De overige tekens van den dood in de geboorte, leeren op zig zelven niets: zij zijn,

1) Als het *meconium* uit de schaamelheid ten voorschijn komt: in de geboorten, waarbij het staartbeen voorkomt, gebeurt hetzelfde meest altoos.

2) Men kan uit de beweging des kinds, in de geboorte, niets besluiten; want als het hoofd van een leevend kind in den ingang van het bekken geperst is, zoo beweegt het zig ook niet meer.

Daar nu alle tekens, welken desaangaande opgegeven zijn, om te weeten of een kind vóór of in de geboorte gestorven is, behalven de blijkbaare verrotting des kinds, en het lamsvocht, slechts twijfelachtig zijn, zoo is er geen beter teken dan dat der verrotting zelve.

(*) Daar een kind in de baarmoeder geene bepaalde ligging aanneemt, en meestal met het hoofd naar onderen gekeerd is; valt deeze stelling, dienaangaande, weg.

Wat betreft de hulp in de geboorte van een dood kind, het welk met het hoofd voorkomt, zoo heeft een Vroedkundige, aan zijne zijde, niet anders te doen, dan 't geen bij een leevend kind, hetwelk met het hoofd voorkomt, zijn plicht vordert; maar wil de geboorte, door dat het hoofd niet puntig genoeg geworden is, niet verder voortgaan, zoo trachte men met den *Roonhuijsiaanschen hefboom*, of met de *Engelsche tangen* te verlossen, welken zig in sleezen, zeer gemakkelijk laten aanleggen, om dat het hoofd meestal zijne natuurlijke grootte heeft, en zig door het samensnel der hersenen, ligtlijk laat samendrukken.

Geneesheeren, die vóór het begin der waare weeën, afdrijvende middelen laten gebruiken, tasten altoos mis; want vóór dat de geboorte begint, zijn de tekens van een dood kind bedriegelijk, en alzoo zoude men ligtlijk een leevendig, in de plaats van een dood kind, vóór den tijd kunnen afdrijven; ten tweeden is de werking deezer middelen zeldzaam van een goed gevolg; zij veroorzaken, of eene sterke bloeding, of eene ontsteeking van de baarmoeder: geeft men die middelen in den tijd, dat de waare weeën werkzaam zijn, zoo worden dezelve te overvloedig, en gevaarlijk: men moet derhalven het zwanger zijn van een dood kind zoo lang aan de Natuur overlaten, tot het, door de weeën, zelf aanwijzingen van geboortetijd geeft.

De oorzaken, waardoor een kind in de baarmoeder om het leven gebragt wordt, zoeken men in mijn onderwijs, wegens de ziekten der zwangere vrouwen.

Het getal der dood geborene kinderen, is verschillend, naar de verscheidenheden der plaatsen: echter heeft men over het geheel waargenomen, dat onder de twintig verlosingen, altoos één dood kind geteld wordt.

De geboorte van tweelingen.

Als eene vrouw van twee kinderen, welken ten gelijken tijde ontvangen zijn, zwanger gaat, noemt men die kinderen, tweelingen.

Doch zijn dezelve op ongelijke tijden ontvangen, zoo zijn het geene tweelingen, maar het tweede kind wordt als dan eene overbevruchting genoemd: men heeft voorbeelden, dat eene vrouw, drie, ja vier kinderen op éénmaal gebaard heeft, echter is zulks zeldzaam — Ik weet niet of men wel mag aanneemen, dat er ooit meer dan vijf kinderen, op éénmaal, geboren zijn.

De tekens waaruit men kan opmaaken of eene vrouw tweelingen draagt, zijn zeer twijfelachtig: de algemeensten zijn de volgende:

- 1) Als de buik de gewoone dikte te boven gaat;
- 2) Als op denzelfden, in het midden, van boven tot beneden, eene foort van goot ligt;
- 3) Als hij aan beide zijden meer opgezet is;
- 4) Als men de beweeging des kinds, nu op de eene zijde des buiks alleen, dan weder op beide zijden tegelijk waarneemt;
- 5) Als de oogen der vrouwen gezwollen zijn:

Alle deeze vijf tekenen, heeft men echter dikwijls bij zwangeren waargenomen, schoon zij evenwel maar één kind gebaard hebben; dikwijls heeft men dezelve ook niet waargenomen, wanneer de vrouwen echter van tweelingen verlost.

Als een kind zeer groot, waterzuchtig, of wanschapen is, of wanneer er zeer veel wáár, of valsch water in het hol der baarmoeder geplaatst is; of dat er eene buikwaterzucht tegenwoordig is, zoo bewijst de groote buik niet dat er eene tweeling voorhanden is.

De buik kan ook in de midden, en in maniere als boven, eene goot hebben, en aan beide zijden verheven zijn, wanneer op de eene zijde der baarmodersholligheid de

moederkoek of eene *mola* geplaatst is: in dit geval toont de langachtige goot en de zijdelingfche verhevenheden des buiks almede niet dat er tweelingen geboren ftaan te worden: het kind kan ook dwars liggen, en kan zig met de handen aan de eene, en met de voeten op de andere zijde beweegen — hieruit zien wij derhalven dat ieder van de vijf boven befchreven tekens, van de tegenwoordigheid van een tweeling, op zig zelf, zeer onzeker is, ja dat dezelve, fchoon ook alle tegenwoordig zijnde, nog geene zekerheid hebben.

Het beste is, dat men niet noodig heeft, vóór de verlossing te weten, of er ook een tweeling voorhanden is; houdt men zig ondertusfchen daarvan verzekerd, zoo moet men het echter alle zwangere vrouw niet zeggen: want het is alle vrouw niet aangenaam meer dan één kind te zullen baaren.

De geboorte van twee kinderen, kan, of natuurlijk, of tegennatuurlijk, of vermengd zijn.

Zelden komt het eene kind naa 't andere, met het hoofd in de geboorte; meestal heb ik het eerfte kind, met het hoofd, en het tweede met de voeten, zien voorkomen, fomtijds komt het eerfte natuurlijk, dat is, met het hoofd, of met de voeten, terwijl het andere eene tegennatuurlijke ligging heeft; wanneer derhalven het eerfte kind natuurlijk gekomen, en buiten de moeder is, kan men zeker zeggen, of er nog een kind zal volgen, ja, dan neen.

De volgende tekenen zijn er van, dat nog een kind in de baarmoeder aanwezig is:

- 1) Als de geboorte eenige weeken vroeger dan het einde der zwangerheid voorvalt;
- 2) Als de buik op de helft der dragt famenvalt, en daarbij zoo hard blijft, dat men een tweede kind kan voelen; want eene verlamde baarmoeder is op het gevoel zacht;
- 3) Het eerfte geboren kind is veelal kleiner, dan een kind van negen maanden;
- 4) Als men den baarmoedersmond bevoelt, bevindt

men dat er nog een water aangroeit, waarin men ligtlijk het voorkomende deel des tweeden kinds kan voelen: (*).

5) De buitenwaards hangende navelfstreng van het eerste kind, bloedt, zoo hij niet afgebonden wordt, gestadig voort:

6) Eindelijk krijgt de reeds verlostte vrouw wederom, nu kort dan lang naa de geboorte, nieuwe en sterke weeën.

Weet men nu, dat er nog een kind zal volgen, zoo moet men den navelfstreng van het eerste kind aanstonds afbinden (†).

Komt het tweede kind nu met het hoofd, of met den stuit voor, zoo laat men het aan de Natuur over; maar komt het met de voeten voor, of komen er, naa gegevene harakterkingen, uit *opium* bestaande, geene lange weeën, om dat de vrouw door den eersten arbeid vermoeid is, zoo brengt men de hand in de baarmoeder, breekt de vliezen, en brengt men het tweede kind, met de voeten, naar buiten.

Dewijl de teeldeel en de baarmoedermond, door het eerste kind verwijd zijn, en dewijl tweelings-kinderen kleiner zijn, dan één kind alleen, zoo kan men zulk een tweede kind gemakliker wegneemen: eindelijk brengt men eerst den moederkoek van het eerste, en voords dien van het tweede kind, naar buiten.

Maar zijn de twee koeken verëenigd, gelijk meestal het geval is, zoo kan men hen van wege derzelver grootte, niet ligtlijk, door aan den navelfstreng te trekken, naar buiten brengen; des moet men de hand in de baarmoeder brengen, den eenen koek bij den rand

(*) Soms is aan de onderste vlakte van den moederkoek, eene groote waterblaas, welke zig in den baarmoedermond uitzet, en menigmaal door de naaweën gebroken wordt, alzoo dat men ligtlijk zoude kunnen vermoeden, er ware nog een kind terug gebleven; doch door een behoorelijk onderzoek is de waarheid in deeze ligt te ontdekken, en men bevindt het ook zeer zelden alzoo te wezen.

(†) In dit geval is het afbinden van den uithangenden navelfstreng noodzaaklijk, om dat de baarmoeder zig niet, rondsom het tweede kind, kan samentrekken, en derhalven laat de moederkoek niet zoo ligt van het eerste kind los.

vatten, en denzelven op die wijze naar buiten brengen, gelijk hiervoor reeds gezegd is; of men laat hem, 't welk nog beter is, aan de Natuur alleen over: voor het overige bezorgt men, zoo wel moeder als kind, in maniere als boven.

Bij eene tegennatuurlijke geboorte van tweelingen, zijn veele Verloskundigen bevreesd, dat, als het eerste kind bij de voeten gehaald moet worden, zij mogelijk van ieder kind één voet vasthebben, en alzoo gevaar loopen van beide kinderen tegelijk in het bekkenhol te trekken; doch deeze vrees is ijdel: de Ontldeekundigen hebben bewezen, dat bij tweelingen, altoos, ieder kind zijn eigen lamsvlies, en zijn eigen water heeft; alleenlijk is het vaatvlies aan beiden gemeen; hieruit volgt dat men niet ligtlijk van ieder kind een voet kan vatten: en al ware het lamsvlies van alle twee tegelijk gebroken, zoo gaat men tog met de hand langs de binnenzijde van de voet en het been, 't welk men uitgehaald heeft, tot aan de uitwendige teeldeelen van het kind, en aldaar kan men ligtlijk en met zekerheid deezen voet onderscheiden, van dien des anderen kinds.

Bij de vermengde geboorte van tweelingen, wanneer naamlijk één kind natuurlijk, en het andere tegennatuurlijk ligt, laat men het eerste over aan de Natuur, maar het tweede wordt door eene keering verlost.

Van de samengegroeide tweelingens-geboorten zullen wij op eene andere plaats spreken.

De overbevruchte geboorte.

De overbevruchting is een tweede bevruchting van eene reeds zwangere vrouw; alzoo dat eenige maanden naa de verlossing van eene tijdige vrucht, nog een ander voldragen kind wordt geboren.

Alhoewel in eenige aangetekende waarneemingen van overbevruchtingen, bedrog, of misleiding ontdekt zij; alhoewel eenige Schrijvers tweelingen hebben willen zien

geboren worden, van welken het eene kind eenige dagen of weeken naa het andere geboren werd, en die gevallen niet behoorelijk van eene overbevruchting onderscheiden hebben; alhoewel men uit de ongelijke grootte van twee tegelijk geborene kinderen geene bewijzen van overbevruchting kan trekken, zoo hebben echter andere Schrijvers, ingevolge nadere en naauwkeuriger waarneemingen, buiten twijfel gesteld, dat de overbevruchting mogelijk zij.

Deeze mogelijkheid is ondertusfchen verschillend: ten *eersten* bevestigen veele waarneemingen, dat vrouwen, welken in het hol der baarmoeder veele jaaren lang, een gestorven en verhard, in een geraamte veranderd kind bij zig gedragen hebben, en echter staande dien tijd, verscheidene maalen op nieuw bevrucht, en van voldragene kinderen verlost zijn geworden — ten *tweeden*, hebben verscheiden Ontleedkundigen, in het ligchaam eener vrouwe, twee baarmoeders, of ook ééne baarmoeder in twee holten verdeeld gevonden: ook in dit geval nu is de overbevruchting mogelijk, alzoo zulk eene vrouw, heden in het eene, en na eenige maanden in het andere hol der baarmoeder kan ontvangen — ten *derden* heeft men waargenomen, dat eenige vrouwen in de reeds bevruchte baarmoeder andermaal bevrucht zijn geworden: (dit echter behoort zekerlijk tot de *hypotesen*;) want in den tijd dat het eerste bevruchte ei de holte der baarmoeder niet geheel vervult, (maar hoe kleiner de vrucht is, des te kleiner is ook de ruimte in de baarmoeder,) is eene tweede bevruchting mogelijk, bijzonderlijk daar, bij vrouwen welken reeds gebaard hebben, de mond der baarmoeder niet geheel dicht gesloten is: men kenne het leerftellige in deeze al dan niet, 't is echter zeker dat er voorbeelden genoeg voor handen zijn, welken die overbevruchting bewijzen (*).

(*) Als men zeker konde weten; hoe veel eijens in eene zelfde bijfleeping bevrucht wierden, en tegelijk hoe lang een bevrucht ei in het eiernest kan blijven, eer het in 't hol der baarmoeder gedreven wordt, dan zoude deeze zaak tot eene nieuwe hypotese aanleiding geeven: het kon weezen dat in eene bijfleeping eenige eijens te gelijk bevrucht werden, en van welke eijens, 't eene heden, en het andere morgen, of wel naa eenige weeken of maanden, in de baarmoeder overgiet.

Wat in dit geval de teeldeel en zelven betreft, men kan aan dezelve de eerste bevruchtiging niet onderkennen; maar al zij de geboorte van het eerste kind volbragt, en al vele de buik niet sament, al ware de moederkoek ook tegenwoordig, al ware er ook geene weeën meer, en al gevoelde de verlostte zig zeer wèl, zoo zoude men tog het verdere beloop der zaake, aan de Natuur alleen moeten overlaaten.

Blijft de vrouw alzo in het kraambed zonder weeën, maar gevoelt zij echter de beweging van het tweede kind, zoo kan men eene overbevruchting vermoeden, en welke zig door den tijd zal ontlasten.

De valsche zwangerheid, en de geboorte eener vleesige misdragt, of mola.

Als zonder dat een kind aanwezig is, een vreemd ligchaam in de baarmoeder wordt opgehouden, dat in sichijn eene zwangerheid verbeeldt, zoo wordt het uitzetten der baarmoeder eene valsche zwangerheid genoemd.

Hiertoe behooren, de waterzucht der baarmoeder, de trommelzucht, de knobbelachtige opzetting der baarmoeder, de vleeschprop derzelve, eene verharde vrucht, en de *mola*.

Alle deeze ziekten der baarmoeder, moeten door eene Verloskundige van eene waare zwangerheid onderscheiden kunnen worden, op dat de Geneeskundige niet een leevend kind, in de plaats van eene *mola* afdrijve.

De water- en trommel-zucht der baarmoeder, de knoopachtige opzwellings, de vleeschproppen, en de verhardingen in de baarmoeder, moeten naar de regels der Genees- en Heelkunde gekend en behandeld worden: in de Vroedkunde beschouw ik de *mola* alleenlijk, om dat niet zelden de hand des Vroedmeesters daarbij noodig is.

De *mola*, is eene onregelmaatige, sponsachtige, vleeschklomp, in welke somtijds water of bloed, maar somtijds ook eene kleene vrucht voorhanden is.

Men treft er ook aan, die uit kleine waterblaasjes bestaan, en de gedaante van een druiventros hebben: (de Hoogleraar BONN, bezit een' moederkoek van deeze gedaante.)

Die *mola's*, welken bevrucht zijn, ontstaan altoos door eene bevruchting, naa welken een gevormd ei, uit wat oorzaak het dan ook moge zijn, bedorven wordt, of ook, gelijk men waargenomen heeft, uit eene, naa de geboorte teruggeblevene ontijdige naageboorte: ook zijn de vrouwen, welken den bijlaap tijdens zij de maandstonden hebben, of terstond naa de verlossing, wanneer zij de kraamzuivering nog hebben, toelaaten, in gevalle zij ontvangen, aan zulk eene *mola* blootgesteld.

De verlossing van eene *mola*, wordt verdeeld in eenvoudige, en in vermengde: de eenvoudige verlossing eener *mola* is, als dezelve slechts alleen, de vermengde, als zij tegelijk met een waar kind in de baarmoeder tegenwoordig is.

De tekens van eenvoudige *mola's* zijn onzeker, om dat zij in den eersten tijd, dezelve zijn met die eener waare zwangerheid: in gevalle van zulk eene *mola*, groejen der vrouwen buik en borsten aan; doch in de derde maand, wordt de zaak eenigzins duidelijker; men neemt waar, dat de buik, omtrent dien tijd, meer opzet, en grooter wordt, dan in eene waare zwangerheid; en niettegenstaande de buik zoo groot zij, gevoelt de vrouw echter geene beweging der vrucht; ook blijkt dat de zwelling des buiks, als 't waare, driehoekig is, en zoo men dezelve een weinig drukt, klaagt de vrouw over pijn: zij is voords altoos zwak ter been.

Daar nu eene *mola* zig zelden boven de vier maanden in de baarmoeder opdoet, en zig gemeenlijk met waare weeën, en met eenen sterken bloedvloed instelt, zoo moet men het geheele werk, tot den behoorelijken tijd, aan de Natuur alleen overlaaten; en deeze, vóór den tijd, noch met innerlijke afdrijvende middelen, noch met uitwendige handgreepen bestormen; want beiden

zouden vergeefs aangewend worden, ja schadelijk weezen.

Naar maate nu eene *mola* klein, middenmaatig, of groot is, zal ook het verlossen van dezelve moeilijker of gemaklijker weezen.

Men moet zig in deeze meestal bepaalen bij de sterkte van den bloedvloed, welke altoos tegenwoordig is: deeze vordert de hoogste oplettenheid; daarom moet men bij de verlossing van *mola's*, die met een' bloedvloed vergezeld gaan, al aanstonds, uitwendig gebruik maaken, van omslagen met koud water en azijn, en innerlijk van de *tinctur cinamomi*, ten einde de bloeding te stillen, of voor het minst te verminderen: de vrouw moet de weëen, even als in eene waare en natuurlijke geboorte, verarbeiden: verder wordt de *mola* geheel aan de Natuur overgelaten, tot dat de mond der baarmoeder zig verwijd heeft, overeenkomstig de grootte van dat ligchaam; als dan kan men, met twee vingers, doch nooit met instrumenten, de *mola* zekerlijk vatten: bijzonderlijk tracht men, onder de weëen, dezelve in en door de schede te trekken, om de verlossing te verhaasten (*).

Voor het overige moet eene vrouw, naa de verlossing van dit ligchaam, zig even als eene kraamvrouw gedraagen.

Bij de geboorte van eene vermengde *mola*, als naamlijk met dezelve een kind tegenwoordig is, heeft men nog geene onseilbaare tekenen, welken zulk eene bezwangerdheid aanwijzen; want de grootere opzetting van den buik, waarbij de vrucht zig echter niet zoo levendig beweegt, wanneer men de bezwangerde op eene bijzondere plaats des ligchaams bevoelt, is zeer valsch

(*) Ik heb slechts tweemaal gelegenheid gehad om bij de verlossing van eene *mola* tegenwoordig te zijn; en in beide gevallen waren er kleine weëen, met eenen middenmaatigen bloedvloed tegenwoordig: de bloeding stilde ik, door in- en uitwendige geneesmiddelen, en liet voorts de *mola* aan de Natuur over: naa gestilde bloeding, ontlastte zig uit den baarmoeder, eenige dagen lang, eene groote hoeveelheid stinkend vocht: bij de eene lijderes ontstond op den tweeden, bij de andere op den vijfden dag, sterke geboorte-weëen, door welken eene tamelijke groote, verrotte *mola* naar buiten werd gedreven: Professor LEBMACHER heeft mij verhaald, dat hij voor eenige jaaren, een *mola* van verscheiden ponden zwaar, en van een druifvormige gedaante, door een toegediend purgeermiddel, op een zevenden dag, naa de natuurlijke geboorte eens kinds, gelukkig heeft afgedreven.

en bedriegelijk: de beste aanwijzing heeft men desaan-
gaande, als de geboorte voorbij is, en de *mola* vóór 't
kind, hetwelk evenwel zelden, of naa 't kind, het welk
meer geschiedt, uit de baarmoeder komt.

Behalven deeze tweecërleie verlossing van eene *mola*, ont-
moet men somtijds nog eene derde, ik meen de geboorte
van een valsche *mola*, naamlijk wanneer een vaste, stin-
kende bloedklomp ontlast wordt, zonder dat eene voor-
afgegaane bevruchting plaats heeft; doch daarvan zal, in
het leerstuk van de ziekte der bezwangerden, meer gezegd
worden.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.



GRONDBEGINSELEN
DER
VROEDKUNDE.

TWEEDE DEEL.

*Het leerstuk van de zwaars- en tegennatuurlijke
geboorte.*

GRONDBEGINSELEN

D E R

VROEDKUNDE:

*Van de zwaare en tegennatuurlijke geboorte in
't algemeen.*

Van de vroegste tijden af hebben de Schrijvers de geboorte in twee soorten verdeeld; naamlijk in eene natuurlijke en eene tegennatuurlijke: de natuurlijke geboorte wordt verdeeld in eene ligte, en eene zwaare.

Voords kan eene geboorte tijdig, ontijdig, vroegtijdig, of overtijdig weezen.

De volgende omstandigheden bepaalen het verschil deezer benaamingen.

Eene ligte natuurlijke geboorte, wordt die geene genoemd; waarbij het kind, naa negen zonne-maanden, zonder eenige kunst-hulp, van zelf, gemaklijk, en in den tijd van zes of agt uren geboren, wordt.

Tot deeze natuurlijke geboorte zijn drie dingen noodzaaklijk; naamlijk het geheele verloop van den bepaalden tijd der zwangerheit; de gemaklijkheid der geboorte zelve; waarbij noch het kind, noch de moeder, iet meer lijden, dan gewoonlijk; eindelijk de gewoone duuring der geboorte, welke men omtrent op den boven gemelden tijd bepaalen kan.

Heeft de geboorte vóór de zevende maand plaats, zoo wordt zij ontijdig, of *abortus* genoemd; heeft de geboorte tusfchen de zevende en vóór het einde van de negende maand plaats, dan is zij eene vroegtijdige; en naa de negende maand, dan is zij eene overtijdige geboorte.

Als het kind, wel natuurlijk; doch niet ligt en in korten tijd, maar langzaam, en onder bijzondere toevallen, geboren wordt, zoo heeft er eene zwaare natuurlijke geboorte plaats.

Doch kan een kind niet door de Natuur, maar moet het door de kunst, dat is door eene keering of door middel van instrumenten, geboren worden, zoo wordt dit eene tegennatuurlijke geboorte genoemd: **ROEDER** noemt deeze geboorte, met recht, de kunstige; alzoo blijkt hieruit, dat wèl alle tegennatuurlijke geboorten zwaare; maar dat niet alle zwaare geboorten tegennatuurlijk zijn,

Zal eene geboorte zig natuurlijk en gemaklijk toedraagen, zoo is 't noodig, dat noch in de baarende vrouw, noch aan het kind, noch aan die deelen welken tot het kind behooren, eenig gebrek te vinden zij, en dat ook noch door de Vroedvrouw, noch door den Vroedmeester een' mislag begaan worde: er kan derhalven eene zwaare geboorte, of eene geheel tegennatuurlijke veroorzaakt worden, door een gebrek aan de baarende vrouw, of aan haar kind, of aan beiden tegelijk.

Over de zwaare geboorte, door een gebrek aan de baarende vrouw.

Of er schoon een zeer groot getal oorzaaken zij, welken, ten opzichte der baarenden, de geboorte zwaar of tegennatuurlijk kunnen maaken, kan men dezelve echter, met recht, onder de volgende clasfen brengen:

Als 1) een gebrek plaats heeft in het bekken.

2) — — — — in de lippen der schaamelijkheid.

3) — — — — in de schede.

4) — — — — in den baarmoedersmond.

5) — — — — in de baarmoeder.

6) — — — — in de deelen naast de baarmoeder liggende.

7) — — — — in de weeën.

8) — — — — aan de krachten.

Wij zullen deeze gebreken ieder op zig zelf naarspeuren;

De gebreken van het bekken.

Als de beenige weg, waardoor het kind uit de baarmoeder moet uitgaan, geene behoorelijke grootte heeft, naar gelang van de grootte, en de gedaante van het kinderhoofd, zoo wordt de geboorte over 't geheel zwaar en langzaam, ja, 't wordt somtijds onmogelijk, dezelve langs den natuurlijken weg te doen daarstellen: over het geheel zijn de gebreken der harde deelen van meer aanbelang, dan die der zachte deelen; om dat de eersten zig noch verwijden, noch laten samendrukken, 't welk de laatsten, ook in den hoogsten graad, gedoogen.

De bedoelde vernaauwing kan in den ingang of uitgang van het bekkenhol plaats hebben, of in beiden tegelijk; echter heeft men meestal waargenomen, dat als het aan 't eene deel in de naauwte hapert, zoo hapert het in het andere deel aan de wijdde, en zoo ook omgekeerd.

Bij een naauwkeurig onderzoek der oorzaaken vindt men, dat de Engelsche ziekte, gemeenlijk tot deeze gebreken aanleiding geeft, dewijl men dezelve zeldzaam in het natuurlijk maakfel vindt, of het is door een van buiten aangebragt geweld veroorzaakt: wij zullen deeze gebreken van het bekkenhol alleen onderzoeken; ik breng daartoe de volgende:

- 1) De naauwte van het bekken aan den ingang.
- 2) — — — — — aan den uitgang.
- 3) De mismaaktheid.
- 4) De onbeweegelijkheid van het staartbeen.
- 5) De hardigheid der kraakbeenderen.
- 6) De overmaatige wijdde van het bekken.
- 7) Het te weinig naar binnen gebogen heiligbeen.
- 8) De alte groote beweegelijkheid van het staartbeen.

Alle deeze gebreken worden bij den Vroedmeester waargenomen, door een naauwkeurig onderzoek, zoo wel als door de kwaade gevolgen van eene geboorte.

De naauwte van het bekken aan deszelfs ingang, of bovenste opening.

Als het hol van 't bekken, door hetwelk een kind anders be-
hoorelijk ter wereld gebragt wordt, voor het zelve te naauw
is, verstrekt zulks tot een der grootste hinderpaalen in de
geboorte; deeze naauwte ontstaat meest door den voor-
berg des heiligbeens, of door dat de schaambeenderen
zig te sterk in den as van het bekken inbuigen, of ook
door een gezwel deezer beenen — men kent gemelde
naauwte, door een onderzoek met de hand: om hierbij
zeker te zijn, kan men gebruik maaken van den *Stein-
schen Pelvimeeter*.

Als dus het kinderhoofd zijne natuurlijke grootte
heeft, en den ingang (of de bovenste opening) van het
bekken niet natuurlijk wijd is; zoo ontstaat daardoor eene
zwaare, en somtijds voor de Natuur onmogelijke ge-
boorte, om dat een Natuurlijk groot hoofd zig door een
te klein bekken niet laat doorpersen, maar in het zelve
beklemd wordt, en zitten blijft.

In gevalle van zulk eene bekleining neemt men in de
Vroedkunde verscheidene middelen ter hand, en welken
bevonden zijn van eene goede uitwerking te weezen:
zij zijn de volgende:

1) Het gebruik van den hefboom: 2) het gebruik
der tangen: 3) het doorsnijden van 't kraakbeen tus-
schen de schaambeenderen: 4) de keizerlijke snede:
5) de doorbooring der bekkeneelsbeenderen.

In ons eerste deel is reeds gezegd, dat tot eene na-
tuurlijke geboorte, de bovenste opening van een welge-
maakt bekken, van het eene darmbeen tot het andere,
vijf Parijsche duimen wijd moet zijn, en dat de rechte
lijn, van den voorberg des heiligenbeens, tot den rand
der schaambeenderen, vier duimen moet bedraagen —
Men heeft verschillende graaden deezer vernauwing
waargenomen: er zijn bekkens gevonden van $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$,
 $3\frac{3}{4}$, 3, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{3}{4}$, 2, $1\frac{1}{4}$, en $1\frac{1}{2}$ duim in deeze afnee-
tingen: deeze gevallen zullen wij wat nader beschouwen.

1) Als de rechte afmetting van vooren tot achteren $3\frac{3}{4}$ Parijsche duimen bedraagt, zoo gaat de geboorte wel wat langzaam; maar het kind blijft echter in 't leven; en het kan met den hefboom geholpen worden.

2) Is die afmetting van vooren naar achteren $3\frac{1}{2}$ duim; en wordt de geboorte aan de Natuur overgelaten, zoo sterft het kind; doch wanneer in dit geval, ten rechten tijde, gebruik gemaakt wordt van de tangen, zoo kan het kind leevendig ter wereld komen.

3) Eene rechte afmetting van vooren naar achteren, van $3\frac{1}{4}$ duim, veroorzaakt der Natuur eene onmogelijke geboorte, echter kan de doode vrucht met de tang uitgehaald worden; daarom moet als dan, bij een nog leevendig kind, de doorklieving der schaambeenderen ter hand genomen worden: bij een dood kind kan men gebruijs maaken, van het *perforatorium*.

4) Eene rechte afmetting van vooren tot achteren, van 3, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, en $2\frac{3}{4}$ duimen, veroorzaakt de Natuur en de tangen eene onmogelijke geboorte; daarom vordert de leevendige vrucht, de keizerlijke snede, en een dood kind het *perforatorium*.

5) Bij eene rechte afmetting van vooren naar achteren van twee duimen, vordert het leevendige kind ook wel de keizerlijke snede; doch bij een dood kind kan men als dan met het *perforatorium* niets verrichten.

6) Eene rechte afmetting van vooren naar achteren van $1\frac{3}{4}$, of $1\frac{1}{2}$ duim, maakt bij eene leevendige, zoo wel als bij eene doode vrucht, de geboorte onmogelijk; (*) daarom wordt in alle twee gevallen, de keizerlijke snede noodzaakelijk, om dat noch met het *perforatorium*, noch met het uithaalen der vrucht, in zulk een naauw bekken, iet te verrichten is.

Hieruit onstaat de vraag, of het goed is, de vrucht eener zwangere vrouwe afteedrijven, wanneer er zulk

(*) Men zoude niet gelooven, dat het mogelijk ware, zulk een naauw bekken te vinden, hadde niet de beroemde WILLIAM HUNTER, in zijne verzameling, een mismaat bekken, welks rechte afmetting $1\frac{1}{4}$ duim, een ander van $1\frac{1}{2}$ duim, een derde van $1\frac{3}{4}$ lijnen, en nog eene vierde van elf lijnen — Men zie HUNTER's *Bemerkunge über die bij zweere gebuurten empfohlene zerteilung der schaambeine*: Leipzig, 1779: de Hoogheleeraar BONN, bezit, in zijne verzameling van beenderen, bekkens, wier engte zeer aanmerklijk is.

eene engte van het bekken plaats heeft? het antwoord is, neen: want de twijfelachtige uitflag der keizerlijke snede, is tog nog te verkiezen, boven de zekere dood der vrucht — Dit geval maakt de bijslaaping volstrekt ongeobrflofd.

De naauwte in de schuine afmettingen is zeldzaamer, dan in de rechte: als diergelijk geval plaats heeft, zoo moeten de bovengemelde handgreepen in aanmerking komen; zeldzaam evenwel heeft men waargenomen, dat de dwarse afmetting van het eene tot het andere darmbeen te naauw was; heeft ondertusfchen eene vrouw daaraan gebrek, zoo moet zij, door middel van het door-klieven der fchaambeenderen, gered worden.

Alzoo ziet men dat een te naauw bekken, eene veel zwaarder verlosfing veroorzaakt, dan een te groot hoofd des kinds: het laafte kan door middel dier inftrumenten te gemoet gekomen worden: maar een bekken dat te naauw is, maakt het gebruik der inftrumenten veelal onmogelijk, waardoor men de geheele geboorte aan de Natuur moet overlaaten; doch meestal fterft de moeder en het kind onder de verlosfing, of het kind gaat, naa verloop van eenigen tijd, in de baarmoeder tot bederf over; want de voorbeelden dat een kind in de baarmoeder verhard is, zonder nadeel der moeder, zijn zeer weinig: bijzonderlijk als de mond der baarmoeder door de weeen geopend is; de vliezen gebroken zijn, en de lucht in de baarmoeder kan indringen.

De naauwte van het bekken aan den uitgang, of onderfte opening.

Als de uitgang of onderfte opening van het bekken te naauw is, zoo is de geboorte, voor moeder en kind, en ook voor den Vroedmeester gemaklijk.

De onderfte opening van een welgefteld bekken, moet van het ftaartbeen, tot onder den boog der fchaambeenderen, vier duimen wijd zijn: die zelfde wijdte moet ook van het eene zitbeen tot het andere plaats hebben; en

is deeze afmeting van wijdte hier niet aanwezig, zoo is de uitgang van het bekken te naauw, en het hoofd van 't kind zal min of meer klemmen, naar maate hetzelfde min of meer van deeze wijdte afwijkt.

Die wijdte neemt men waar, of door de hand, of door gebruik te maaken van den *pelvimeter*: de oorzaken van deeze naauwte van het bekken in den uitgang zijn verschillende: zij kunnen weezen.

1) De knobbels der zitbeenderen.

2) Als de punt des heiligbeens met het staartbeen te lang of onbeweegelijk is.

3) Als de boog der schaambeenderen te veel naar binnen, tegen den as der onderste opening uitpuilt; of

4) Als op de gemelde beenderen, beengezwellen zijn.

Maar daar men hier ligter tot het hoofd kan komen, dan dat hetzelfde in de bovenste opening beklemd geraakte, zoo is ook deeze geboorte niet zoo moeijelijk, dan de eerstgemelde; en men heeft verscheiden handgreepen noodig, naar gelang van den graad der naauwte van het bekken aan den uitgang.

Is het staartbeen te lang, zoo kan hetzelfde bijna een duim ver terug gedrukt worden: of men kan met het *Roornhuysaansche instrument*, of met de tang, er bijkomen; of zo dat niet hielpe, en het kind nog leefde, zoude men tot het doorklieven van de schaambeenderen moeten overgaan; maar is het kind dood, zoo kan men het hoofd van de hersenen ontlasten. —

Soms tijds vindt men ook gelegenheid om met twee vingers in den mond van het kind te komen, en, door deeze handgreep, het hoofd, vervolgens het geheele kind, door den uitgang uithaalen; echter hoede men zig ook van, door deeze handgreep, de bilnaad intescheuren: om die reden zijn de andere voorgenoemde handgreepen zekerder.

Het teruggedrukken van het staartbeen kan, of door de schede, of door den endeldarm gedaan worden.

Wil men het staartbeen teruggedrukken, zoo moet men twee vingers, tuschen het voorhoofd des kinds en het staartbeen, in de schede brengen; zoo dat men met den

rug van den vinger, tegen het staartbeen, en met de vlakke hand en vingers, tegen het voorhoofd des kinds kan drukken: en op dusdanige wijs kan men ten gelijken tijde, het staartbeen der vrouwe terug drukken, om alzoo het hoofd naar buiten te brengen: men moet voorzichtig zijn, van op deeze wijs de bilnaad niet intescheuren. Zonderling is het, dat door het teruggedrukken van het staartbeen sterke weeën veroorzaakt worden, hetwelk hier zeer goed is.

De mismaaktheid van het bekken.

Er zijn vrouwen, wier bekken op verscheiden wijzen mismaakt is: somtijds puilt de voorberg des heiligbeens te ver in het bekkenhol uit; bij anderen zijn de schaamboogen, of de bovenste rand derzelven, in plaats van buiten, naar binnen gebogen; ook staan bij eenigen de zitbeenderen te veel naar binnen; bij anderen is het heiligbeen met het staartbeen te veel, of te weinig gebogen, en somtijds vindt men het geheele bekken, als 't ware, samen, of geheel scheef gedrukt; hiertoe behooren derhalven de samengedrukte, of scheeve bekkens.

Alle deeze gebreken maaken, of den in- of den uitgang, of het geheele bekkenhol, te naauw: de hulp is derhalven dezelfde, welke voor een alte naauw bekken aan den in- of uitgang is opgegeven.

Men neemt deeze mismaaktheid van het bekken, meestal waar bij vrouwen die, in haare jeugd, de Engelsche ziekte gehad hebben: al schijnt het dat zij van deeze ziekte genezen zijn, zoo hebben zij echter eene mismaaktheid in het bekken overgehouden.

De onbeweegelijkheid van het staartbeen.

Als de wervelbeenderen des staartbeens met elkander, of met de punt des heiligbeens verbeend zijn, zoo maakt het staartbeen, met het heiligbeen of eenen seker-

pen of eenen rechten hoek, welke de rechte afmetting van vooren naar achteren, in den uitgang, te klein maakt, en gevolglijk kan de noodzaakelijke terugdrukking des staartbeens, bij den uitgang van het hoofd des kinds, niet geschieden: men vermoedt dit gebrek bij vrouwen, die zeer oud, naamlijk over de veertig jaar, of ook nog ouder, trouwen.

De gewoone hulp in dit geval bestaat hierin, dat men het hoofd met den vinger, of met den hefboom naar vooren onder den schaambeensboog, en het staartbeen, als 't mogelijk is, gelijk in de vorige afdeeling geleerd is, terug drukt; of men trekt het hoofd met de tang naar buiten; en schoon men als zeker kan stellen, dat bij dit uithaalen het staartbeen gebroken of verplaatst wordt, zoo is echter, daar die breuk niet zoo gevaarlijk is, als het doorklieven der schaambeenderen, die wijze ook meer aanteprijzen, dan gezegde operatie.

Den Heelmeesteren zij hier alle mogelijke oplettendheid aanbevolen; daar men naamlijk heeft waargenomen, dat als het staartbeen gebroken of verplaatst is, en niet weder hersteld wordt, dat als dan de vrouwen, naa de verlossing, mank gaan.

*Over de hardheid der kraakbeenderen en banden van
het bekken.*

In de ligchaamen der vrouwen, welken in de zwangerheid gestorven zijn, kan men klaarblijkelijk waarneemen, dat de wonderrijke Natuur reeds in de laatste maanden der zwangerheid, de kraakbeenderen, welken de schaambeenderen en de ongenoemde beenderen, met het heiligbeen, samenvoegen, weeker, sappigger, en meer uitgezet maakt: dit uitzetten der tusfchen de beenderen liggende kraakbeenderen, drukt alzoo den ingang, en tevens het geheele bekkenhol aanmerkelijk, ja fomtijds, bij onmogelijke geboorten, geheel vanëen.

De zwaarte der zwangere baarmoeder, en het ingaan van 't hoofd, zijn gelijk aan de werking van eene wig,

waardoor het verwijden des bekken, onder de geboorte, nog sterker voordgaat: de pijnen, die, op het einde der zwangerheid, aan de kraakbeenige vereeniging der schaam- en ongenaamde beenderen gevoeld worden, ontstaan, voor het grootste gedeelte, door dit verwijden van het bekken.

Als deeze kraakbeenen van het bekken door ouderdom, of ter oorzaak van eene ziekelijke gesteldheid, of uit welke oorzaak het zoude mogen weezen, te hard zijn, en zig niet verweken laten, zoo kan het verwijden niet geschieden; en alzoo zal dit gebrek aanleiding geeven tot eene zwaare, en langzaame geboorte: hetzelfde heeft plaats, als de heilige- en zitbeens banden, hard of verbeend zijn, en hetwelk misschien de oorzaak is, dat vrouwen, over de veertig jaaren oud, voor de eerste maal, zoo moeijelijk baaren: daar men voords waargenomen heeft, dat de kraakbeenderen dier vrouwen, welken dikwijls gebaard hebben, weeker, breeder, en grooter [zijn, dan die der vrouwen welken slechts eenmaal gebaard hebben, zoo beseft men ligtlijk de oorzaak, waarom de eerste verlossing langzaamer voordgaat dan de volgende: men kan tegelijk hieruit begrijpen, van hoe veel nuts de warme dampbaden bij de verlossing zijn; ook laat zig hieruit verklaren, waarom bij eenige vrouwen, welken een moederkrans of ring draagen, dezelve, in de laatste maanden der zwangerheid afvalt, en waarom soms, naa iedere verlossing, een' grooter' ring van noodig is.

Maar het gebeurt ook dat bij vrouwen, die hevige weeën te verarbeiden hebben, om dat het hoofd des kinds zeer groot is, bijzonderlijk als de Natuur de kraakbeenderen en banden van het bekken verslapt heeft; dat zeg ik, de beenderen van het bekken, zoo wel de schaambeenderen, en, van achteren de ongenaamde beenderen van het heiligbeen, geheel afwijken, en zoo beweegelijk worden, als of zij gebroken waren: het vanéénwijken der kraakbeenderen aan de schaambeenderen, veroorzaakt groote pijn, en in de beweegelijkheid deezer beenderen het onvermogen om te gaan, of rechtop te staan: dit

zijn de tekens voor den Vroedmeester, dat deeze beenderen vanëen geweken zijn.

In dit geval moet men geen' tijd verzuimen, maar terstond naa de geboorte, door een goed en vast verband, de bekkebeenderen aanëen, het verband met versterkende middelen nat houden, en de vrouw, zoo lang mogelijk, laten rusten; wanneer voords de kraamzuivering opgehouden is, maake men gebruik van koude baden: verzuimt men deezen, zoo blijven de vrouwen jaaren lang in dien elendigen toestand.

Overmaatige wijdte van het bekken.

Het bekken kan, of in zijne geheele holte, of alleenlijk in zijn' in- of uit-gang te wijd zijn: is het aan den ingang te wijd, zoo neemt men waar, dat de voorberg des heiligbeens te verre teruggedrukt, of dat het schaambeen te veel naar buiten gebogen is.

Uit dit gebrek ontstaat gemeenlijk eene onvolkomene uitzakking van de baarmoeder, en in de zwangerheid geeft het de meeste gelegenheid tot eene ombuiging derzelve: maar begint de verlossing, zoo gaat in den beginne het hoofd wel gemakkelijk in het bekkenhol, maar eindelijk maakt het de geboorte langzaamer en moeilijker; daar de ondervinding leert, dat de uitgang van het bekken zoo veel naauwer, dan derzelver ingang wijder is.

De alte groote wijdte van het bekken, in deszelfs uitgang, heeft zijnen oorsprong daarin, dat de boog der schaambeenderen, of de zitbeens knobbels te ver van elkander afstaan, of het heiligbeen met het staartbeen te veel teruggebogen is; of dat het staartbeen te beweegelijk is; in dit geval gaat de geboorte, in den beginne, wel wat langzaam, maar het einde derzelve is des te schielijker, om dat hier de uitgang wijder is, dan de ingang te vooren te naauw was.

Maar is het geheele bekkenhol te wijd, zoo is dit een

gebrek in het natuurlijk maakfel van 't ligchaam: men zoude niet gelooven, zoo de ondervinding het niet beweeze, dat zulk een geval van een al te wijd bekken, een gevaarlijke en zwaare geboorte kan veroorzaaken; meestal krijgen de vrouwen, welken van natuure een wijd bekken hebben, door geringe oorzaaken, eene volkomene uitzakking van de baarmoeder, en waar zulks niet staande de zwangerheid gebeurt, heeft het echter eenige tijd daarna plaats; dan, als de eerste weeën, bijzonderlijk zoo dezelve hevig zijn, en in eene opgerichte plaatsing, in den stoel verarbeid worden, zakken de mond en hals der baarmoeder met het hoofd des kinds, diep in het hol van 't bekken neêr, alvorens de baarmodersmond zig nog verwijdt heeft.

Men heeft bij een alte wijd bekken waargenomen, dat de baarmodersmond zig eerst buiten de lippen der schamelheid geopend heeft: wanneer men in dit geval het onderste gedeelte der baarmoeder zig door den ingang; of, zoo de uitzakking volkomen is, ook door den uitgang begeeft, en dezelve aangedrukt wordt, zal het verwijderen van den baarmodersmond langzaam, pijnlijk, en gevaarlijk weezen; doch altoos heeft men eene schielijke geboorte te verwachten, die voor moeder en kind gevaarlijk kan worden; de baarmodersmond wordt naamlijk spoedig verwijdt, en kan daardoor inscheuren, en de vrucht onverwachts met het water, op den grond vallen, de navelstreng breeken, of den moederkoek met geweld losrukken, waardoor verscheiden ongelukken kunnen ontstaan, welken wij in eenige volgende afdeelingen nader zullen beschouwen.

Wanneer men voelt, dat een alte wijd bekken aanweezig is, moet men de vrouw, op het bed liggende verlossen: (derhalven weder een voordeel om die wijze ter hand te neemen:) als 't mogelijk is, moet men ten eersten de vliezen breeken, om een weinig van het water te ontlasten: de lijderes moet niet persen, en staande iedere vlaag moet men met de hand, welke men daartoe in het bekken gebragt heeft, den baarmodersmond terug, en omhoog houden, tot dat dezelve zig verwijdt heeft, en het hoofd des kinds in het hol van 't bekken slaat: tegen

de flapte van den baarmoeder en derzelver bloedvloed, geeft men een weinig *ticht: cinamomi*; uitwendig maakt men gebruik van koud water met azijn — naa de geboorte moeten zulke vrouwen langer het bed houden dan anderen.

Over het te weinig gebogen heiligbeen.

Dit gebrek van 't bekken, hetwelk door de meeste Schrijvers voorbij gegaan is, heeft somtijds kwaade gevolgen: als het heiligbeen in eene rechte lijn, naar beneden, in het bekkenhol staat, gelijk bij de mannen, en niet genoeg, of behoorelijk aan het onderende naar binnen, tegen het bekkenhol gebogen staat, zoo wordt het hoofd, in eene rechte lijn, naar beneden, op de bilnaad gedrukt: deeze wordt daardoor, dat is naamlijk door het hoofd, ingescheurd, of door hetzelfde tegen de schamelheid naar vooren gedrukt, zoo dat zij zes en meer vingers breed wordt, welke uitzetting en spanning de grootste pijn verwekt.

De geheele opening der schamelheid schijnt in dit geval gestadig naauwer en kleiner te worden; daarentegen wordt de opening van den endeldarm gestadig wijder; en 't is deeze vrouwen, als of het kind van achteren wilde uitkomen.

In dit geval moet men twee vingers, of wel eenen krommen hefboom, tuschen het hoofd des kinds en de bilnaad brengen, om 't gemelde hoofd onder den schaambeensboog te drukken, en alzoo tevens met den vinger, of het werktuig, 't hoofd naar vooren geleiden, iet het welke anders door de natuurlijke kromte van het heiligbeen gedaan wordt.

Ten einde met den vinger de bilnaad niet intescheure, moet men, voor de in het bed liggende vrouw staande, de gemelde naar voorendrukking doen; want als men laager dan de baarende zit, kan deeze hulp niet goed toegebracht worden: somtijds is in dit geval eene kleine

inscheuring van de bilnaad onmogelijk te vermeiden; daarom moet men de schuld daarvan niet altoos op de Vroedvrouw schuiven.

'T is in deeze omstandigheid een slecht gebruik, met den vinger in den endeldarm der lijdresse, welke daartoe altoos openstaat, integaan, om het hoofd des kinds naar vooren te drukken; want men heeft waargenomen, dat door dit drukken ontfteeking, zweeren, en pijpzweeren, in den endeldarm ontstaan, waardoor de drekstof zig als dan, op eene zeer onaangename wijze, zoo wel uit de schede, als uit den gezegden darm ontlast; maar als het hoofd geheel op de bilnaad staat, dan is het mogelijk, om tusschen die beiden door, den vinger intebrengen, zonder de bilnaad intescheuren: in dit geval, derhalven, moet men het hoofd van de bilnaad door den endeldarm, zachtjens naar vooren trachten te drukken, terwijl men tevens, van buiten, de bilnaad op- en tegenhoudt, en de geboorte, als het ware, over de hand laat gaan.

De alte groote beweegelijkheid des staartbeens.

Als het staartbeen al te beweegelijk is, wordt de bilnaad meer dan gewoonlijk, door het hoofd des kinds, naar achteren gedrukt, en kan dus ook ligtlijk ingescheurd worden:

In dit geval moet men zig van de handgreepen bedienen, welken in de laatstvoorgaande afdeeling zijn voorgedragen.

Gebreken aan de lippen der schamelheid.

Bij eerstkraamende vrouwen kan men duidelijk waarneemen, dat de lippen der schamelheid, van buiten, in grootte afneemen, naar maate de schede door het hoofd des kinds vanëen wijkt; dewijl zij door het verwijden der schede naar binnen getrokken worden: alzoo is ligtlijk

te begrijpen, waarom eene zwelling der lippen, de geboorte moeilijker maakt, en langzaamer doet voordgaan.

Deeze gebreken zijn wel niet van zoo veel aanbelang, als de voorgaande en de nog volgende; echter is het niet zeldzaam, dat zij, gelijk gezegd is, eene natuurlijke geboorte zwaarder en traager maaken: de Vroedmeester moet de lijdere, alleenlijk om der kwaade gevolgen wille, in het kraambed naauwkeurig in het oog houden.

De gebreken der schaamlippen zijn:

- 1) Het watergezwel.
- 2) Het bloedgezwel.
- 3) Het onstoken gezwel.
- 4) De stijfheid der teeldeelen.

Het watergezwel der schaamlippen.

Niet zelden heeft men bij eene waterzuchtige vrouw, reeds in de laatste maanden der zwangerheid, opzetting van de groote en kleine schaamlippen, ter hoogte van eenige duimen, waargenomen.

Dit gezwel is de zwangeren in het gaan zoo hinderlijk, dat sommigen veele weken vóór de geboorte reeds het bed moeten houden, om dat zij haare deiebederen niet genoeg kunnen beweegen.

Men moet dit gezwel in de eerste plaats door sterken de en verdeelende middelen trachten te verdrijven; bij voorbeeld: door *aq: vegt mineral* of *dig:* zo de tijd der verlossing nadert, en de nog aanweezende zwelling aan het onderzoek hinderlijk is, of ook zo dezelve de geboorte werkelijk pijnlijk maakt, kan men één of twee oppervlakkige insnijdingen doen: hierdoor heeft men, eenige maalen, al het aanwezig vocht droppelswijs uit de gemaakte insnijdingen zien uitsijpelen, en de lippen

zonder eenig daarop volgend nadeel zien samenvallen : worden deeze insnijdingen verzuimd , zoo heeft men dikwijls , wegens het kwetsen door de verlossing , het zwellende deel tot eene versterking der lippen zien overgaan : intusschen is dit samenvallen der gezwollene lippen , door de bewuste insnijdingen , maar voor een korten tijd ; want aldra geneezen zij , en dan ontstaat schiekelijk eene nieuwe zwelling : hier van daan dat de insnijdingen eenige keeren herhaald moeten worden : ondertusschen heb ik mij , in dit geval , zeer wèl bevonden , bij het aanwenden van een dampbad.

LEVRET en de beroemde VAN SWIETEN hebben tegen het watergezwel der lippen aangeraden , het leggen van een spaansche vliegpleister , gedeeltelijk op de lippen en gedeeltelijk tot aan het midden der deelen : wanneer de vrouwen dit willen toelaaten , kan men op zulk eene wijze , het water spoediger ontlasten , dan door insnijdingen , welken , gelijk reeds gezegd is , alte schiekelijk geneezen ,

Het bloedgezwel der schaamlippen.

Somtijds worden de groote en kleene lippen met de schede , door het in 't celwijsweefzel uitgestorte bloed , blaauw , gezwollen , pijnlijk en hard , alzoo dat zij , om zoo te spreken , twee kleene met bloed opgevulde blaazen schieken te wezen : dit veroorzaakt almede eene zeer pijnlijke en zwaare geboorte ; en zo de lijderes de weeën met eenig geweld verarbeidt , scheuren dikwijls de schede en de kleene lippen , waardoor eene doodlijke bloeding veroorzaakt kan worden : de gekneusde deelen gaan daarop ligtlijk tot versterking over , of laten , na de geboorte , kwaadaartige zweeren achter.

Hierom moet men bij volbloedigen nog vóór de verlossing , de aderlating niet verzuimen , en gebruik maaken van sloovingen met azijn en water , waarin eenig ammoniac

zont is opgelost, op de schaamdeelen: zo de zwelling naar deeze hulpmiddelen niet luistert, moet men het kind keeren en naar buiten brengen; doch tevens met de voormelde soving, zoo wel staande als naa de geboorte, aanhouden.

De onsteeking der schaamlippen.

Bij zwaare en lang aanhoudende geboorten, ontfleeken dikwijls, niet alleenlijk de groote en kleene lippen, maar zelfs ook de vliezige ploojen der schede.

Deze opgezwollene deelen verhinderen meestal het hoofd in den uitgang, en veroorzaaken veel pijn; zij worden geheel droog, en heet, en de geboorte wordt daardoor moeilijker en langzaamer; dikwijls volgt op deeze onsteeking, naa de geboorte, versterking.

Men moet in dat geval ten eersten aderlaaten, en *antiphlogistische middelen* toedienen; van buiten eene weckmaakende gortpap, met azijn van goudglit, op de ontstokene deelen leggen, en de schede van binnen met olie smeeren.

De stijfheid der uitwendige teeldeelen.

Bij de eerstkraamenden, en die reeds tamelijk bejaard zijn, of welken, naa haar veertigste jaar, voor de eerste maal bevrucht zijn, worden, zoo wel alle de teeldeelen, als mede de baarmoedersmond, de schede, de bilnaad en de heilig- en zitbeens-banden, bevonden eenigzins stijf te wezen; hierom hebben deeze vrouwen ook altoos eene langzaamer en moeilijker verlossing, dan anderen: in dit geval moet men gebruik maaken van halve baden, en van het dampbad, voords het onderlijf dikwijls smeeren, en olie in de schede inspuiten: inwendig geeft men middelen, bereid uit hennipzaad, kliswortel, of amandelmelk: men moet voords in dit geval met taai geduld de werking der Natuur afwachten.

Gebreken der schede.

De gebreken der schede zijn van veel meer aanbelang; dan die der schaamlippen; echter worden deezen dikwijls, door de natuurlijke werking, geheel wonderlijk overwonnen: wij tellen onder de gebreken der schede, de volgende:

- 1) De tegennatuurlijke vernauwing der schede,
 - 2) Het samengroejen derzelve,
 - 3) De tegenwoordigheid van het maagdevlies, of eene tegennatuurlijke huid,
 - 4) De inzakking der schede,
 - 5) De schedebreuk,
 - 6) De onsteeking der schede,
 - 7) De pijnlijke zweeren derzelve,
 - 8) Haare droogheid,
 - 9) De krampachtige samentrekking der schede;
 - 10) De schede welke zig in den endeldarm opent,
 - 11) Die welke vlak onder den navel hare opening heeft.
-

De tegennatuurlijke vernauwing der schede.

Er zijn vrouwen bij welken de schede, van de geboorte af aan, wegens zekere gebreken in de vorming, somtijds ook door lidtekenen en verhardingen, welken naa eene zweer of eene inscheuring ontstaan zijn, zoo naauw is geworden, dat men niet eens een vinger in dezelve kan inbrengen; en echter hebben zulke vrouwen, niettegenstaande het manlijk lid in geenen bijslaap naar binnen gebragt heeft kunnen worden, alleenlijk door de besmetting van het manlijke teelvocht op de buitenste teeldeelen der vrouwe, ontvangen (*): ik was bij zulk een geboorte tegenwoordig, en heb ondervonden dat de wondervolle natuurkracht, in een tijd van agtien uren, de schede, zonder eenig beletsel, gelukkiglijk verwijdde, en de geboorte daarstelde.

(*) Mischien is de Schrijver hierdoor misleid geworden.

Hoe naauw de schede moge weezen, laat zij echter, wegens haar uitzettend vermogen, nog altoos op eene verwijding hoopen. Men vindt in de verhandelingen van de Academie der Weetenschappen, te *Parys*, dat eene vrouw, die reeds tien jaaren getrouwd geweest was, zulk eene naauwe opening der schede had, dat men er naauwlijks eene penneschacht konde inbrengen: deeze vrouw gevoelde, ten tijde dat de maandstonden vloeiden, en welken zig niet behoorelijk konden ontlasten, eene pijnlijke spanning: eindelijk werd zij na elf jaaren tijds zwanger: haar heelmeester meende dat zij nooit zoude baaren, en ondertuschen begon haare schede zig, in de vijfde maand, te verwijden, en bleef vervolgens verwijd; tot zij, op het laatste, de natuurlijke wijdte had, en de vrouw gelukkiglijk verlost.

In 't geval, door mij zelven waargenomen, was het den man, in drie jaaren lang, niet mogelijk geweest, zijne vrouw, om reden dat haare schede te naauw was, op de algemeene wijze te beslaapen: ik vond, bij mijne komst, de schede zoo naauw, dat noch ik, noch de vroedvrouw, een' vinger in dezelve konde inbrengen, en echter verwijdde zij zig gelukkiglijk door den aandrang van het hoofd des kinds, in den tijd van slechts agttien uren.

Ook de lidtekens en andere eeltachtigheden der schede, hebben eenige beoeffenaars der Vroedkunde toegeschenen, eene aanwijzing tot de keizerlijke snede te weezen: *VATER* zegt, dat men die snede met goed gevolg gedaan heeft aan eene vrouw, wier schede, naa eene verzwering, zoo vol van eelt was geworden, dat men, niet zonder moeite, den top des vingers naar binnen kon brengen: *GUILEMAN* heeft, in een dergelijk geval, die snede met het beste gevolg gedaan. „Ik maakte,” zegt hij, „eene insnijding, en hierop werd de verwijdingspiegel zoo gelukkig aangebragt, dat alle lidtekens uitgerekt werden, en de vrouw, slechts drie uren daarnaa, gemaklijk verlost.”

De samengroeijing der schede.

Na langduurige zweeren, groejen de ploojen der schede soms geheel, of ook wel voor een gedeelte, samen: dit gebrek der schede schijnt onoverwinnelijk te zijn, en daarom de verlossing onmogelijk te maaken; echter zijn er voorbeelden, dat of de kunst, of ook alleenlijk de Natuur, de geboorte, in dit geval, zonder de keizerlijke snede daargesteld heeft.

De Heer DE LA MOTTE werd geroepen bij eene samengegroeide schede, die de geboorte tegenstond; naa dat de tegenstandbiedende deelen doorgesneden waren, en met de *speculum matricis* niets verricht konde worden, werd hij gedwongen, de geheele eeltachtigheid, die het samengroejen had veroorzaakt, wegteneemen: een quartier uurs naa deeze kunstbewerking, werd de vrouw verlost — naa verloop van drie maanden was zij wede zwanger, en verlost, ten behoorelijken tijde, zeer gelukkig: ZIBMACHER heeft bij eene baarende vrouw, de schede, in derzelver midden, een duim breed samengegroeid gezien: het scheen als of het kind door de opening van den endeldarm wilde uitkomen; dan, de samengroeijing der schede werd doorgesneden, en de vrouw verlost gelukkig — Zeer gemakkelijk kan dit vanëenscheiden gedaan worden, als alleenlijk de lippen, of het onderste gedeelte der schede, samengegroeid zijn: dit hadde men bij die vrouw, van welken HARVIJ spreekt, moeten beproeven.

De tegerwoordigheid van het maagdevlies.

Somtijds gebeurt het, dat het maagdevlies of al te taai; of al te slap is, en derhalven onder den bijslaap, al worde de vrouw bevrucht, niet breekt: wanneer in dit geval de tijd der verlossinge daar is, kan men met het bloote oog zien, dat zig een vlies, halvemaanswijze, over den

kruin des hoofds zeer sterk spant, en alzoo de geboorte verhindert: zeker heelmeeſter, voor wiens getuigenis ik borg ſta, heeft mij verzekerd, dat hij bij eene baarende vrouw, een bijna kraakbeenig maagden-vlies heeft waargenomen; een vlies, 't welk het hoofd des kinds tegenhield, alzoo dat hij naauwlijks in ſtaat was, hetzelve met eene ſchaar doorteknippen — Dit gebrek der ſchede, moet derhalven door eene doorsnijding verholpen worden.

Het vleeschgezwel der ſchede.

Wanneer vóór het begin der geboorte een vleeschprop, of eenig ander overtollig vleeschgezwel, in de holte der ſchede aanwezig is, moet hetzelve, nog vóór de geboorte, of door afbinding, of door eenige inſnijding, weggenomen worden, op dat het bedoelde gezwel het hoofd des kinds, ſtaande de geboorte, niet tegenhoude.

Het uitzakken der ſchede.

Als een gedeelte van het binnenſte vlies der ſchede, of als hetzelve geheel, door welke oorzaak ook, buiten de ſchamelheid geperſt wordt, kan de verlosſing, door dit gebrek, wel niet tegengehouden worden; maar als men ſtaande de geboorte het uitgezakte deel der ſchede niet tegenhoudt, zoo word hetzelve tuſſchen 't hoofd des kinds en den uitgang, of de onderſte opening van het bekken, gekneld, waardoor aan het buiten geraakte deel ontſteeking, verettering, en verſterving kan ontſtaan: toevallen welken tot een langduurig kraambed aanleiding geeven.

De Vroedkundige helper moet hierom in den beginne der verlosſinge zorg draagen, dat het uitgezakte deel der ſchede, met twee vingers eener helpende hand, ſtaande iedere vlag, zoo lang teruggehouden worde, tot het hoofd des kinds zig juist op de uitzakking bevindt.

De schedebreuk.

Het gebeurt somtijds, dat bij bevruchte vrouwen, de volle pisblaas door de zwangere baarmoeder gedrukt wordt; dat dezelve geheel in de schede uitpuilt, en den weg tot de geboorte vernauwt: men moet derhalven altoos zorgen voor de ontlasting der pis, en dezelve door middel van eenen katheter laten uitloopen, op dat niet de pisblaas onder de geboorte barste, hetwelk een doodlijk toeval is.

Op gelijke wijze kan de opgehoopte drekstof ook den endeldarm uitzetten, en de geboorte verhinderen, als naamlijk dit opzetten in de schede uitpuilt: in dit geval moet men vooral zorgen, dat de opgehoopte drekstof, door clysteeren, weekgemaakt en uitgevoerd worde.

De onsteeking der schede.

Wanneer de ploojen der schede alleen, of wel tevens met de schaamlippen onsteeken, wordt daardoor den weg tot de geboorte gestopt; hiertoe zijn de aderlaatingen, en de gepaste genceesmiddelen noodig: in de onstokene schede kan men een laauw warm afkooksel van den heemstwortel inspuiten.

De pijnlijke zweeren der schede.

Vrouwen wier deeldeel met het venerische gift besmet zijn, hebben voorzeker eene ongemeene zware geboorte te verwachten, wanneer de schede met veele zweeren en *condylomata* bezet zijn, dewijl die deelen als dan, zonder sterke pijn, geen groote verwijding toelaat;

ten : zulke vrouwen willen de weeën niet recht verarbeiden, en daardoor verlengen zij de geboorte : ook in dit geval moet men gebruik maaken van olieachtige inspuitingen, en door een dampbad de schede flapper trachten te maaken; voords moet men, zulke vrouwen, tot haare straf, aanzetten, de weeën sterk te verarbeiden.

De droogheid der schede.

Uit de slijmklieren van den baarmoedersmond en der schede, wordt op het einde der zwangerheid, eene groote hoeveelheid van slijm, voornaamlijk staande de geboorte, afgescheiden.

Die slijm maakt alle deelen zacht en glibberig, en verhindert het wrijven, 't welk door het hoofd des kinds veroorzaakt zoude kunnen worden.

Wordt die slijm niet in de gewoonlijke hoeveelheid afgescheiden, of wordt dezelve door het te dikmaals onderslaan met de hand afgeveegd, zoo wordt de schede geheel droog: het gemis van deeze natuurlijke slijm kan, in dit geval, hersteld worden, door het inspuiten van olie, of door eene samenstelling uit Arabische gom, querc-pitten, en olie.

De krampachtige samentrekking der schede.

Bij vrouwen, wier zenuwgestel zeer gevoelig is, bespeurt men somtijds een krampachtige samentrekking der schede, welke het hoofd belet doortegaan; of naa dat hetzelfde geboren is, het overige van den tronk des ligchaams vast geklemd houdt, in maniere van een handschoen: in dit geval is der baarende de rust, olie-achtige middelen, het dampbad, en de *opium*, in de eerste plaats, noodig:

ik heb, bij eene mijner vriendinnen, deeze kramp der schede, aan welke ik te vooren nooit geloofde, ontegensprekelijk waargenomen: zij werd op het einde van de zesde maand haarer zwangerheid, door eene stuip overvallen; deeze perste het kind, dat zig met de voeten aanbod, door den baarmoedersmond, tot over het hoofd, naar buiten: dit kleene hoofd werd, met de armen, in de schede vastgehouden, alzoo dat het naauwlijks mogelijk was de armen los te maaken: dit echter verricht zijnde, trok ook de schede zig over den hals zoo vast samen, dat het mij in een geheel uur tijds niet mogelijk was, tusfchen de schede en het hoofd des kinds te komen: na eenig tijdverloop bedaarde de stuip, en nu konde ik het hoofd met het kind gemakkelijk naar buiten brengen.

De schede welke zig in den endeldarm, en vlak onder den navel opent.

Met verwondering heeft men waargenomen, dat de Natuur bij sommige vrouwen, een geheel tegennatuurlijke plaatfing, zoo wel der schede, als ook der fchamelijkheid verkozen heeft: alzoo zag HUXHAM, de fchamelijkheid en de opening der schede zig bij den navel, en CHAPMAN en GRIFFAR, zagen de schede zig in den endeldarm openen: offchoon deeze speelingen der Natuur in 't algemeen zeldzaam zijn, zullen wij dezelve echter niet met ftilzwijgen voorbij gaan; want als dergelijk eene vrouw zig zwanger bevindt, wordt de Vroedmeester in de grootste verlegenheid gebragt: evenwel toonen de opgetekende waarneemingen, dat men geen reden heeft om aan 't leven der baarende vrouwe te wanhoopen, wanneer dezelve slechts genoeg moeds bezit, en de Vroedmeester genoeg verftands heeft, om te zien, of eene goede keering, een ftoute snede, of een ander wèl bedachte handgreep helpen kan: de volgende gebeurtenis, welke door den

beroemden HUXHAM opgetekend is, kan in een dergelijk voorkomend geval, veel lichts bijzetten.

„Eene drie-en-twintig jaarige vrouw, welke met een sterken matroos getrouwd was, en zwanger werd, had, ter plaatse van den navel, eene opening van naauwlijks een vinger breed: door deeze opening ontlastte zij de pis, en alle maanden het gewoone bloed; en door deeze zelfde opening werd zij ook bevrucht: twee vingeren breedte onder de navelopening, op de plaats der schamelheid, was een tweede, langwerpige opening, wier middelijn naauwlijks een kleene vinger doorliet: onder deeze tweede opening, was nog een derde, die de opening van den endeldarm was, en die zig op haare gewoonlijke plaats bevond: de kundige Vroedmeester, welke bij deeze vrouw geroepen was, onderzocht, met zijnen vinger, de eerste opening, maar konde door dezelve den mond van de baarmoeder niet bereiken, doch voelde, dat een sterk vlies deeze opening van het daar onderliggend tweede kanaal afscheidde, en begreep alzoo dat de weg naar den baarmodersmond, door de eerste opening gaan moest: nu naderde de tijd der geboorte; de sterke beweging der vrucht, de stuipen der moeder, de plaatshebbende en grouwzaame weeën, waardoor de schede echter niet verwijld werd, veroorzaakte bij den Vroedmeester en de omstanders zwaare bezorgenis voor het leven der lijderesse: de eerstgemelde door medelijden aangefpoord, wilde nog een hulpmiddel beproeven, alvorens de lijderes den gewissen dood ten prooje te geeven; hij bragt naamlijk, een *schalpel* in de tweede opening, en kliefde met ééne snede de huid, benevens alle zachte deelen, welken de eerste en tweede opening vanéén scheidde, en alzoo genoeg ruimte maakte, om met zijne hand, den baarmodersmond te bereiken: hij verwijdde deezen, voelde indenzelfen het hoofd des kinds, in welks mond hij twee vingeren bragt, en door deezen handgreep bragt hij een welgevormd en leevendig kind naar buiten: de moeder is in het leven gebleven, en de wond

„voor het grootste gedeelte genezen; alleenlijk heeft zij „eene uitzakking gehouden.”

Men heeft waargenomen, dat de geheele schamelheid als ook de schede ontbrak; op de plaats der schamelheid vond men alleenlijk de opening van den pisweg: in dit geval heeft de baarmoedersmond zig in den endeldarm geopend: door deezen weg werd de vrouw bevrucht, en ook door denzelven verlost zij.

Gebreken van den baarmoedersmond.

De gebreken van den baarmoedersmond zijn op zig zelven van meer aanbelang dan die der schede: niet zelden vorderen zij de hulp der kunst, offchoon zij somtijds door de Natuur alleen overwonnen worden: dergelijke gebreken zijn

- 1) De samengroeying van den baarmoedersmond.
- 2) Deszelfs verharding.
- 3) Gezwellen.
- 4) Ontsteeking.
- 5) Uitzakking.
- 6) De krampachtige samentrekking van denzelven.

De samengroeying van den baarmoedersmond.

Men heeft waargenomen, dat de baarmoedersmond bij eenige vrouwen in haare zwangerheid samengegroeid is: tot deeze samengroeying kunnen tweeërleie oorzaken gelegenheid geeven: ten eersten, als de baarmoedersmond met zweeren bezet is, of als dezelve door de eerste geboorte ingescheurd, en naa de tweede bevruchting eerst weder dicht gegroeid is: bij die vrouwen bij welken het heet dat de baarmoedersmond van de geboorte af toegegroeid is, en echter bevrucht geworden zijn, blijkt, dat evenwel, vóór de bevruchting, eene kleene opening aan-

weezig moet geweest zijn, maar welke echter eerst in de zwangerheid dicht gegaan is.

Men kent deeze samengroeiing door het onderzoek met den vinger, als naamlijk de hevige weeën een gedeelte der baarmoeder in de schede persen, doch de baarmoedersmond zig niet verwijdt in dit geval moet men, zonder verzuim, met een verborgen breedpuntig lancet, in deszelfs midden eene insnijding maaken: indien men de vinger der linker hand aan den baarmoedersmond houdt, kan men, zonder schroom, 't gezegde, in zijn koker verborgen, lancet, daar heen brengen.

De verharding van den baarmoedersmond.

De verharding en vernauwing van den hals der baarmoeder, naa verouderde zweeren, of inscheuringen, welke staande den tijd eener zwaare geboorte ontstaan zijn, geeven aanleiding tot verharding van den baarmoedersmond: is nu dit gebrek reeds vóór de geboorte ontdekt geworden, zoo laat men de zwangere vrouw eenige geneesmiddelen tegen deeze verharding gebruiken; bij voorbeeld: de *cicuta* met wat *mercurius*; maar is de geboorte reeds dáár, zoo maakt men insnijdingen in den baarmoedersmond, en haalt men het kind, door de keering, naar buiten — van de zoo zeer aangeprezene dampbaden kan men weinig goeds verwachten.

Doctor SIMSON bericht ons het volgende gedaan te hebben: naa dat hij, bij eene geboorte, welke reeds drie dagen geduurd had, vergeefs op eene verwijding van den hals der baarmoeder gewacht had, nam hij waar, dat de wanden van dien hals samengegroeid waren, hetwelk hem bewoog, eene insnijding te maaken, die, zoo als hij zeide, voor het minst een half duim was; intusfchen konde hij door dit middel geene genoegzaame verwijding bekomen, offchoon het hoofd des kinds zig wel vertoonde, maar was genoodzaakt, nog veele andere

insnijdingen te doen, aan den omtrek, welken bijnaa eene kraakbeenigen ring vormde: hij verzekerde dat, ten tijde toen hij deeze insnijding maakte, niet één druppel bloeds op dezelve volgde, en dat de lijderes ook geen de minste pijn gevoelde — HENKEL heeft insgelijks zeer gelukkiglijk dergelijke insnijdingen in eenen eeltachtigen baarmoedersmond gedaan — De vrees voor eenen daarop volgenden bloedvloed moct den Heelmeester niet terughouden, om eene insnijding aan den hals der baarmoeder te doen, wanneer slechts de aanwijzing zeker is: de bedoelde bloedvloed kan niet anders dan middenmatig zijn, om dat die hardgewordene deelen zeer weinig bloeds geeven, en men zoude, in geval van bloeding, met eene ingebragte hand, den eeken zwam eenen tijd lang op de wonde kunnen houden: LOUIS heeft in zijne verhandeling over de *versteende mengfels* der baarmoeder, aan de hand gegeven, om den baarmoedersmond met eenen, aan de buitenste randen scherp gemaakte, schar, te verwijderen.

De gezwollen aan den mond der baarmoeder.

Wanneer er gezwollen aan den mond der baarmoeder plaats hebben, is de geboorte altoos zwaar, ja kan zelfs geheel onmogelijk worden: HILDANUS heeft eene vrouw, op den zevenden dag, in den arbeid zien sterven: bij de opening van het ligchaam vond men de baarmoeder ingescheurd, en het hoofd des kinds, 't welk door de opening was heen gegaan, in de holte des buiks: de zwaarigheid der geboorte ontstond uit eene *scirrhouze* zwelling, welke de grootte van een kinderhoofd had, en zig aan den grond der baarmoeder bevond, aan welken zij vastgegroeid was: AMAND heeft een dergelijk gezwel gezien, 't welk men, in het eerst, voor het hoofd of de billen eens kinds aanzag: de Vroedmeester konde de vrucht alleenlijk daarom uithaalen, om dat de deelen des ligchaams tot verrotting overgegaan, en des wijkende

waren: BARTHOLIN verhaalt eene dergelijke waarneeming.

Daar de verwijderde mond der baarmoeder met de grootte van het daardoor gaande hoofd des kinds gelijk moet wezen, zoo moeten, zegt SIMON, in zijne voortreffelijke verhandeling over de keizerlijke snede, de groote knoestachtige gezwellen aan deeze verwijding zekerlijk hinderlijk zijn: in zulk een geval nu wordt de keizerlijke snede aanbevolen, als naamlijk het gezwel niet weggenomen, of dat het kind niet, naast het gezwel, naar buiten gebragt kan worden — Het wegnemen deezer gezwellen konde, wierde hetzelve staande den arbeid gedaan, van doodlijke gevolgen wezen; niet alleenlijk wegens de prikkeling dier deelen, maar ook wegens den bloedvloed, welken door de gemeenschap der bloedvaten deezer zwellings met die van de baarmoeder, plaats zoude grijpen: dan, ik geloof, dat de keizerlijke snede zelve ook gevaarlijk zoude wezen: als het mogelijk ware 't gezwel wegteneemen, moet dat wegnemen de voorgezegde operatie voorgetrokken worden.

De ontsteeking van den mond der baarmoeder.

Men neemt somtijds, bij eene natuurlijke geboorte, waar, dat de baarmoedersmond geheel ontstoken is; of ook is het somtijds in de voorste lip, somtijds de achterste alleen: hier vindt de Vroedmeester de een of ander deezer deelen dik, hard, droog, pijnlijk, en heet op het gevoel: in dit geval moet men ten eersten aderlaaten, en, zoo wel in- als uitwendig gebruik maaken van middelen, welken tegen de ontsteeking aanbevolen worden: in de schede moet men een afkoofsel van lijnzaad inspuiten, of wel eenig ander verzachtend middel.

De uitzakking van den mond der baarmoeder.

Wanneer er een gedeelte van de baarmoeder reeds vóór de geboorte, in het hol van 't bekken, zonder dat dit te wijd is, naar beneden gaat, zoo wordt hetzelfde, door het voorkomend hoofd des kinds, tegen de beenige holte van het bekken gedrukt, en er ontstaat alzoo eene langzaame en pijnlijke geboorte: in dit geval is het derhalven noodzaakelijk, dat de baatende vrouw in een bed worde gelegd, met de billen omhoog, en dat men het uitgezakte deel der baarmoeder zoo lang, met twee vingers, terug houde, tot het hoofd des kinds door de opening der schede heen gegaan is.

De krampachtige samengetrokken mond der baarmoeder.

Somtijds neemt men bij eenige valsche weeën waar, dat dezelve den mond der baarmoeder zoodanig samen-trekken, dat hij geheel hard wordt, en deeze weeën persen in de baarmoeder opwaards: die kramp, welke den mond der baarmoeder en den hals inneemt, maakt de geboorte pijnlijker, dan bij de natuurlijke weeën plaats heeft; des moet men hier gebruik maaken van *opium*: somtijds gebeurt het, dat de kramp eerst dan ontstaat, wanneer het hoofd reeds geheel den mond der baarmoeder is doorgestaan: is deeze kramp van langen duur, zoo kan dezelve den hals des kinds zoodanig knypen, dat hetzelfde sterft, door dat het teruggaan van 't bloed uit het hoofd verhinderd wordt; komt het kind met de voeten vóór, zoo verhinderen de armen wel dat de hals niet geknepen wordt; maar ik heb echter gezien, dat het hoofd en de armen daardoor sterk teruggehouden zijn geworden, en naa dat de armen uitgebragt waren, had ik nog veel moeite om het hoofd van een zesmaands kind doortebrengen: in dit geval moet

moet men geen geweld op den mond der baarmoeder aanwenden, maar *opium*, en warme verslappende Dranken toedienen; ook moet men eene warme verzachtende pap op den buik en de teeldeelen leggen, en dan een tijd lang wachten, tot dat de aanval van de kramp voorbij is, zoo als wij in de afdeeling over de kramp in de schede gezegd hebben.

De gebreken der baarmoeder.

De baarmoeder zelve kan de grootste hinder in de natuurlijke en ligte geboorte veroorzaaken: meest alle haare nadeelige gesteldheden zijn doorgaands aanmerkelijk, zij zijn de volgende:

- 1) De scheefstaande baarmoeder,
- 2) Haare breuk;
- 3) — Ontsteeking,
- 4) — Versterving,
- 5) — Verlamming,
- 6) — Scheuring,
- 7) Wanneer zij van de schede afgescheurd is;
- 8) De bloedvloed der baarmoeder.

De scheefstaande baarmoeder.

De baarmoeder staat scheef, als derzelve bodem en mond niet in eene rechte lijn met de as van het bekken liggen.

In dit geval wordt de geboorte zwaar, of wel, zonder bijstand der kunst, onmogelijk, om dat het hoofd niet in eene rechte lijn in het bekken, maar op dat gedeelte van de beenderen van het bekken wordt geperst, waar naar toe de mond der baarmoeder gericht staat,

De oorzaaken deezer scheeve ligging van de baarmoeder zijn, een gebrek in de eerste vorming; eene al te veel naar buiten gebogenheid der eene of andere darmbeensvleugelen; een mismaakt bekken; eene al te hooge ligging der baarmoeder; het vastzitten van den moederkoek, buiten den bodem der baarmoeder; eene zwelling van den omgewonden darm tegen de pisblaas, tegen de eïernesten, of een ander tegennatuurlijk gezwel, 't welk de baarmoeder uit haare natuurlijke plaats dringt: ook bij vrouwen, welken eenen bochel hebben of mank gaan, kan de baarmoeder scheef leggen.

De baarmoeder kan op vierderleie wijzen scheef staan:

- 1) Naar het rechter darmbeen:
- 2) — — — linker darmbeen:
- 3) — — — staartbeen:
- 4) — — — heiligbeen.

Deeze vier hoofdzaaklijke scheeve staanden der baarmoeder zijn wel de voornaamsten; en daar in de geheele ruimte der bovenste opening van het bekken geen punt is, waar naar toe de baarmodersmond niet kan staan, zoo moet men zig deeze als een voorbeeld der anderen voorstellen.

Dit scheefstaan kan of volkomen of onvolkomen zijn.

Volkomen, als de baarmodersmond meest, of voor een gedeelte, op den ingang van een bekkenbeen staat, alzoo dat men denzelven of half, of geheel niet kan bereiken — Onvolkomen is het scheefstaan, als de baarmodersmond wel niet in 't midden van het bekkenhol gevoeld wordt, maar zoo, dat men echter de geheele opening nog kan bereiken.

Meest staat de baarmoeder naar de zijde scheef: zeldzaamer is het scheefstaan der baarmoeder naar vooren of naar achteren: welke beide gevallen ook de moeilijksfen van allen zijn: wij zullen in deeze vier hoofdgevallen, wegens het scheefstaan, de baarmoeder op zig zelve beschouwen.

In het algemeen kent men dat scheefstaan, door de uitwendige gedaante van den buik, en door een inwendig onderzoek van den baarmodersmond.

Als de baarmoedersmond volstrekt tegen één der darmbeenderen, bij voorbeeld, tegen het rechte, scheef staat, zoo zijn de volgende kentekenen voorhanden:

1) De buik puilt niet meest uit in 't midden, maar op de linker zijde.

2) In den ingang van het bekken voelt men een ronden vleezigen bol, welke de, door het hoofd des kinds uitgezette, baarmoedershals is.

3) Den mond der baarmoeder vindt men, heel hoog, op den rechten darmbeensrand, half opgedrukt.

4) Het water groeit niet rond, maar smal, en langachtig aan.

5) De weeën zijn, door de ongelijke samentrekking der baarmoeder, heviger en meer snijdend, en daar zij noch het hoofd noch het water aanpersen, gelijken zij aan de valsche weeën.

6) Het water breekt vroegtijdig, en sluipt langzaam weg.

7) Meest heeft de vrouw aan het rechterbeen en den rechter voet alleen aderspatten, en staande de zwangersheid eene doove gevoeligheid; dikwijls ook eene zuchtige zwelling aan de gemelde voet.

Deezen zijn de tekens, dat de baarmoedersmond niet tegen het rechter darmbeen aanstaat; dezelfde tekens neemt men; op eene tegengestelde wijze, waar, als de baarmoedersmond tegen het linker darmbeen aanstaat.

De loop der geboorte van een scheefgeplaatste baarmoeder, wanneer er geene hulp bijkomt, is verschillende, naar maate de gezegde plaatsing geheel of alleenlijk gedeeltelijk is.

Als de baarmoeder slechts gedeeltelijk scheef staat, zoo veranderen de valsche weeën langzaam in waare weeën, en persen het hoofd voor en naa, naar beneden.

De gewoone zwelling des hoofds bevindt zig bij het geboren kind niet op den kruin, maar op een der wandbeenderen, om dat het hoofd scheef door het bekken heen geperst wordt.

De toedragt der geboorte van eene volkomen scheeve plaatsing der baarmoeder is nadeeliger: somtijds wordt het hoofd door de hevige en langduurende weeën op zulk eene wijze naar beneden geperst, dat dezelve, bijna, met het oor voor de geboorte komt.

De mond en hals der baarmoeder worden soms verscheurd, en het kind wordt zwak of dood ter wereld gebragt: soms, als het scheef staan al te sterk is, wordt het hoofd boven den ingang des bekkens, met den hals en mond, derhalven tegen één der darmbeenderen gedreven, zoo dat er eene ontsteeking op volgt, welke tot versterfing kan overgaan; en eer dat de geboorte voorgaat, sterft moeder en kind.

Men moet dus de geboorte bij eene scheefstaande baarmoeder nooit alleen aan de Natuur overlaten, maar haar, als zij onvolkomen is, door eene andere plaatsing, of, als zij volkomen is, door de keering te hulp komen.

Als dus de baarmodersmond alleenlijk onvolkomen scheef naar den rand van het rechter darmbeen toe staat, zoo moet de lijderes zig in het bed, geheel op dezelfde zijde leggen, naar welke de baarmodersmond heen staat, en een helper moet, ten gelijken tijde, met zijne twee handen, den buik der baarende vrouwe omhoog, en in 't midden zoeken te brengen.

Dusdanig valt de geheele zwaarte en massa des baarmodersbodems meer naar deeze zijde; de scheefstaande mond der baarmoeder geeft zig meer in de as van het bekken; de weeën openen dezelveu ligter en wijder, en het hoofd des kinds treedt meer in eene rechte lijn in: in deeze zijdelijke ligging moet de baarende vrouw de weeën zoo lang verarbeiden, tot het hoofd in het hol van 't bekken staat, en zig dan weêr, naar gewoonte, op den rug leggen.

Maar als, door den hoogen graad van scheefheid, het hoofd ook op de voorgestelde wijs niet ingericht kan worden, moet men, zonder tijdverzuim, de geheele keering des kinds doen, en hetzelfde bij de voeten haalen.

Alles wat nu tot hiertoe gezegd is van het scheefstaan

der baarmoeder, naar het rechter darmbeen, is ook zoo te verstaan, als de baarmoeder in eene scheeve richting, naar het linker darmbeen toestaat: in dit geval moet men alles in het tegengestelde der zijde beschouwen:

De derde soort eener scheefstaande baarmoeder is die, daar de mond der baarmoeder op den voorberg des heiligbeens, maar de bodem naar vooren over de schaambeenderen staat.

Deeze soort heeft de volgende kenmerken:

1) Het onderlijf hangt over de schaambeenderen zoodanig af, dat de zwangere dikwijls, als zij zit, eene onaangenaame zwaarte in de deiën gevoelt — Bij deezen voorhangenden buik is:

2) De omtrek der ribben minder gespannen en opgevuld, dan bij eene natuurlijk liggende baarmoeder.

3) In de midden des ingangs van het bekkenhol, voelt men een glad, bolrond ligchaam, 't welk de, door het achterhoofd des kinds, uitgezette hals der baarmoeder is:

4) De mond der baarmoeder wordt heel zwaar, en in den volkomen scheeven stand, doch niet eerder, dan tot dat men de geheele hand in de schede brengt, op den voorberg des heiligenbeens gevonden.

5) De pis wordt door het gestadig drukken tegen den bodem der blaas geduurig uitgeperst.

6) De kwaade gedaante van het water, en de hevige, vruchtloos verarbeide weeën, zijn aan de twee zijdelijke scheef staanden gelijk.

Deeze soort van scheeve standen is bezwaarlijker te herstellen, dan de twee eersten: echter moet men zulks op de volgende wijze beproeven.

Is het hoofd en de baarmoedersmond dusdanig ingericht, zoo moet, gestadig, door twee helpers, door middel van de platte hand, den buik opwaards gehouden worden, anders gaan het hoofd en de baarmoedersmond ligt in hnnne oude ligging terug: kan men het hoofd niet terugbrengen, of in die gestelde richting niet houden, zoo vormt zig, voor en naa, eene zwaare achterhoofd;

geboorte, waarvan wij ter behoorelijke plaatse zullen spreken.

Maar gebeurt dit niet, zoo moet men ten eersten zig bevljtigen om het kind te keeren; deeze keering is van alle anderen de moeilijkste, zoo als in deeze afdeeling reeds getoond is.

De vierde soort eener scheefstaande baarmoeder is, wanneer de baarmoedersmond op den bovensten rand der schaambeenderen, en de bodem tegen de lendenenwervelen aanstaat.

Dit is de zeldzaamste van allen, om dat zij alleen bij die vrouwen plaats heeft, wier lendenenwervelen achteruit gebogen zijn: men kent haar voor 't overige aan de volgende tekens:

1) De buik is hoog opgezet maar plat, en puilt een weinig naar buiten.

2) Men vindt in 't midden van het bekken, in plaats van den baarmoedersmond, den hals der baarmoeder, als een vleezige bol uitpuilende.

3) De baarmoedersmond is, halvemaanswijze, boven het schaambeen geopend; men kan denzelven niet bereiken, in zoo verre men de vrouw niet ter zijde of van achteren voelt.

4) Boven de schaambeenderen voelt men den kruin van het kind.

5) Het water wordt slechts pijnlijk uitgezet; de weeën zijn hevig, en zetten mede weinig uit.

6) Door het samendrukken van den hals der blaas heeft meest altoos eene ophouding van de pis plaats.

7) Als de hevige weeën het hoofd door den scheeven baarmoedersmond heen persen, komt het aangezicht meestal voor.

Deeze soort van scheefstaan is op de volgende wijze te herstellen:

De vrouw moet zig met knieën en ellebogen dwars over het bed leggen: men voelt als dan, van achteren, met de hand tuschen den, over het schaambeen staanden baarmoedersmond, en den kruin des hoofds, dat

men met denzelven het hoofd in den as van het bekken kan drukken: slaagt men hierin, zoo laat men het overige gedeelte der geboorte aan de Natuur over: zoo niet, dan moet men ten eersten het kind keeren.

Voor het overige herhaal ik nog eens, dat bij iedere onvolkomen scheef staande baarmoeder de tegengestelde ligging, en eene gepaste houding van den buik, de geboorte verligten: maar bij eene volkomene moet het kind gekeerd worden.

Heeft een kind, met de scheefstaande baarmoeder, ook eene tegennatuurlijke ligging; zoo moet men het kind, zonder tijdverzuim, door het te keeren, verlossen, en niet op de terechtstelling denken.

De breuk der baarmoeder.

De liesch-en deie-breuken verliezen zig meestal in de zwangerheid, doordien de darmen, door de vergrooting der baarmoeder, naar boven gedrukt worden, als zij niet vast gegroeid zijn in den breukzak: maar navelbreuken worden dikwijls, door deeze oorzaak, naar buiten het buikhol gedreven: bijzonderlijk moet, onder de geboorte, dit uitpersen der darmen, door den navelring, merkwaardig worden; ja er kan eene darmbeklemming ontstaan, en wier gevolgen somtijds ontfteeking en versterving zijn: men moet dus in dit geval alle mogelijke terugbrenging en terughouding deezer deelen, door een goed verband, nog voor de geboorte, bewerkstelligen, en buiten dien, onder ieder wee, dit gezwel behoorelijk terug houden.

Doch een geheel andere en nog nadeeliger eigenschap hebben de breuken der baarmoeder, die veelal gelijk met eene volkomen scheefstaande baarmoeder, en echter van dezelve zeer onderscheiden zijn.

Als de baarmoeder in de eerste maanden der zwangerheid ook vóór de bevruchting, zig buiten den ring der buikspieren, uit welke oorzaak het ook weezen moge,

begeeft, en niet ten eersten terug gebragt wordt, zoo kan de bevruchte baarmoeder zig door de bevruchting in den breukzak vergrooten.

Dergelijke gevallen hebben SENNERT, en RUISCH opgetekend: een kuipers vrouw, die haaren man een hoepel wilde helpen krommen, werd, door het einde van den hoepel, op den linker liesch geslagen: eenigen tijd daarop toonde zig een breuk, die zodanig toenam, dat men het gezwel niet konde terug brengen: deeze vrouw was juist zwanger, en het gezwel werd van dag tot dag grooter: men zag en voelde de beweging des kinds in dit gezwel zeer merkwaardig: deeze uitzakking werd zoo groot, dat de vrouw genoodzaakt werd, dezelve in een verband te draagen, en dan eens op het eene, dan eens op het andere deiebeen te liggen.

Daar deeze toestand de ouders en den man veront- rustte, raadpleegden zij SENNERT daar over, die hun zeide, dat er geen de minste waarschijnlijkheid was, om dit gezwel naar binnen te kunnen brengen, ten einde de geboorte langs den Natuurlijken weg te doen; dat dit gezwel opengemaakt moest worden, om er het kind dan uitteneemen: op het einde der negende maand begon de vrouw te baaren: de weeën waren hevig, en duurden lang; men volgde den raad van SENNERT; de baarmoeder werd geopend, en men haalde er een levendig kind uit, tevens met den moederkoek: het was niet mogelijk de baarmoeder na de operatie binnen te brengen; de huid werd met eenige naalden aaneen gehecht; de baarmoeder trok zig allengskens samen, en de lijderes zoude zeker haare voorige gezondheid wedergekregen hebben, indien zij niet naderhand, in eene verzwakking gevallen ware, waarin zij stierf.

Men heeft door de opening van het lijk geen het minste licht gekregen van de oorzaken des doods: alle inwendige deelen waren in hunne natuurlijke orde.

Ik kan uit deeze waarneeming niet zeker bepaalen, dat zij voldoende is, om de keizerlijke snede, als noodzaaklijk, voorteltellen, bij breuken der baarmoeder. Men vindt bij RUISCH dat een vrouw, naa voorgaande ver-

Ettering, naabij de liesch eene breuk gekregen heeft, en dat deeze in de zwangerheid een gezwel vormde, hetwelk tot op de knie hing; maar ten tijde der geboorte bragt de Vroedvrouw dit gezwel naar binnen, met de vrucht, en verlost op de gewoone wijze, langs den natuurlijken weg.

De Vroedvrouw bij **SENNERT** hadde, even als die bij **RUISCH**, moeten verzoeken om het gezwel naar binnen te brengen: echter stem ik in, dat de breuk der baarmoeder, bij **SENNERT**, vastgegroeid met den breukzak, en het dus niet mogelijk was, om dezelve terug te persen: men had de hand in de baarmoeder kunnen brengen, en het kind door de keering verlossen; mischien hebben de Vroedvrouwen, in den tijd van **SENNERT**, nog weinig kunde gehad van de keering, dewijl dezelve ook in onze dagen bij de meeste Vroedvrouwen niet wel bekend is.

Men ziet dus uit deeze voorbeelden dat men zig in de eerste maanden, alle moeite moet geeven, om deeze breuken binnen te brengen, en, door een daartoe pasfend verband, binnen te houden.

De ontsteeking der baarmoeder.

Als de teeldeelen en de ploojen der schede sterk opzwellen en branden, en als op de koude en rilling eene koorts met eenen harden pols volgt, vergezeld van eene krachtloosheid, en dorst; wanneer de tong met eenen bruinen slijm bedekt is, en als de buik op het minste gevoel pijnlijk is, en er mislikheid volgt; als ieder vlaag korter en pijnlijker wordt, zijn dit tekens, dat er eene ontsteeking in de baarmoeder plaats heeft, en de geboorte kan niet door de Natuur alleen volbragt worden.

In dit geval moet men gebruik maaken van sterke adelaatungen, en van zoo wel in- als uit-wendige middelen, die tegen de ontsteekingen aanprezen zyn: om dat de weeën in den beginne door de te groote pijn niet ver-

arbeid kunnen worden, zoo als noodig is, en ook dat de waare weeën, bij toeneemende ontfleeking, op het laatst geheel wegblijven, zoo moet men ten eersten de lijderes door de hand, of door instrumenten verlossen, anders komt zij en haar kind, ongetwijfeld, om, aan de versterfing der baarmoeder.

De versterfing der baarmoeder.

Als er eene versterfing ontstaan is, door eene voortgaande ontfleeking, of door eene andere oorzaak, zoo is op éémaal alle arbeid, door het wegblijven der waare weeën, gedaan, en hierdoor wordt de geboorte voor de krachten der Natuur onmogelijk: men moet zig des met de tekens, welken de versterfing aantoonen, wel bekend maken.

De versterfing der baarmoeder kent men uit den doodschen reuk, welke uit de schede komt; uit het luchtgezwel der schede; uit de brandende pijn in de lendenen, en uit het verval van ziels- en lichaamskrachten, 't welk de baarende vrouw als dan ondergaat, vergezeld van een snellen pols: ook neemt men bij dezelve eene verwarring in het hoofd waar: op deeze gevaarlijke tekens volgt gemeenlijk de dood, welke aan dit treurig schouwspel een einde maakt.

Of er schoon weinig hoops tot herstel overbleve, was het echter afschuwelijk, zulke elendigen den gewisfen dood prijs te geeven: men moet des trachten het kind of door eene keering, of door behulp der tangen, buiten het ligchaam der moeder te brengen: men moet deeze de *campher* met den koorstbast laten gebruiken, en naa dat de verlossing, op zulk eene wijze, is daargesteld, spuit men door de schede in den baarmodersmond roode wijnmoer, met gekamferden brandewijn, en het afkooksel van den koorstbast.

De verlamming der baarmoeder.

Als de baarmoeder haare prikkelbaarheid en inkrimpend vermogen geheel, of voor een gedeelte verloren heeft, is haare samentrekkende kracht buitengewoon zwak of geheel verloren.

In dit geval beginnen de weeën, wel als anders, in de lendenen; maar echter zonder samentrekking der baarmoeder, en zoo men de vrouwen dwingt tot eenen vrijwilligen arbeid, blijkt het, dat het middenrif en de buikspieren, meerder dan de baarmoeder zelve, het kind naar buiten persen.

Somtijds sterven de baarende vrouwen zeer schielijk onder de verlossing: gemeenlijk gebeurt deeze schielijke dood, met of zonder bloedvloed, kort naa de geboorte: meestal ziet men dit ongeluk niet voor dat het te laat is, om het tegen te houden.

Ook de geoefendste Vroedmeester miskent dikwijls deeze gevaarlijke ziekte, en de Vroedvrouwen, welken geheel onbekwaam zijn, om deeze beschreienswaardige omstandigheden vooruit te zien, verwonderen zig, even als de omstanders, wanneer de vrouw, offchoon zij op 't aanzien eene goede en gelukkige geboorte te verwachten hadde, schielijk door den dood weggenomen wordt.

Dit verlammen der baarmoeder ontstaat voor het meeste gedeelte door haare alte groote uitzetting in de zwangerheid, veroorzaakt door te veelheid van het lamsvocht; door een verval der krachten van het geheele lichaam; door eene schielijke geboorte, en het spoedig volgen van den moederkoek; door veele voorgaande kraamingen, en andere oorzaken, die eene bijzondere zwakte in de baarmoeder kunnen te weeg brengen, waardoor de prikkelbaarheid en het inkrimpend vermogen verloren gaat.

Wanneer men nu bij eene baarende vrouw, eene alte groote verwijding, zwakke weeën en echter een snel voordgaande geboorte waarneemt, moet men alles verbieden, wat de geboorte zoude verhaasten; ten einde

haar langzaamier te maaken, en daardoor de baarmoeder tot de samentrekking tijd te geeven; de baarende vrouw moet in het bed blijven liggen, en niet opgericht worden; zij moet de weeën bijnaa geheel niet verarbeiden: men moet bijtijds de vliezen breeken, het hoofd des kinds eenigzins omhoog houden, een groot gedeelte van het lamsvocht laten weggaan, en de baarende vrouw moet gestadig gebruik maaken van zenuwsterkende middelen, waartoe ik bijzonder de *tinctura: cinamomi*, met *de china*, het afkookzel der *arnica* enz. zeer nuttig bevonden heb; den buik geduurig met de hand, of eenen wolle lap, te laten wrijven, en naderhand drukdoeken, in koud water nat gemaakt, daar over heen laten leggen.

Zo, door deeze geneesmiddelen, de lammigheid niet ophoudt, moet het kind door eene keering, of met de tang, zoo voorzichtig mogelijk, uitgehaald worden.

Wanneer nu hierop de geboorte gelukkiglijk voorgegaan is, zoo is echter de kraamvrouw niet buiten gevaar, wanneer de baarmoeder zig niet, ten eersten naa de verlossing, samentrekt: men moet derhalven niet ophouden, de voorgezegde middelen te gebruiken.

Behalven die geenen, welken aan eenen sterken en schielijken bloedvloed, door eene volkomene verlamming der baarmoeder veroorzaakt, onvoorziens sterven, sterft niet minder een groot getal ongelukkigen aan eene langzaame bloeding, om dat bij deezen, de verlamming der baarmoeder niet volkomen is: hier is de samentrekkende kracht van dit deel zoo zwak, dat dergelijke vrouwen voor en naa, als een kaars, (gelijk men zegt,) uitgaan, zoo men dit kwaad niet bijtijds met zenuwsterkende middelen, en door inspuiting met azijn, in de baarmoeder, naa de geboorte, voorkomt.

Het scheuren der baarmoeder.

Als de baarmoeder gescheurd wordt, of van zelve barst, zoo kan het geheele kind, of ook slechts een gedeelte van het zelve, in de buiksholte geperst worden.

De oorzaaken waardoor dit ten wege gebragt wordt, zijn de volgende:

1) Hevige uitpersfende weeën; waarbij het kind een onoverwinnelijke hinder in het bekken ontmoet, of zelf veroorzaakt: hiertoe behoort een alte naauw, als ook een gebreklijk bekken; een volkomen gezwel, of eene samengroeiing van den baarmodersmond, of der schede; eene tegennatuurlijke ligging des kinds, bijzonderlijk eene dwarse; een alte groot hoofd, enz.; bij alle deeze gevallen kan de baarmoeder barsten, als de weeën te sterk zijn.

2) Dit zelfde kan gebeuren als het kind dwars in de baarmoeder ligt, en dan stuipen of dergelijken heeft, daar het dan door het uitstrekken en trappen van beenen en voeten de baarmoeder doorstoot.

3) Soms is de zelfstandigheid der baarmoeder te dun, en alsdan kan eene middenmaatige vlaag dezelve doen scheuren; vooral als de koek op de zijde geplaatst is, of als eene verharding op eene plaats in de baarmoeder, of eene zweer gelegenheid geeft, tot eene ongelijke samentrekking derzelve.

4) Door een van buiten op den buik aangedaan geweld, als door eenen val, stoot, slag, of door eene wonde.

5) Door een van binnen in de baarmoeder aangebragt geweld, van eene onkundige hand des helpers, of door een instrument, of door een blootliggend been van het kind.

Men heeft aan den geheelen omtrek der baarmoeder scheuringen waargenomen; echter scheurt dezelve meestal aan het onderste gedeelte, om dat de zwangere baarmoeder aldaar het dunste is: men heeft gevonden dat de schede gescheurd is, dat de mond der baarmoeder van de schede is afgerukt, hetwelk door eene alte sterk terugschuiven, van een tegennatuurlijk voorkomend hoofd, is veroorzaakt.

Dat eene scheuring van de baarmoeder aanstaande is, kent men uit een op eene plaats vastzittende, brandende hitte in de baarmoeder; maar de volgende verschijnsels geeven te kennen dat de baarmoeder reeds gescheurd is.

1) Als de voorgaande groote, sterk persende weeën, niet afluaten, en echter het kind niet bevorderlijk zijn in de geboorte, maar eene vastzittende, bijzondere pijn op eene zekere plaats der baarmoeder veroorzaken.

2) Als er, onverwachts, door de baarende vrouw, of door de omstanders een zeker kraaken gehoord wordt.

3) Als de weeën onverwachts ophouden.

4) Als men bij de zwakke vrouwen een kleen schielijken pols, bleekheid van het aangezicht, koude der ledemaaten, of afwisselende stuipen waarneemt.

5) Als het voorkomende gedeelte van het kind geheel weder terugwijkt, of voor het minst op eenen zekeren afstand van den baarmodersmond terug geweken is.

6) Als het bloed uit de baarmoeder vloeit.

7) Als de dikte of de uitpuiling van plaats verandert; en op eene andere plaats, alwaar men de deelen van het kind gemeenlijk duidelijker en gemaklijker kan vatten, grooter gezien wordt.

8) Als de onderzoekende hand door den mond der baarmoeder heel in het hol van den buik en de darmen voelt.

9) Als men gewaar wordt, dat of het kind voor de helft in de wonde zit, of dat hetzelfde geheel en al in den buik ingegaan is.

De gevolgen van dit ongelukkig scheuren der baarmoeder zyn verschillend; meestal sterft de vrouw vroeger of laater, naa dat dit kwaad, door den bloedvloed, of door het versterven, de baarmoeder, en de andere deelen doodt: nu valt de ongelukkige moeder in eene groote krachtloosheid, heeft stuipen, en veele andere toevallen, welken haar einde aankondigen.

Zelden blijft de vrouw in het leven; gebeurt dit echter, zoo is 't zeker, dat het kind nog voor de helft

in de baarmoeder was, en dan vroegtijdig genoeg daar werd uitgehaald; of als het reeds geheel in den buik ingegaane kind, door middel van de buiksnede, ter wereld gebragt werdt.

In dit geval kan zig ook eene wonde van veele duimen lang, geheel verkleenen, den bloedvloed bedaaren, en geneezen.

Is nu derhalven de baarmoeder gescheurd, zoo moet men de lijderes niet hooploos laten liggen, om dat er voorbeelden zijn van geneezing eener gescheurde baarmoeder.

Wanneer daarom, de in de baarmoeder gebragte hand voelt, dat alleenlijk een der uitwendige ledemaaten, of het hoofd alleen, door de scheur der baarmoeder in den buik ingegaan is, en het overige gedeelte nog in de baarmoeder gebleven is, zoo moet men het kind in het hol der baarmoeder trachten terug te brengen, het dan bij de voeten vatten, en door den natuurlijken weg, als het mogelijk is, uit de baarmoeder trekken.

De darm of het net, door de scheur der baarmoeder heen gezakt, moet terug gebragt worden, en men moet de hand daar zoo lang inlaaten, tot de baarmoeder zig geheel heeft samengetrokken.

Is daarentegen het geheele kind, of voor liet minst het geheele lijf met het hoofd, (gelijk veelal het geval is,) uit de baarmoeder geperst geworden, zoo dat men hetzelfde niet meer terug kan haalen, dan kan mischien eene tijdig gemaakte insnijding van den buik, de moeder en het kind in 't leven behouden.

En daar het hier alleenlijk noodig is, de bekleedsels van den buik intesnijden, zoo zou deeze operatie op zig zelve mischien niet gevaarlijk zijn; maar de kwaade gevolgen van de scheuring der baarmoeder zelve, kunnen ieder Vroedmeester in verlegenheid brengen.

*De van de schede afgescheurde mond der
baarmoeder.*

Als het voorkomende hoofd des kinds, of een ander gedeelte deszelven, met de hand te sterk tegen den bodem der baarmoeder wordt opgeduwd, om denzelven, ware het mogelijk, van den mond der baarmoeder wegteschuiven, ten einde het kind te willen keeren, zoo gebeurt het dikwijls, dat het onderste gedeelte der baarmoeder, of voor een gedeelte, of geheel van de schede wordt afgescheurd: in dit ongelukkig toeval wordt men bij het onderzoeken met de hand gewaar, dat men tusschen de baarmoeder en de schede komt, en de darmen kan voelen: hier moet men ten eersten het kind keeren en trachten naar buiten te brengen; maar dat keeren gaat zoo gemakkelijk niet, als men zig wel zoude verbeelden, om dat de baarmoeder zig altoos om hoog tegen het middenrif trekt, wanneer men de hand, om deeze keering te doen, in de schede brengt: men moet dus de baarende vrouw eene daartoe dienende ligging geeven, waardoor dit noodige keeren kan gedaan worden, en wel als volgt:

1) De baarende vrouw moet zig op den rug leggen, en zoo veel zij kan, de knieën tegen de borst brengen.

2) De helper moet met de vlakke hand den buik zoodanig ondersteunen, dat de baarmoeder tegen de opening der schede wordt gedrukt, en gedrukt moet blijven, om niet dan, als de hand om het kind wordt heen gebragt, te kunnen afwijken.

3) De Vroedmeester moet nu in zulk eene ligging der vrouwe, zijne hand van de achterzijde der schamelheid tegen die zijde der baarmoeder heen brengen, waar de mond der baarmoeder met de schede nog eenigzins vast zit, en alzoo het kind keeren.

De bloedvliet der baarmoeder.

Het gevaarlijkste toeval in, vóór en naa de geboorte; is de bloedvliet der baarmoeder: om het verschil van deezen gevaarlijken toestand des te naauwkeuriger te beschouwen, zullen wij den bloedvliet in de zwangerheid, in de geboorte, en voords dien, welke somtijds naa de geboorte ontstaat, beschouwen.

Bij den bloedvliet in de zwangerheid moet men onderzoeken: 1) of het bloed alleenlijk uit de schede, of ook uit de baarmoeder vloeit: 2) of er waare weeën tegenwoordig zijn dan niet: 3) of de vrouw nog volbloedig is, dan of zij reeds uitgeput is: 4) als de mond der baarmoeder geopend is, zoo moet men trachten te onderscheiden; of de moederkoek zig op den bodem der baarmoeder, of in derzelver holte bevindt.

Meestal blijven de maandstonden reeds in de eerste maanden der zwangerheid weg, echter zijn er eenige vrouwen, bij welken dezelve eerst in de tweede of derde maand wegblijven; bij enkelen blijven zij eenige maanden weg, en laten zig dan weder zien; dit veroorzaakt somtijds eenen grooten schrik, om dat de vrouwen dan vreezen voor het verlies haarer vrucht: men moet alzoo wél trachten te onderscheiden, of eene zwangere vrouw alleenlijk haare maandstonden, dan wel eenen waaren bloedvliet der baarmoeder heeft.

Als vóór den bloedvliet geene rilling, buikpijn, of eenig ander toeval vooraf is gegaan; als dezelve niet vergezeld is van waare weeën; als de bloedvliet weinig is, en op den tijd der maandstonden voorvalt; of zoo de zwangere zig anders daarbij wél bevindt; zoo kan men vermoeden, dat het bloed alleenlijk, door volbloedigheid, uit de vaten der schede, of uit de buitenste vlakte van den moedermond ontstaat: het zekerste teken, dat het bloed niet uit het hol der baarmoeder komt, is het gevoel van eenen gesloten mond der baarmoeder, of van dezelve hals: voelt men, in het

tegendeel, dat de mond en hals der baarmoeder open is, waare weeen tegenwoordig zijn, en heeft de zwangere eenige misliikheid, zoo ontstaat het bloeden uit het hol der baarmoeder zelve.

De naaste oorzaak der bloedinge in de zwangerheid, is eene geheele, of gedeeltelijke loslating van den moederkoek: dit loslaaten kan uit oneindig veele oorzaaken ontstaan.

Tot de uitwendige oorzaaken moet gerekend worden, alle van buiten aangebragt geweld, en schudding der baarmoeder.

Tot de inwendige oorzaaken behoort:

De zwakke samenhang van den moederkoek met de baarmoeder; het trekken daaraan als het kind gestrengeld is, of wegens eene te kortheid van den navelstreng; de krampachtige samentrekking der baarmoeder, de vermeerderde beweeging, en menigte des bloeds in den moederkoek, de alte dikwijls herhaalde bijslaap, het misbruik van specerijen in de spijsen, onaangename ontmoetingen, enz.

Alle deeze oorzaaken verwekken echter den bloedvliet niet in hetzelfde oogenblik waarin zij voorvallen; maar men bespeurt dezelve eerst negen, tien en dikwijls meer dagen daarna: in dit geval blijkt het wel dat de moederkoek zig van de baarmoeder eenigzins afscheidt; maar het uitgevoerde bloed wordt in het celwijsweeffel, 't welk het vaatvlies aan de baarmoeder hecht, opgehouden; door zijne eigene zwaarte gaat het uit de eene celle deezer zelfstandigheid in de andere, tot het aan den gefloten mond der baarmoeder komt, denzelven week maakt, prikkelt, en verwijdt, wanneer het bij stukken en brokken afloopt: is er geene groote menigte bloeds voor de hand zoo bedaat de bloeding, en de zwangerheid houdt gelukkiglijk haare tijd uit: maar gevaarlijker is de bloedvliet in het andere geval, wanneer dezelve naamlijk, aanstonds naa de aangebragte oorzaak, ten voorschijn komt (*): voor het overige noemt men dit

(*) Eene vrouw, welke in de zevende maand haarer zwangerheid op den buik viel; onthette, in den beginne, gesteld, en daarna dun, vloeibaar bloed uit de baar-

alleenlijk een bloedvliet; als er een helder rood en niet gestold bloed in menigte uit de baarmoeder vloeit — Dit bloed wordt door sommigen het hartebloed genoemd, en, met het grootste recht, gevreesd; om dat in dit geval een groot gedeelte des moederkoeks van de baarmoeder losgegaan is.

Hier is het waar de vrouwen aldra haare pols en krachten verliezen, van haar zelve vallen, en stuipen krijgen; in welken zij dikwijls schielijk sterven: de bloedvliet mag ontstaan uit welke oorzaak het ook moge wezen, aanstonds moet men onderzoeken, of de losgelatene moederkoek zig op den mond der baarmoeder bevindt, dan of dezelve nog op den bodem der baarmoeder ligt.

De bijzondere soort van bloeding, door den voorkomenden en boven den baarmoedersmond aangegroeiden moederkoek; zullen wij in eene afzonderlijke afdeeling beschouwen, en hier alleenlijk van de algemeene bloeding spreken, welke of door een gedeeltelijke, of door eene geheele loslating van den moederkoek van den bodem der baarmoeder ontstaat.

Als dus, in de baarmoeder van eene zwangere vrouw, de moederkoek zig grootendeels of geheel afscheidt, zoo ontstaat altoos, in eenen meer of minderen graad, eene gevaarlijke bloeding uit de baarmoeder.

Zijn er bij den bloedvliet ware weeën aanwezig, zoo kan men de geboorte niet meer tegenhouden; maar is de bloedvliet zonder weeën; zoo kan de vroegtijdige, of ontijdige geboorte nog tegengehouden worden, gelijk wij in de afdeeling over het miskraamen gezien hebben: echter kan men voor eenen algemeenen regel aannee-

moeder: deeze bloedvliet bedaarde gelukkiglijk — eene andere vrouw die, zwanger zijnde, zeer bedroefd was over het afsterven van een haare kinderen, werd op den zevenden dag, naa dat afsterven, van eene bloeding overvallen, die nu reeds twaalf uren geduurd had, en in de agtte maand der zwangereheid voorviel, echter werd dezelve nog gelukkiglijk tot bedaren gebragt, door het gebruik van *rinet. cinamon*: de zwangere werd zoo wel, dat zij uitgaan kon, en haare huislijke bezigheden verrichten; maar toen zij, veertien dagen naa den eersten bloedvliet, zeer vergramd op haare dienstboden werd, keerde de bloeding terstond wederom, en werd in weinige uren zoo hevig, dat de lijderes, eer iemand bij haar konde komen, (dewijl zij op het land woonde) aan het toeval moest sterven: hier ziet men dat eene terstond op haare oorzaak volgende bloeding doodlijk was.

men, dat eene bloeding zonder weeën, over 't algemeen, gevaarlijker is, dan die, waarbij waare geboorteweeën tegenwoordig zijn; om dat deeze bevordering der geboorte, meestal, een haastig einde aan de bloeding maakt.

Hoe laater in de zwangerheid een bloedvliet ontstaat, hoe gevaarlijker hij is, om dat de bloedvaten in de zwangere baarmoeder geduurig grooter worden.

De eerste pooging bij deezen bloedvliet, in welke maand het moge weezen, en er moge weeën tegenwoordig zijn al of niet, moet het stillen van dezelve zijn.

Dit oogmerk kan in den beginne door in- en uitwendige geneesmiddelen bereikt worden, en als deezen zonder werking zijn, en de bloedvliet het leven der zwangere in gevaar stelt, zoo moet de hand des Vroedmeesters, met het keeren, te hulp komen.

Men kan, in den beginne aan den omtrek der schamelheid en deïën, doeken met koud water en azijn leggen, en inspuitingen van hetzelfde in de schede doen: bloedrijken kan men aderlaaten: (voeg hier bij het geen de Heer VAN BAVEGEN voorstelt, in de verhandelingen van het genootschap ter bevordering der Heelkunde, enz., IIde Deel, Bladz. 72. naamlijk, het gebruik maaken van strooken linnen, natgemaakt in azijn, en die met eene stoute hand tegen, of als de nood het vereischt, in den baarmoedersmond brengen; vervolgens de schede opvullen, of met plukfel of met vlas, bevochtigd met het voorgaande vocht, en dit alles dan met een goed verband ondersteunen,) en naar dat de omstandigheden van het ligchaam zijn, moet men, het zij verkoelende of versterkende geneesmiddelen geven.

Is naamlijk de zwangere bloedrijk, rood in het aangezicht, gevoelt zij hitte, benaauwdheid, en is de pols vol of hard, zoo moet zij ten eersten adergelaten worden, en gebruik maaken van limonade, enz.

Maar is zij niet bloedrijk, bleek in het aangezicht; heeft zij rilling in den buik, en koude ledemaaten; is de pols zwak en klein, zoo zijn de aderlatingen en verkoelende middelen nadeelig: hier moeten aan-

houdend zenuwsterkende middelen gegeven worden: bij het mengfel uit *aq: melif: ʒvi; tinct: cinam ʒβ*, waarvan men alle quartieren twee lepels vol ingeeft, heb ik mij verſcheidene keeren, bij vreeslijke bloedingen in de zwangerheid, zeer goed bevonden (*): ſomtijds kan men hier nog bij doen *ſpirit: vitriol: ʒβ*; ſomtijds ook zoo veel *alum crud:*: vooral moet de vrouw in het bed de grootſte ruſt van ziels- en ligchaams- vermogens hebben.

Het *opium* en de ſamentrekkende middelen, welken geene zenuwsterkende middelen waren, heb ik altoos niet alleenlijk onnut, maar ſchadelijk bevonden.

2) De bloedvliet in de geboorte heeft inſgelijk a) eene te vroegtijdige loslaating van den moederkoek, b) zeer zelden een ſcheuring eener grooter ſlagader aan den mond der baarmoeder, of aan den uitgang der ſchede, en c) het voorkomen van den moederkoek, tot een' grondſlag.

De bloeding in de geboorte, door de ſcheuring van den baarmoedersmond, of de kleine lippen veroorzaakt, ſtelt zig van zelve: de bloedvliet door de ſcheuring der baarmoeder is reeds onder zijne afdeeling verhandeld; zoo zullen wij ook de bloeding in de zwangerheid en in de geboorte, welke door het voorkomen des moederkoeks ontſtaat, op zijne behoorelijke plaats beſchouwen: hiertoe

(*) De *tinct: cinamom*, wordt door den Heer VAN ZWIETEN, in het vierde Deel zijner voortreffelijke Commentariën aangeprezen; maar ik heb voor eenige jaaren zelf het geluk gehad, met deezen grooten man bij eene vroegtijdige geboorte vergezeld, van eene ſterken bloedvliet, tegenwoordig te zijn: VAN ZWIETEN ſchreef de gezegde *mixtur* voor, met zulk een goed gevolg, dat de bloeding in een half uur, terwijl naauwliks zes lepels gebruikt waren, bedaarde, en in een uur geheel ophield; terwijl tog de geboorte zelve eerst naar verloop van nagen. uren volgede: van deeze tijd af heb ik dit middel bij zeven verlosſingen, met hetzelfde gelukkige gevolg, aangewend: ik ſluit die bloeding uit, welke vóór de geboorte, door den op den baarmoedersmond voorkomenden moederkoek, ontſtaat; doch deeze bedaar niet, dan alleenlijk door de verlosſing of door den dood: echter geef ik in dit geval de voorbeſchrevene *mixtur*, om de miſlikheid, braakingen, en zwakte voortekomen: dit middel verwekt meestal de waare weeën, die den baarmoedersmond ſchielijker verwijderen: ook kan men vroeger de vrucht wegneemen: men behoeft niet te vreezen dat de *tinct: cinamom* de bloeding zal vermeederen: de beſchouwing moge met de ondervinding overëen komen al of niet, dit is zeker, dat ik bewaand heb gezien, dat de bloedvliet door het gebruik van dit middel bij bleeke en zwakke vrouwen, zoo wel vóór, als in, en naa de geboorte, heeft opgehouden, daar anderen *alumen: ſana: dracon:* en *opium* vergeeſch hebben laaten gebruiken.

behoort dus alleenlijk de bloeding door eene alte vroege loslating van den moederkoek.

Naar dat de moederkoek weinig, veel, of geheel is losgegaan, moet de bloeding in de geboorte, als ook in de zwangerheid, meerder of minder zijn: in den beginne deezer bloeding moet men alle die middelen beproeven, welken bij den bloedvliet in de zwangerheid aangeprezen zijn: men kan hier het breeken der vliezen nog bijvoegen: om dat door het ontlasten van het lamsvocht uit het hol der baarmoeder, dezelve zig kan samentrekken: door dat samentrekken worden de openingen der vaten eenigzins vernauwd; hierdoor vermindert de bloeding, en bedaart somtijds geheel; de geboorte wordt dus zonder gevaar aan de Natuur alleen overgelaten, 't welk ik dikwijls waargenomen heb.

Maar zo, in spijt van alle aangewenden middelen, ook naa het breeken der vliezen, de bloeding niet bedaart, en voor moeder en kind doodlyk wordt, zoo moet, zonder verzuim, de vrucht door de hand des Vroedmeesters uit de baarmoeder gebragt worden.

3) De bloedvloed naa de geboorte, heeft de volgende oorzaaken tot grondslagen:

a) Eenen teruggelaten, en half van de baarmoeder losfen moederkoek; *b)* eene geweldige losrekking en uithaaling van den moederkoek uit de baarmoeder; *c)* een nog in de baarmoeder zig bevindend vreemd ligchaam; *d)* eene scheuring der baarmoeder, en, *e)* voor het meerderdeel uit eene verlamming der zig niet samentrekkende baarmoeder.

Behalven de algemeene geneeswijz vordert deeze bloedvloeijing de wegneeming der oorzaaken, die de vloeijing onderhoudt: wij zullen hiervan op zijne behoorelijke plaats spreken: hier zullen wij alleenlijk beschouwen de gewoonlijke bloeding, welke, behalven de scheuring der baarmoeder, meest gevaarlijk is, van alle bloedingen welken naa de geboorte door de verlamde, en zig niet samentrekkende baarmoeder, ontstaat.

Niet zelden gebeurt het, dat eene schielijke en on-

verwachte dood eene geheel gelukkiglijk verlostte vrouw onmiddelijk, of korten tijd naa de verlosfing, wegsleept.

Dergelijke fchielijke doodlijke toevallen, offchoon wel eens uit andere oorzaaken ontftaande, worden echter zeer dikwijls uit eenen bloedvliet geboren, die door eene volkomene traagheid der baarmoeder ontftaat.

Men kent deeze traagheid der baarmoeder, door dat dezelve zig naa de verlosfing, niet famentrekt; als de buik groot en zacht blijft, en er zig geen bolrond ligchaam boven den fchaambeensboog laat voelen; als er geene naaweeën tegenwoordig zijn; als de verlostte vrouw over geene pijn in het lijf klaagt; als de bloedvloeijing fterk is, zonder dat de lijderes er iet van gevoelt, hier moet men, ten eerften, den buik met warme doeken wrijven, en koud water met azijn over den buik leggen; deeze door een fluitlaken omkleeden, en op den omtrek der baarmoeder drukdoeken leggen, met het gezegde vocht nat gemaakt; den mond en de baarmoeder prikkelen, het zij door infpuitingen van azijn, of door een fmalle ftrook linnen, natgemaakt in azijn, en welke ftrook men tegen den mond, of als het nodig is, in het hol der baarmoeder moet brengen; de fchede vervolgens opvullen met plukfel of vlas, en dit voords tegenhouden door een daartoe dienend verband; inwendig moet men het te vooren befchreven zenuw-mixtur laten gebruiken: anderen hebben de vrouwen in een koud bad laten zitten: HYPOCRATES raadt infpuitingen met koud water in de baarmoeder aan: ik zelf, heb een half doode kraamvrouw, door den geest van hartshoorn, in den mond en neus gegoten, aan het gevaar onttrokken.

Wanneer nu, bij deeze werkzaamheden, de kraamvrouw pijn en knijpingen in den buik gevoelt, zoo is dit een zeker teken dat de baarmoeder zig famentrekt; en zulke lijderessen worden zekerlijk weder herfteld; maar zoo zij zonder naaweeën, zonder pijn, zonder gevoel daar heen liggen, zijn zij den dood zeer nabij.

Gebreken aan de weeën.

Die eene vrouw heeft zien baaren, zal zekerlijk duidelijke waargenomen hebben, dat bij het verarbeiden der weeën, niet alleenlijk de baarmoeder, het middenrif en de buikspieren, maar ook dat alle spieren, aan alle deelen des ligchaams in werking zijn, om de geboorte te bevorderen: dit werkvermogen, dat de weeën veroorzaakt, kan onvolkomen, of ook valsch zijn; hier door onstaat,

1) Het afgaan der waare weeën.

2) De valsche weeën.

Het afgaan der waare weeën.

Als in eene Natuurlijke geboorte daar de ligging des kinds goed, en anders geen gebrek aan de moeder is, de waare weeën weinig zijn, zwak worden, of geheel weg blijven, is het zeker, dat het zenuwvermogen der baarmoeder te slap is; men moet dus geduld hebben, dewijl hier zig niets laat dwingen: staat het kind nog in den ingang van het bekken, zoo behoeft men zig bij de geboorte niet te verhaasten: is de vrouw volbloedig, zoo moet men haar aderlaaten, een klyfsteer zetten, en andere onschuldige middelen voorschrijven, wanneer de tijd de baarende vrouw te lang valt, en volstrekt geneesmiddelen begeert.

Ook moet men zig altoos onthouden van heete, sterke en scherpdrijvende middelen, om dat men door dezelve eene bloeding of onsteeking der baarmoeder kan veroorzaaken: doch als het hoofd van 't kind reeds in het bekken, of wel zig in den uitgang bevindt, moet men het kind niet lang daarin laten zitten, uit vrees, dat hetzelfde door 't lang aanhoudend drukken des hoofds en der hersenen, zal sterven — Hier is de aderlaating volstrekt noodig, als de vrouw niet buiten dien uitgeput is, en dan kan men door de *tinct: cinamom:*

en andere eenigzins prikkelende middelen, bij voorbeeld, wijn, weernat, safraan enz. de weeën opwakkeren — De prikkeling van den baarmoedersmond, indien men denzelven met de vingers een weinig verwijdt; het wrijven des buiks en der borsten; het terugdrukken van het staartbeen, verwekt zekerlijk de waare weeën — Hier is eigenlijk het geval, waarin men met den *Rheonhuifiaanschen hefboom*, om zoo te spreken, wonderen kan doen; het bijzonderste van dit werktuig is, dat hetzelfde bij iedere drukking op het hoofd, eene sterke en goede vlaag veroorzaakt, en als het hoofd niet te groot was, heb ik in eenige minuten vrouwen verlost, die veele uren lang geene weeën gehad hadden, daar het hoofd omtrent in den uitgang des bekken, door het afneemen der weeën, zitten bleef: doch, als de baarmoedersmond door een alte groot hoofd te veel uitgezet wordt, moet dezelve lam en ongevoelig worden; in dit geval moest ik mij altoos van de tang bedienen, om, dat het niet mogelijk was, de weeën door den hefboom optewekken.

De valsche weeën.

Als eene baarende vrouw sterke of ook zachtere weeën gevoelt, welken de baarmoedersmond niet verwijderen, maar denzelven meer samentrekken, en hard maaken, worden dit valsche weeën genoemd: deeze vertraagen dikwijls de geboorte, om dat zij de waare weeën onderdrukken; ook kunnen zij het hoofd des kinds in eene kwaade ligging brengen, om dat hetzelfde door haar, van den mond der baarmoeder naar boven geperst wordt; welke beweging eene tegengestelde werking is der waare weeën, die altoos den bodem der baarmoeder, en alles wat daarin is, van boven naar beneden persen: deeze weeën ontstaan door eene scheeve ligging der baarmoeder, door volbloedigheid, door koude, door kramp, of andere pijnen in den onderbuik.

Naar het verschil der oorzaaken moet men ook deeze weeën, door eene tegengestelde ligging, door aderlaatingen, door weekmaakende klyfsteeren, uit kamilsbloemen met lijnzaad, melk, en olie, door warme doeken, door krampstillende middelen, bijzonderlijk *opium*, trachten te verdrijven; en dan zullen misfchien de waare weeën beginnen als het tijdstip der geboorte daar is: bij de vermengde weeën houden dikwijls de waare weeën ook op, als men de valsche niet tracht te stuiten: bij deeze wilde weeën moet de baarende vrouw niet persfen; want zulks helpt niets, en zij verspilt te vergeefs haar krachten welken zij tot de waare weeën noodig heelt — Gemengde weeën zijn die, waarbij men gevoelt, dat eenige weeën den mond der baarmoeder verwijden, en de daarop volgende denzelven weêr samentrekken: in dit geval moet men de volbloedige vrouwen aderlaaten; anderen *opium* en thee van kamilsbloemen laten drinken, waarvan ik de wenschelijkste werking heb ondervonden; de wilde weeën hielden op, alles werd slapper, en de waare weeën werden versterkt.

Gebreken aan krachten.

Men heeft waargenomen, dat de kwaade gesteldheden van verafgelegene deelen dikwijls op de verlossing invloed hebben; doch de meesten deezer gebreken zijn in de vermindering der krachten, of in de ligchaamsgestelheid eener baarende vrouwe gelegen: wij zullen nu alleenlijk de algemeenen beschouwen.

1) Het verminderen der krachten bij het verarbeiden der weeën.

2) De ongeschiktheid der baarenden tot het verarbeiden der weeën.

3) Het alte vroeg verarbeiden van dezelve.

*Het verminderen der krachten bij het verarbeiden
der weeën.*

Als de baarende vrouw, door eene voorgaande, of ook tegenwoordige ziekelijke gesteldheid des geheelen ligchaams, zoo zwak is, dat zij de waare weeën met het daartoe noodig zijnde persfen niet kan verarbeiden, zoo volgt gemeenlijk eene langzaame, bezwaarelijke, en somtijds eene onmogelijke geboorte: neemt men waar dat de natuurkrachten dusdanig de geboorte op geenerlei wijze ten einde kunnen brengen, zoo moet dezelve door de hand des Vroedmeesters geholpen en volbragt worden.

*De ongeschiktheid der baarende vrouwe tot het
verarbeiden der weeën.*

De ongeschiktheid om de weeën te verarbeiden, kan bij die voor de eerstemaal kraamen, eene vertraaging der verlosting veroorzaaken: door het schreeuwen, en door de gestadige verandering van plaatsing tot de geboorte, worden de weeën onderdrukt, zonder dat zij recht verarbeid worden; of zij trachten dezelve, uit vrees voor de pijn, te verminderen, en verlangen daardoor dikwijls de geboorte. In het vrije geboortehuis, bij *Sant Marx*, te *Weenen*, heb ik, bij domme boeren-meisjens deeze ongeschiktheid dikwijls met verdriet gezien: men moet dezulken leeren, hoe zij de weeën moeten verarbeiden; en als zij zig door goede woorden niet laten gezeggen, moet men haar noodzaaklijk harder aanspreken.

Het alte vroeg verarbeiden der weeën.

Als onverstandige Vroedvrouwen de voorzeggende weeën niet wèl van de waare weeten te onderscheiden, bijzonderlijk bij zwangeren, wier baarmoedersmond zig reeds eenigen tijd vóór de geboorte een weinig opent, en dan deeze tot het verarbeiden dier weeën aanzetten, zoo wordt de baarende vrouw verhit, verzwakt, het lamsvocht gaat te vroeg weg, en het hoofd des kinds neemt dan dikwijls eene kwaade ligging aan; zoo zig hierop de waare weeën instellen, zijn dezelve meestal zeer zwak en onregelmatig; des moeten de Vroedvrouwen zig met de kennis der weeën, en derzelver verscheidenheid wèl bekend maaken, om bij voorvallende gelegenheden bekwaamer te wezen.

Gebreken der naast de baarmoeder liggende deelen.

De pisblaas, de endeldarm, de eiërnesten, de takken der speenader, en 't in het hol van 't bekken liggende vet, kan eeing hinder in de verlossing veroorzaaken: hieronder kan men ook alle de ingewanden, in het hol van den buik liggende, betrekken: in 't geheel bestaan de gebreken der naast de teeldeelen liggende deelen, in de volgende:

- 1) De ophooping der pis.
- 2) Het ophoopen van de drekstof.
- 3) Het zwellen der speenader.
- 4) Het gezwollen eiërnest.

De ophooping der pis.

Als eene baarende vrouw zig niet in den beginne der geboorte van de pis ontlast, kan zij zig van dezelve dikwijls niet meer ontdoen, wanneer het hoofd reeds zoo ver in het bekken is geperst, dat de pisweg toegedrukt wordt: hier hoopt zig dikwijls eene groote menigte pis in de blaas op, zoo dat deeze een tweeden buik boven de schaambeenderen vormt, en des de baarmoeder scheef moet drukken; de geboorte wordt langzaamer, en bezwaarelijk, en de pisblaas is in gevaar van, door het hevig drukken op dezelve, te barsten: in dit geval moet men de pis ten eersten, door een' katheter, trachten te ontlasten; of, zoo dat niet mogelijk is, moet het hoofd door de hand terug en naar boven gedrukt worden, zoo dat de blaas zig van haare inhoudende pis kan ontlasten: een steen, die in den hals der blaas, of in den pisweg zit, kan insgelijks, als hij groot is, de geboorte bezwaarelijk maaken; maar in gevalle het hoofd des kinds wat scheef staat, en den bodem der pisblaas samendrukt, ontlast de vrouw dikwijls maar weinig pis: van dit geval zullen wij op zijne behoorelijke plaats spreken.

De ophooping van drekstof in den endeldarm.

Meestal hebben de vrouwen meer lust, en eeten en drinken ook meer, staande dan buiten de zwangerheid; het uitzetten der baarmoeder maakt bij haar ook niet zelden eenen verstopten of harden afgang; en de in den endeldarm opgehoopte drekstof, kan de baarmoeder van haare natuurlijke plaats wegdrukken, en ook het bekkenhol meer opvullen: dus moet men niet verzuimen, bij eene naderende geboorte, eenige klyfsteeren te laten zetten, om de opgehoopte darmen te ontlasten, anders

zoude door het drukken van 't nederpersfende hoofd eene geduurige ontlasting der drekstoffe, staande de geboorte, plaats hebben, hetwelk, zonder noodzaakelijkheid, te lastig is; of als deeze uitwerpselen te hard zijn, kunnen zij ook een' tegenstand der verlossing veroorzaken, hetwelk door den heer VAN ZWIETEN is waargenomen.

Het uitzetten of swellen der speenader.

Wanneer tegen het einde der zwangerheid het zwellen der speenader zig, of in den endeldarm, of ook, zoo als men heeft waargenomen, in de schede laten vinden; drukt het hoofd in zijnen doorgang den endeldarm geheel plat, en de geboorte wordt zeer pijnlijk; hier van daan is het, dat de vrouwen geen geweld willen doen, om de weeën te verarbeiden, waardoor de geboorte vertraagd wordt — Ik heb in dit geval eenige keeren met den damp van water, ook door het aanzetten van bloedzuigerst, met azijn van goudglid, en weekmaakende pappen, de pijn om den aars veel verminderd.

Het swellen der eïernesten.

Men heeft één of alle twee eïernesten, met water opgevuld, of verhard, en tot eene verbazende grootte uitgezet gezien: deeze gezwollen kunnen de baarmoeder eenigzins samen- of scheef-drukken, waardoor de geboorte naderhand traager, somtijds geheel onmogelijk wordt gemaakt, en dusdanig het bijkomen der kunsthulp noodzaakelijk doen weezen.

Gebreken der afgelegene deelen.

Onder de gebreken der afgelegene deelen worden geteld de volgende gevallen; als

- 1) Wanneer de voor het eerstkraamende vrouw te jong is, _____ te oud is.
 - 2) _____ te oud is.
 - 3) Als eene baarende vrouw te vet is,
 - 4) _____ te waterzuchtig is,
 - 5) _____ te volbloedig is,
 - 6) _____ als zij stuipen krijgt,
 - 7) Als eene baarende vrouw mank gaat.
 - 8) _____ een bogchel heeft,
 - 9) _____ te kleen is,
 - 10) _____ door eene ziekte overvallen wordt,
 - 11 Als de baarende vrouw dood is.
-

Als de vrouw die voor het eerst kraamt, te jong is.

Meestal heeft eene nog alte jong zijnde eerstkraamende vrouw, een langzaame, zwaarder, en pijnlijker geboorte, dan die meer gekraamd hebben, en ook die reeds den huwbaaren ouderdom bereikt hebben, om dat bij deezen de uitwendige teeldeelen nog harder en onbeweegelijker zijn; en het toomtjen der lippen ook nog vaster samen zit; doch als er niet een ander gebrek bij is, neemen deeze geboorten meestal eenen goeden uitgang: men heeft zwangeren gezien van eenen geringen ouderdom, die gelukkig verlost zijn.

*Wanneer de vrouw, welke voor het eerst kraamt,
te oud is.*

In het geheel geloofst men, dat eerstkraamende vrouwen; te oud zijnde, de zwaarste verlossing te wachten hebben; uit hoofde dat haare vezelen te hard en te stijf zijn, en zig derhalven niet zoo gemakkelijk, als in een middenmaatigen ouderdom, laten uitrekken, om zig te verlangē: doch als er anders geene gebreken tegenwoordig zijn, stelt de ouderdom geen hinderpaal aan de moeder; om dat de Natuur als dan, van zig zelve, de verlossing volbrengt.

Als eene baarende vrouw te vet is:

HYPOCRATES heeft vette maagden en vrouwen voor onvruchtbaar verklaard; doch in onze landstreeken strijdt de ondervinding tegen deeze meening; ik heb eenige heele vette vrouwen wezentlijk zwanger gezien, en zelfs eenigen van die verlost: de geboorte was alleenlijk wat langzaam, om dat zij haare weeën niet genoeg konden verarbeiden: (vette menschen kunnen niet lang den adem ophouden, en haare buikspieren kunnen zig, door het zwaare vet, niet krachtig genoeg op de baarmoeder samentrekken:) men stelt bij dergelijke vrouwen den hinderpaal van de geboorte, in het veele vet om den mond der baarmoeder en der schede; maar niet één ontleedkundige heeft rondsom den baarmoedersmond vet gezien, en het overtollige vet der schede kan zig, een zacht ligchaam zijnde gemakkelijk laten samendrukken.

Als de baarende vrouw watersuchtig is.

Er zijn vrouwen, die te gelijk zwanger en waterzuchtig zijn: nadert bij de zulken de geboorte, zoo hindert het water in de buikholte aan de samentrekking des middenrifs en de buikspieren op de baarmoeder, en dus ontstaat hierdoor eene langzaame geboorte: door aftapping van het water wordt dezelve niet verhaast, dewijl het altoos gevaarlijk is deeze operatie te doen, om dat de baarmoeder aan de oppervlakte van den voorbuik ligt, en dus zoude, zonder kwetzing van deezen, de naald tot het aftappen, niet binnen gebragt kunnen worden: men laat des deeze geboorte alleenlijk aan de Natuur over, al is dezelve wat langzamer; want men heeft tog genoeg ondervinding van dat de krachten der Natuur alleen genoeg zijn, om haar te voleindigen.

Als de baarende vrouw te volbloedig is.

Volbloedige baarende vrouwen, brengen, door den arbeid, haar bloed in eene sterke beweging; hierdoor kunnen zig zoo wel in, als naa de geboorte kwaade toevallen openbaaren: de meeste Vroedkundigen hebben waargenomen, dat bij volbloedigen niet zelden de weeën zeer zwak zijn, of geheel wegblijven; en voords gezien, dat naa eene aderlaating de weeën menigvuldiger en sterker worden: de vezelen der baarmoeder trekken zig door het ontlasten der bloedvaten beter en ligter samen; en de zachte deeldeelten worden door eene aderlaating wat ontlast en verminderd: men kan ook door eene aderlaating, bij jonge volbloedige vrouwen, de ontfteeking, stuipen, en de bloedvloeijing, naa de geboorte verhoeden.

Als er bij eene baarende vrouw stuipen komen.

De stuipen dooden meestal moeder en kind: als eene baarende vrouw stuipen heeft, zoo moet de Geneesheer de inwendige oorzaak zoeken weg te ruimen: de Vroedmeester moet maar alleenlijk waarneemen, of de vrouw in deeze stuipen ook wááre weeën heeft, of niet: in het eerste geval, 't welk door het openen van den baarmoedersmond en door het groejen van het water gekend wordt, heeft men hoop dat de stuipen der baarmoeder het kind zullen uitpersen, zo er anders geen gebrek aan het kind, of aan de moeder plaats heeft: volbrengt de Natuur zelve de geboorte niet, (daar er tog gevallen zijn, dat de stuipen de baarmoeder overvallen, en het kind, zonder weten der moeder, uitpersen,) zoo moet men het kind, naar de omstandigheden gericht, door de kunst verlossen; om dat de ondervinding heeft geleerd, dat de moeder en het kind meermaals behouden worden daar eene schielijke verlossing gedaan wordt, dan dat dezelve niet gedaan wordt: maar heeft eene stuipen hebbende kraamvrouw geene weeën, die den mond der baarmoeder openen, zoo is de zaak veel gevaarlijker: in dit geval moet men den mond der baarmoeder geen geweld aandoen: echter kan men trachten, door een terugdrukken van het staartbeen, of indien men den baarmoedersmond door de vingers wat prikkelt, de weeën wakker te maaken. Ik heb van twaalf zwangere vrouwen, welken in de laatste maanden, of kort vóór de geboorte stuipen hadden, niet één zien doorkomen. **LEBMACHER** verzekert het zelfde, daar hij van een nog grooter getal, in stuipen zijnde, maar één het leven heeft zien behouden; en bij welken de geboorte spoedig is afgelopen (*). Ik geloof dat de

(*) Ik heb, naa dat ik dit geschreven had, vier baarende vrouwen, die stuipen hadden, door een vierde gijn *Ipecacuanha*, met eenen halven scrupel suiker gewreven, en alle quartier uurs gegeven, van den dood gered.

stuipen der zwangeren gevaarlijker zijn, dan die der baarende vrouwen; wel verstaande die stuipen, die door de zwangerheid als haare oorzaaken ontstaan: want *hysterieke* en die der vallenden ziekten, als ook die geen en die door de pijnlijke verwijding van den baarmoedersmond ontstaan, zijn niet zoo gevaarlijk.

Als eene baarende vrouw mank gaat, of eenen bogchel heeft.

Is het bekken bij eene bogchelachtige en manke vrouw wel gesteld, heeft het zell's zijne rechtmaantige wijdte, zoo behoeft men niets te vreezen; maar heeft de vrouw bij den bogchel eene borstziekte, het welk verhindert den adem lang terug te houden, en de weeën behoorelijk te verarbeiden, zoo kan de geboorte door deeze oorzaak langzaam worden: is de bogchel door de engelsche ziekte ontstaan, zoo is gemeenlijk het bekken ook nauwer, en gebrekkig gebleven, 't welk dan eene zwaare geboorte veroorzaakt.

Gaat eene vrouw mank, door de engelsche ziekte, of naa eene niet herstelde ontwrichting van het deiebeen, zoo kan de geboorte zwaar zijn, als het hoofd van het deiebeen op het *foramen ovale* van het bekken eene drukking maakt.

Als eene baarende vrouw te klein is.

Men stelt in dit geval, dat het kind door zoo een klein bekken niet heen kan komen, en men vreest dus eene zwaare geboorte: echter moet men hier de voorzienigheid der Natuur beschouwen; want meestal hebben kleine vrouwen ook kleine kinderen, en, tog hebben kleine

vrouwen, naar gelang van haare ligchaamen, groote bekkens; maar, is deeze kleinheid des ligchaams door de engeliche ziekte ontstaan, en is het bekken daardoor gebrekkig geworden, zoo is niet het statuur, maar de ziekte de oorzaak, die het ligchaam tot eene Natuurlijke geboorte onbekwaam heeft gemaakt.

Als eene baarende vrouw ziek is.

Vrouwen, die aan eene zwaare of langduurige ziekte kwijnen, moeten dikwijls een zwaaren arbeid ondergaan, dewijl zij te zwak zijn, om de weeën te verarbeiden: zij sterven meest vóór de geboorte, of kort naa dezelve: men telt tot de gevaarlijke ziekten, de borstziekten: bij voorbeeld, aëmborstigheid, flecken in de zijde, enz. die verhinderen, dat de vrouw den adem niet lang genoeg kan inhouden, en alzoo, bij de geboorte, de noodige perssing niet kan doen.

Als de baarende vrouw dood is.

Somtijds hebben zwangere en baarende vrouwen, kort vóór de geboorte, eene beroerte, of sterven ook wel in eene stuip, in eenen bloedvloed, door eene scheuring der baarmoeder, of andere ziekte: het is wonderlijk te hooren, wat de Natuur soms, in dergelijke gevallen, gedaan heeft: men heeft waargenomen, dat de vrucht uit het ligchaam der moeder is geperst geworden: doch op zulk eene geboorte mag men niet altoos wachten: het is wel eens gebeurd; maar in honderd dergelijke gevallen zoude het misfchien niet weér gebeuren: men moet des het kind liever keeren, of het zelve door de keizerlijke snede naar buiten brengen: door het keeren als het teken des doods nog onzeker is; daarentegen door de keizerlijke

snede als de dood zeker is: deeze operatie moet op de zelfde plaats als men gewoon is, en met dezelfde voorzichtigheid gedaan worden als bij een levend voorwerp, om dat de moeder (zo zij nog naderhand bekwame) niet door de wonde sterfe.

De vruchtlooze gewoonte van de zwangere vrouwen, die dood zijn, onder het voorwendsel dat het kind dan kan ademen, den mond der moeder met een stuk hout open te houden, is zeer te belagchen: het ware beter eene doode vrouw warme pappen op den buik te leggen, denzelven te wrijven, om het bloed door die warmte in het kind vlocibaar te houden: het door de snede naar buiten gebragte kind is zeldzaam levendig, indien de operatie niet terstond naa het overlijden gedaan wordt.

De zwaare en tegennatuurlijke geboorte, door een gebrek aan het kind en deszelfs deelen.

De geboorte kan zwaar, en ook tegennatuurlijk worden, door een gebrek, dat aan het kind, of alleenlijk aan die deelen die tot het kind behooren, plaats heeft.

De gebreken welken aan het kind plaats hebben, zijn of aan het hoofd, of aan het lijf, of aan de ligging: de gebreken die aan de inwendige deelen plaats hebben, zijn aan den navelstreng, of aan den moederkoek, of in de vliezen, of, eindelijk, aan het lamsvocht.

De gebreken aan het hoofd.

De gebreken aan het hoofd zijn de volgende:

- 1) Het alte groote hoofd des kinds.
- 2) — monstereuse hoofd.
- 3) — waterhoofd.
- 4) — dubbelde hoofd.
- 5) De verbeening der fontanel.

Behalven de kwaade liggingen van het hoofd, moeten deeze gebreken op zig zelve beschouwd worden; de kwaade liggingen vorderen eene bijzondere verhandeling, aangezien haare menigvuldig verscheidenheden.

Het alte groote hoofd des kinds.

Heeft het bekken zijne natuurlijke wijdde, maar is daarentegen het hoofd des kinds te groot, zoo moet er eene zwaare, of wel eene tegennatuurlijke geboorte ontstaan: de volgende kenmerken heeft men van dat het kind te groot is.

1) Men neemt waar, dat de geheele hand gemakkelijk in het bekkenhol gebragt kan worden; 't welk ook een teken is, dat het bekken niet te naauw is.

2) De buik zakt niet in den laatsten tijd der zwangersheid; en dus verneemt men ook geene inzakking van den baarmoedersmond, zoo als in de ligte geboorte.

3) Als het hoofd bij de hevigste weeën naauwlijks nederzakt.

4) Er groeit een zeer klein en vlak water, vóór het hoofd des kinds:

5) De baarmoedersmond opent zig meer en meer, maar het hoofd blijft gestadig in de bovenste opening, of ingang van het bekken staan.

6) De fontanel en pijnnaad schuiven sterk over elkander.

7) Men voelt den geheelen ingang des bekkens, met het ingeperste hoofd zeer naauwkeurig opgevuld; zoo dat het naauwlijks mogelijk is eenen vinger daar tuschen te brengen: ook bevorderen de hevigste en zeer langduurige weeën, het hoofd, binnen vier-en-twintig uren, weinig of geheel niet.

8) Op het laatste breekt het water, hetwelk weinig is, zoo dat eenige gelooven dat het kind in 't geheel geen water gehad heeft.

Het hoofd kan een vierden, eene halven, of wel een geheel duim te groot zijn; hieruit volgt nu den ver-

schillenden graad der zwaare hoofdgeboorte; wij zullen dezelve in drieën verdeelen en beschouwen.

De eerste graad is die, als het hoofd in zijnen omtrek een duim grooter is dan natuurlijk.

Deeze geboorte kan aan de Natuur overgelaten worden;

- 1) Zoo lang men gestadige en sterke weeën waarneemt;
- 2) Als het hoofd bij iedere laag meer puntig wordt;
- 3) Als op het hoofd, een gezwel ontstaat, hetwelk in grootte toeneemt;

4) Als de arbeid maar slechts vier-en-twintig uren geduurd heeft: men kan altoos nog langer afwachten, wat de Natuur zal doen; om dat deeze dikwijls in zes-en-dertig uren het hoofd nog meer versmalt, en verlangt, zoo dat het omtrent tweemaal zoo lang als breed wordt, en somtijds de geboorte zonder nadeel voor moeder en kind volbrengt: men moet hier alleenlijk zorgen, dat de drek uit den endeldarm en de pis uit de blaas ontlast zij, ééne of eenige aderlatingen doen, om de ontsteeking der baarmoeder voortekomen, maar de weeën moeten langzaam verarbeid worden.

Maar is in den tweeden graad het hoofd grooter, zoo raakt het bekneld; of als de weeën of vlaagen gestadig en sterk aanhouden, en alzoo verarbeid worden, zoo persen zij het hoofd wel voord, maar de baarmoedersmond scheurt dikwijls, als ook de schede, den pisweg en de bilnaad, of er ontstaat eene ontsteeking der teeldeelen, welken in het kraambed niet zelden tot versterving overgaan; zij die als dan niet sterven houden, daarom, meestal, een onvermogen om de pis en de drekstof op te houden: ook ontstaat er, als de weeën alte sterk verarbeid worden, somtijds eene scheuring der baarmoeder, waarna de kraamvrouw zeer onverwachts sterft; een toeval, hetwelk te vooren reeds beschreven is.

Alle deeze gevallen zijn zeldzaam; maar meest gebeurt het, dat naa zes-en-dertig of agt-en-veertig uren de weeën geheel wegblijven; het hoofd wordt niet puntiger, maar raakt geheel bekneld, naamlijk of in den ingang, of in het hol zelve, of in den uitgang van het

bekken, naar dat het door de weeën is voordgeperst, toen dezelve er nog waren.

In den derden graad, wanneer het hoofd overmaatig groot is, geraakt het reeds in de bovenste opening van het bekken bekneeld: hier baaten ook de sterkste weeën in drie of vier dagen lang niets: wordt de baarmoeder, in de weeën, niet door het hoofd ingescheurd, zoo komt aan dezelve eene ontfteeking, die in versterving overgaat, en moeder en kind tegelijk ombrengen.

Hieruit zien wij, dat er drie soorten van zwaare geboorten zijn, welken door een alte groot hoofd veroorzaakt worden: de eerste graad wordt door de Natuur gelukkiglijk ten einde gebragt; de tweede graad moet men door kunst, en door eene zachte en langzaame verarbeitung der weeën te hulpe komen, en de derde graad moet geheel en al door de kunst volbragt worden; vooral wanneer men geene weeën meer kan opwekken; of als het hoofd door de weeën niet meer wordt ingeperst, of ook, als er een dringend toeval, bij voorbeeld, eene scheuring of ontfteeking der baarmoeder te vreezen is.

Als de weeën alleenlijk door gebrek aan krachten wegblijven, en er nog geene ontfteeking der baarmoeder, of een ander dringend toeval tegenwoordig is, kan men de vrouw goeden wijn met *opium* geeven, als ook eenige kommetjens met weernat; men kan ook prikkelende klystieren zetten, den mond der baarmoeder wat prikkelen, of het slaarbeen achteruitdrukken: bijzonderlijk als de vrouw wat gerust heeft om daardoor nieuwe vlaagen te verwekken: wordt door deeze weeën het hoofd niet voordgeperst, zoo moet men onderzoeken of hetzelve zoo groot is, dat het niet eens in den ingang van het bekken heeft kunnen gedrukt worden; of het hoofd in de bovenste opening of ingang, in het hol, of in den uitgang of onderste opening is ingeperst, en aldaar bekneeld is geraakt.

In alle deeze gevallen moet men wel letten, of het kind leevendig, dan dood is.

Is het hoofd zoo groot, dat het in zulk eenen langen

tijd niet door den ingang van het bekken is geperst, en zijn er gewisse tekens dat het kind nog leeft, zoo is er maar één middel over, waardoor hetzelve van den dood gered kan worden, naamlijk de keizerlijke snede, eene operatie die tog altoos voor de moeder twijfelachtig is: in dit geval is het keeren, de hefboom, en zijn de tangen vruchtloos; want, al keerde men het kind, zoo ware het tog niet mogelijk het overgroote hoofd naar buiten te brengen: met den hefboom zoude men het slechts scheef drukken, en anders niets verrichten; de tangen kan men niet aanwenden, om dat het hoofd nog boven den ingang van het bekken staat; alzoo is hier de keizerlijke snede, als het kind nog leeft, of het ontlasten der hersenen, wanneer het dood is, het eenige middel; maar is het hoofd reeds meer dan op ééne plaats in den ingang van het bekken bekneeld, zoo moet men, als de weeën wegblijven, gebruik maaken van den hefboom, deels om nieuwe weeën te verwekken, deels om het hoofd wat afgedrukken.

Indien dit instrument niets helpt, zoo moet men overgaan tot de tangen, ten einde door dat middel het hoofd, als 't ware, met ijzeren handen, naar buiten te trekken; maar kan men ook daardoor niets uitvoeren, en kunnen zij niet op de rechte plaats aangelegd worden, of is zulks reeds geschied maar zonder goed gevolg, zoo kan men eindelijk, bij een nog leevend kind, de schaambeenen klieven, en bij een dood kind het hoofd van de hersenen ontlasten.

Nu is het ligtlijk te vermoeden, dat deeze drieërleie operatiën met meerdere zwaarigheid verknocht zijn, wanneer het hoofd nog in den ingang is, dan als 't zelve in het hol, of in den uitgang van het bekken is bekneeld geraakt.

De wijze, om deeze operatie te bewerkstellen, zal ter behoorelijke plaatse geleerd worden.

Het monsterachtige hoofd.

Is de mismaaktheid des hoofds niet overtollig groot; en zijn de beenderen van hetzelfde niet al te hard, zoo gaan zulke hoofden zonder eenige hinder, even als een wél gesteld hoofd door het bekkenhol heen; maar heeft de mismaaktheid en de hardheid der beenderen eene tegennatuurlijke grootte of ongeschiktheid tot het doorgaan veroorzaakt, gebreken welken door een' Vroedmeester alleenlijk door het gevoel waargenomen worden, dan moet hij uit het vergelijken van dezelve, met andere toevallen, en uit het beschouwen der werkinge, oordeelen, wat hier het best gedaankan worden; want dit is het geval waarin een Vroedmeester bij zig zelve raad moet zoeken: in enkele gevallen kan men in deeze omstandigheden geene regelen aan de hand geeven, om dat er een oneindige verscheidenheid in de mismaaktheid der hoofden plaats heeft, voornaamlijk komt het alleenlijk aan op den graad van de grootte des hoofds.

Het waterhoofd.

Men heeft waargenomen, dat het weeke bekkeneel des kinds, in 's moeders ligchaam, door het opgehoopte vocht, verbazend groot uitgezet kan worden: naar maate nu zulk een kind met het hoofd of met de voeten door het bekkenhol gaat, naar maate vindt ook het hoofd altoos hinderpaalen.

Komt het hoofd eerst voor, zoo kent men dien toestand uit de grootte, om dat hetzelfde zig overal sterk in den uitgang beknelt: voor en naa ontstaat een bijzonder groot gezwel op het hoofd, even als of uit één, twee hoofden wierden gemaakt: doch dit gezwel is zacht op het gevoel, en het hoofd wordt voor en naa, tegennatuurlijk, in de lange gevormd.

Men heeft waargenomen, dat kinderen met zeer groote hoofden gelukkig verlost zijn; want de weekheid der bekkeneelsbeenderen deezer ziekte eigen, laat eene ongeloofelijke verlenging des hoofds toe: men heeft ook waargenomen, dat onder de geboorte het hoofd op zijde is opengeborsten, en naa dat het water zig ontlast had, de geboorte gemakkelijk is volbragt: echter heb ik tweemaal gezien, dat het bekneld is geraakt, en alleenlijk door de kunst naar buiten gebragt is.

Een Vroedmeester zoude de geboorte van een kind met een waterhoofd wel wat verlichten, als hij met het verborgen lancet eenige niet diepe insnijdingen deede, in het gezwel, dat op het voorkomend hoofd gevonden wordt; maar meestal is het een inwendig waterhoofd, hetwelk eene insnijding door de beenderen heen tot in het hoofd, noodig hadde: is dus zulk een kind nog levendig, zoo wordt het zekerlijk door 't ontlasten van het water, gedood; want de ondervinding heeft geleerd, dat alle kinderen die een waterhoofd hebben, zoddezelven doorboord worden, terstond naa de operatie, sterven.

Als nu zulk een hoofd in het bekken bekneld geraakt is, en 't kind nog leeft, zoo vordert het geweeten van een' Vroedmeester, om te trachten hetzelfde met stompe werktuigen, dat is met den hefboom, of met de tang ter waereld te brengen; maar heeft een Vroedmeester zekere tekens dat het kind dood is, zoo kan hij eene insnijding in het hoofd doen, om daardoor het vocht te ontlasten, en dan valt het hoofd samen: heeft de vrouw dan nog weeën, en is zij niet te zwak, dan verlost het kind zeer gemakkelijk, maar zoo niet, moet hetzelfde door een stomp werktuig uitgehaald worden.

Het tweede geval van een waterhoofdsgeboorte, daar het hoofd niet door het bekken heen kan gebragt worden, en met de voeten reeds geboren is, vordert die handgreepen, welken in eene andere afdeeling der voetgeboorte zullen verhandeld worden.

Zijn deeze handgreepen mogelijk, en is het kind zekerlijk dood; ziet men te vooren, dat door het doorhaa-

len van zulk een groot hoofd, de bilnaad zekerlijk zoude inscheuren, zoo moet men met het *perforatorium* het achterhoofd doorbooren, (om dat men, in dit geval geene andere plaats kan bereiken), het water laten uitloopen, en dan, met of zonder eenen stompen haak, het hoofd doortrekken (*).

Het dubbelde hoofd.

Het is niet onmogelijk dat een kind twee hoofden heeft: men heeft dit geval onder de speelingen der Natuur (†) waargenomen; daarom moet men bij zulk eene verlossing, voornaamlijk door het onderlaan met de hand, trachten te onderscheiden, of er maar één, dan twee hoofden in de bovenste opening van het bekken treden: is het nu dat men er twee voelt, en die niet te groot zijn, zoo wordt het wel eene langzaame geboorte, maar echter heeft de ondervinding geleerd, dat zij door de Natuur verricht kan worden; maar in het tegengestelde geval, als zij te groot zijn, en niet verder komen, moet men bij een nog levend kind de tang te hulp neemen, of, als het kind waarschijnlijk dood is, zoo moet de geboorte door het ontlasten der hersenen geschieden.

(*) Ik heb, staande den loop mijner praktijk, vier waterhoofdsgeboorten onderhanden gehad: het eerste hoofd was vijf dagen lang bekneld geweest, en de vrouw stierf, zonder verlost te zijn, eer ik bij haar was; ik moest het kind door de keizerlijke snede uit het doode ligchaam neemen — het tweede waterhoofd was bekneld; hier verlost ik de vrouw door de tang — het derde kind kwam met de voeten voor, en een Vroedmeester was, vóór mijne komst, reeds drie uren lang bezig geweest om het hoofd uittehaalen: ik vond den onderkaak uingescheurd, den navelstreng afgesneden, en voelde, dat in de oogholten haaken gezet waren: ik beproefde de verlossing nog eens met de haaken in het ooghol gezet, en bragt het hoofd, in weinige minuten, naar buiten, zonder inscheuring der bilnaad. — de laatste geboorte van een waterhoofd, is ten opzichte der moeder, gelukkiglijk, in twee dagen afgelopen: in alle deeze gevallen was het kind dood, en ook alle waren inwendige waterhoofden.

(†) De Hoogleraar BONN, bezit, in zijne verzameling, zulke kinderen met twee hoofden.

Het verbeenen der fontanellen.

Men heeft waargenomen dat de voor- en achter-hoofdsfontanellen beenig worden: daar nu de bekkeneelsbeenderen hier niet over elkander schuiven, zoo kan het hoofd de gedaante van den doorgang des bekkenhols niet aanneemen: als zulk een hoofd geen wijd bekken ontmoet, of anders niet geheel klein is, zoo geraakt het beknelde: dit gebrek wordt gekend door het gevoel; wanneer men naamlijk ontdekt, dat geen der fontanellen zig over de andere laat schuiven, en dat derzelver beenderen op het aanraaken hard zijn: in dit geval moet men, bij een levendig kind, gebruik maaken van den hefboom of den tang, of toevlugt neemen tot het doorklieven der schaambeenderen, om het hoofd te verlossen; maar bij een dood kind moet men, daarentegen, het hoofd van de hersenen ontlasten: WALBAUM meent het beter te zijn, in den beginne het kind te keeren, dewijl men als dan een verbeend hoofd gemaklijker door het bekken kan trekken, als het naamlijk niet te groot is, vermids de hardheid niet hindert: maar is het hoofd te groot, dan kan men daardoor de geheele zaak verergeren: is het hoofd middenmaatig van grootte, zoo doet het keeren niet veel af.

Het beenig worden der fontanellen is juist geene vrucht van eene beschouwende verbeelding, gelijk eenigen willen: ESCHENBACH, HEBENSTREIT, en DEYNS, maaken er gewag van (*).

(*) Ik heb in het afgelopen jaar, een reeds drie dagen lang beknelde hoofd, hetwelk niet zeer groot was, bij eene sterke vrouw onthersend, om dat ik met de andere werktuigen vergeefsch gewerkt, en het zekertte teken van den dood des kinds had; toen ik het *perforatorium* door één der fontanellen wilde heenbrengen, ontmoette het werktuig eenen aanmerkelijken tegenstand, zoo dat er een groot geweld noodig was, om het doortebrengen; ik had omtrent twee uren tijds noodig, om het hoofd te verlossen — Na de geboorte onderzocht ik, en de Heer PASCH, een goet Heel- en Vroed-meester, het ledige hoofd, dat niet zeer groot was: de bekkeneelsbeenderen waren overal hard, en zoo-wel in de naaden, als in de fontanellen verbeend. SAXTORP, mijn vriend, een kundig Deensch Vroed-meester, heeft in zijne ontleedkundige verzameling het hoofd eener vrucht, wier zelve zig gemaklijk heeft toegedragen. Het is te gelooven dat, door dit altoos vroeg verbeenen, het hoofd in zijnen wasdom belet wordt.

Gebreken aan het ligchaam des kinds.

Deze gebreken des kinds zijn de gebreken des hoofds allezins gelijk; alleenlijk vereischen zij eene bijzondere hulp: tot dezelve behoren,

- 1) De alte breede schouders van het kind.
- 2) Deszelfs monstereuse gedaante.
- 3) Samengegroeide tweelingen.
- 4) Een waterzuchtig kind.

De alte groote schouders van het kind.

Gelijk bij een welgemaakt kind het hoofd, in tegenoverstelling van het ligchaam, te groot bevonden wordt, veroorzaaken somtijds ook de alte breede schouders, met een dik ligchaam, een hindernis in de geboorte.

Dit gebrek is zoo zeldzaam niet als RÖDERER meent; echter komt het ook niet zoo zeer menigvuldig voor, als de Vroedvrouwen er wel van spreken; welken daarom, bij alle Natuurlijke geboorten, de armen eerst losmaaken: dit gebrek wordt gekend, als het hoofd zijne natuurlijke ligging heeft, en in den daartoe behoorelijken tijd, in het bekkenhol komt, doch dan staan blijft, of zeer langzaam door dit hol heen schuift, en als, naa het hoofd geboren is, de schouders niet door den uitgang of de onderste opening van het bekkenhol kunnen doorkomen, om dat de dwarse afneeting van de bovenste bekkenopening, van den rand des darmbeens op de eene zijde, tot op de andere zijde, wijder is dan de dwarse afneeting der onderste opening van het bekken, van het eene tot het andere zitbeen; alzoo gaan dikwijls de breede schouders zeer langzaam door den ingang, en in den uitgang van het bekken blijven zij zitten, al bevindt het hoofd zig vóór de schamelheid.

Wanneer men hier het hoofd met geweld naar zig trekt, zoo zoude men hetzelfde gemaklijk van den hals afscheuren, het geen ook reeds waargenomen is.

Men moet derhalven in dit geval het hoofd van het kind doorlaaten, zoo als 't is, en vooraf op de volgende wijze, de armen eerst losmaaken.

Als het hoofd reeds buiten de schamelheid staat, zoo brengt men de hand tusfchen het aangezicht en het heiligbeen over de borst van het kind; voords zoekt men met den vinger een langs de borst liggenden arm; buigt denzelven in den elleboog tegen de borst; trekt hem op dezelve naar beneden, en vervolgens naar buiten; hierna vat men het kind bij den fchouder van den arm, en houdt de andere hand aan het tegenoverftaande gedeelte des hoofds, beproevende alzo om het kind naar buiten te brengen: volgt hetzelve op deeze handgreepen niet, zoo moet men ook den tweeden arm op dezelfde wijze naar buiten trachten te brengen, en dan, als er anders geen gebrek aan het kind is, zal men zekerlijk de geboorte voleinden.

Als de Vroedvrouwen in dit geval eenen arm los maaken, brengen zij maar eenige vingers in den oxel van het kind, en trekken dan met geweld den arm voort; doch doen op die wijze niets goeds: fomtijds drukken zij het opperarmbeen ftijf aan het bekken, en breeken daardoor den arm, hetwelk ik dikwijls gezien heb.

Van de monsterachtige gedaante des kinds.

Als het hoofd natuurlijk, maar de borst of buik des kinds monsterachtig gevormd is, zoo hangt de zwaarigheid der geboorte van de grootte en de plaatsing deezer gebreks af: men heeft tot nu toe bij de natuurlijke verlosfingen, het kind slechts zeven of agt ponden zwaar bevonden te weezen; maar als hetzelve te groot was, woog het fomtijds twaalf ponden, hetwelk ik tweemaal waargenomen heb: in zulke gevallen heeft men voornaamlijk te letten, of het kind leeft, dan dood is: 't laafte geval heeft meestal plaats, en dan kan men de borst- en buiks-ingewanden ontlasten.

Van aan elkander gegroeide tweelingen.

Wanneer twee kinderen aan elkander gegroeid zijn; zoo is die samengroeijing eene van de volgende drie foorten; naamlijk 1) met de borst, of 2) met den rug samengegroeid, alzoo dat zij zig met de hoofden naderen; of zij zijn 3) zoo samengegroeid, dat het hoofd van 't eene met de voeten van het andere is vereenigd (*): hier kan men de geboorte, als het bekken wijd is, en de kinderen niet groot zijn, aan de Natuur alleen overlaten, zo de weeën sterk genoeg zijn: men heeft waargenomen, dat in de eerste twee gevallen de huid, waardoor de kinderen vereenigd waren, gelukkiglijk scheurde, en losliet, zoo dat het eene kind het andere volgde: voelt men dat de Natuur dit vanëenscheiden begint, en er ruimte in de baarmoeder is, om eene hand in te brengen, zoo kan men deeze tusschen de twee samengegroeide ligchaamen brengen, ten einde de scheiding te helpen bevorderen, om dat somtijds de vereeniging heel weinig is; maar somtijds bestaat dezelve door middel der beenderen, en dan zoude men de scheiding vergeefsch verwachten: daar men zijn oogmerk op hebben moet is altoos alleenlyk de grootte, 't welk de geboorte onmogelijk maakt, als de samengegroeide tweelingen te groot zijn, en leeven, zoo moeten zij door de keizerlijke snede, maar zijn zij dood, door het ontlasten der ingewanden verlost worden.

Het waterzuchtige kind.

Een kind kan aan het hoofd, aan den buik, of aan de geheele oppervlakte waterzuchtig zijn: van de geboorte van

(*) De Heer PIETER SANNIE heeft tweelingen verlost, die met het bovendeel hunner hoofden samen gegroeid waren, waarvan de beschrijving en afbeelding te vinden is in het IV Deel der Holl. Maatschappij te Haarlem, Bladz. 376.

van een waterhoofd, hebben wij reeds gesproken: van de geboorte eens kinds met het buikwater, en die daar het geheele kind waterzuchtig is, zullen wij in de tegenwoordige afdeeling spreken.

Een kind met het buikwater kan met het hoofd of met de voeten, of, zoo als ik waargenomen heb, met den buik zelven, in de geboorte komen; komt het met de voeten, zoo gaat hetzelfde tot aan den buik gemakkelijk in het bekken, en daar blijft het zitten: komt het met het hoofd voor, zoo gaat dit, eer de borst, door het bekkenhol heen, en hier geraakt het kind, door middel van zijnen dikken buik, beklemd: in het eerste geval kan men de heenen van het ligchaam scheuren, en in het tweede heb ik gezien, dat men veeléer het hoofd aftrok, eer het kind door het bekken ging: als men dus door het onderslaan met de hand, den ontzachtlijk grooten en zachten buik voelt, en de hinderpaalen kent, zoo is er geen ander middel over, dan 't kind het water aftappen.

Het aftappen van dit water kan op tweeërleie wijzen gedaan worden; met den nagel van den wijsvinger, of met een instrument.

De huid op den buik van het kind, vormt meer dan eenen duim breed, eene dunne plooi, die om het begin des navelstrengs ligt; deeze plaats is meestal door het water heel dun geworden, en puilt uit, zoo dat men hier de huid en het buikvlies, met eenen nagel van den vinger, somtijds wel zoo gemakkelijk kan doorbooren, als men anders de vliezen doet breeken.

Zoo het niet mogelijk is op deeze wijs dit te doen, dan brengt men door eene andere *manipulation*, de eene hand op den buik des kinds, en met de andere brengt men eenen langen *troiquart* tusfchen de vingers der eerste hand, tot op den buik des kinds, en doorboort dan den buik, op die plaats, daar men gewoon is zulks te doen; als het mogelijk is, trekt dan de naald terug, en laat de pijp in den buik zitten, tot dat zig al het water ontlast heeft, en trek dan deeze ook weg: hierdoor wint men ruimte om het kind te keeren: voelt men daarentegen in den beginne der geboorte, dat het water-

zuchtige kind dood is, zoo kan men, zonder omstandigheid, in plaats van het kunstige aftappen door den *troiquart*, gebruik maaken van het *perforatorium*, om alzoo eene opening in den buik te maaken, waarop het water aanstonds volgt.

De door WALBAUM hier toe uitgevonden en medegedeelde buikschaar is overtollig; zij vermeerdert zonder noodzaaklijkheid het getal der instrumenten: de afbeelding van eenen langen *troiquart* vindt men op de eerste plaat.

De gebreken van den navelstreng.

Als er noch aan de vrouw, noch aan het kind een gebrek is, kan echter de geboorte verhinderd worden, zo er naamlijk de volgende gebreken aan den navelstreng zijn: naamlijk,

- 1) Als hij te kort is;
- 2) ——— zig om den hals geslingerd heeft;
- 3) ——— alleen, of met een ander deel, in de geboorte voorkomt.

De kortheid van den navelstreng.

Niet alleen de navelstreng die te lang, zoo als bewezen zal worden, maar ook die te kort is, kan tot eene kwaade geboorte aanleiding geeven; want wordt de alte korte navelstreng, door het uit de baarmoeder dringende kind, te veel gespannen, zoo scheidt zig dezelve te vroeg van den moederkoek, of laat den tronk, naa dat het hoofd geboren is, niet naar buiten, of scheurt wel somtijds in stukken: dit scheuren kan, of in het midden, of aan den moederkoek, of, 't geen het gevaarlijkste van allen is, uit de navel des kinds zelve geschieden: het afscheuren aan den moederkoek kan alzoo voor de vrouw,

maar de scheuring der navel kan voor het kind gevaarlijk worden, en eene doodlijke bloeding veroorzaaken, als de verlossing niet schielijk gedaan wordt.

Het slechtste van dit alles is, dat men de oorzaak der bloeding meestal eerst naa de verlossing ziet: daar ontstaat door het scheuren van den navelstreng, eene inwendige bloeding, die zig in het hol der baarmoeder uitstort; want als, naa het breeken der vliezen, de mond der baarmoeder door het voorkomende hoofd toegestopt wordt, zoo kan er geen bloed meer uit de schamelheid vloejen: deeze bloeding kent men daaraan, dat de baarende vrouw in zwijm geraakt; dat het voorhoofd en de ledemaaten koud worden, en dat de buik van oogenblik tot oogenblik meer opzet.

Deeze bloedvliet is in het geheel gevaarlijk, om dat men haar alte laat ziet: er is geen zeker teken, in het begin der geboorte, dat de navelstreng te kort is: de zekerste vermoedingen schijnen mij te zijn, als de baarende onder iedere vlaag, eene hevige trekkende pijn aan den bodem der baarmoeder, waar de koek losgescheurd is, gevoelt.

Zo de bloedvliet bedenking baart, moet men ten eersten door de tang de geboorte verhaasten, als of het hoofd reeds in het bekkenhol ware: is het mogelijk met eenige vingers in den mond van 't kind te komen, zoo kan op deeze wijs de geboorte verhaast worden; bijzonderlijk als de vrouw medewerkt: maar is het hoofd nog voor een groot gedeelte boven den ingang van het bekken, zoo moet ten eersten de keering gedaan worden.

Als men naa de geboorte bevindt, dat de navelstreng uit den buik des kinds gescheurd is, zoo moet men ten eersten gebruik maaken van den eiken zwam, om dien daarop te leggen, en er zoo lang op vasttehouden, tot dat hij daarop vastgekleefd is: het onderscheppen, of het samendrukken der twee navelslagaderen is naauwlijks mogelijk te doen; het opleggen van vitriol, aluin, of *alcoholini*, kan kwaade gevolgen hebben; want als er iet van deeze samentrekkende middelen door de

groote nog open zijnde ader wordt opgenomen, zoo kan dit eene verharding der lever, of ook den dood veroorzaken.

Scheurt de navelstreng uit den koek, dan is het zeker onmogelijk om denzelven uit de baarmoeder te brengen, om dat men dan geen wegwijzer daartoe meer heeft; hetwelk wij op eene andere plaats zullen beschouwen.

Als de navelstreng om den hals des kind geslingerd is.

Als de navelstreng des kinds te lang is, zoo is het somtijds dat dezelve zig om het kind geslingerd heeft, en dusdanig dan eens om het lijf, dan eens om de schouders, dan eens tuschen de beenen doorgaat: het kwaadste is, als dezelve zig om den hals des kinds gelegd, en eens of meermaals omgestrengeld heeft: volgens de taal der vroedvrouwen heet dit, dat het kind gestrengeld is.

In dit geval is de geboorte langzaam en moeijelijk, en somtijds voor moeder en kind gevaarlijk, om dat hierdoor de koek geweldig kan losgescheurd worden, of dat de navelstreng scheurt, of als het kind, door het verhinderen van den terugvoer des bloeds uit het hoofd als het ware verworgd wordt, en dan sterft.

De kenmerken dat een kind, hetwelk met het hoofd natuurlijk in de geboorte staat, om den hals gestrengeld is, zijn de volgende:

- 1) De baarende vrouw heeft korte weeën.
- 2) Het hoofd des kinds, dat in den beginne der geboorte met de kruin recht in den ingang van het bekken gestaan heeft, wordt onder iedere vlaag eenigzins op zijde gedraaid.
- 3) Is de vlaag over, zoo wordt het hoofd zijdelings, zoo ver omhoog getrokken, als het onder de vlaag naag beneden is geperst.

4) Al zijn de weeën nog zoo sterk, zoo is de geboorte echter langduurig.

5) Naa dat het hoofd geboren is, volgt niet aanstonds de tronk, maar het aangezicht des kinds wordt blaauw of zwart, en het bloed droppelt langs het hoofd, uit de schede, hetwelk een zeker teken is.

6) Op het laatste het onderzoek van den hals, waar men den streng omgeslingerd vindt.

Uit deeze zes kennelijke tekens kan men besluiten dat het kind gestrengeld is. Men kan, door een uitwendig nederwaards drukken der baarmoeder, eenigzins verhinderen dat het hoofd zig niet te ver terug kan trekken (*). Eenige Vroedmeesters hebben zig hier bediend van de tang; maar er volgde door het geweldig lostrekken des koeks eene gevaarlijke bloeding.

Maar echter veroorzaaken alle omslingeringen van den navelstreng geene moeilijke geboorte; om dat alleenlijk de kinderen met eenen langen streng gestrengeld gevonden worden: ik heb meer dan twintig maalen de geheele geboorte zoo lang aan de Natuur overgelaten, tot het hoofd, buiten de schaambeenderen was; en dan, als het mogelijk was, heb ik den navelstreng naar het kind toe gehaald, denzelven dan over het hoofd heen gebracht, of als dit niet mogelijk was, met eenen stompen schar doorgeknipt, en met de vingers samengedrukt; voords met een schielijk hetzelfde geheel uitgehaald: geen deezer kinderen was dood, al ware hun geheele aangezicht reeds zwart geworden, en al scheenen zij dood te zijn, ik liet hierom eenige lepels vol bloed uit den navelstreng vloejen, en bond denzelven dan toe: het is dus zeker, dat deeze kinderen aan eene beroerte, door ve hinderde terugkeering des bloeds van het hoofd, en niet aan eene verworping of verstikking sterven, zoo als eenige gelooven.

(*) Sommige Schrijvers gelooven, dat men in dit geval de hand in de schede moet brengen, en met de vingers het hoofd, naa iedere vlaag houden: edoch de breedte, gladde, en ronde hoofden die naa iedere vlaag door den navelstreng omhoog getrokken worden, verijdelen deeze handgreep geheel: andere Vroedmeesters, als bij voorbeeld Professor ADOLPH, willen den navelstreng in het hol der baar-

Het uitzakken van den navelstreng.

Het derde geval, 't welk ten opzichte des navelstrengs tot eene tegennatuurlijke geboorte aanleiding kan geeven, is, als deeze alleen of met een ander deel in den mond der baarmoeder komt.

Is de navelstreng lang, zoo kan hij met ieder deel voorkomen; als, met eenen arm, voet, met den stuit, met de borst, den rug, buik of met het hoofd.

In alle deeze gevallen voelt men, bij een groeiend water, een dun darmvormig, kloppend deel in het water: breekt het water, dan valt deeze koord gemakkelijk in de schede; of, is hij lang, dan hangt hij somtijds geheel buiten dezelve.

In alle opzichten moet men den streng ten eersten met de hand in het hol der baarmoeder terug brengen, en onderzoeken, of het kind natuurlijk ligt, in dien stand in welken het kan gebogen worden, ja, dan neen: is er deeze niet, zoo moet men het kind ten eersten keeren; niet alleenlijk om den navelstreng, maar om de tegennatuurlijke ligging; want daar de streng een klein zacht ligchaam is, kan hij de geboorte niet hinderlijk zijn.

Maar wij zullen hier bijzonderlijk dit geval beschouwen, waarin de navelstreng vóór, naast, of achterwaards met het hoofd in den baarmoedersmond komt.

Meestal staat het hoofd wat scheef, als 't kind met den navelstreng in de geboorte komt; echter neemt men ook bij een rechtstaand hoofd waar, dat deeze ook voorkomt.

Tot nog toe baart de navelstreng geen hinder aan de geboorte des hoofds, maar deeze geboorte kost altoos

moeder doorgesneden hebben, en het gedeelte, naar het kind toe, binden; maar als het hoofd niet diep genoeg in het bekken is gekomen, kent men dit strengelen ook niet; en staat het hoofd reeds geheel in het bekken, zoo kan men teg niet met de hand, en het daartoe voorgestelde instrument, tot aan den hals des kinds komen, en het binden van den doorgesneden navelstreng zal nog onmogelijker zijn.

't kind het leven, wanneer zij niet ſchielijk voordgaat; om dat de zachte navelſtreng langen tijd door dit harde hoofd hevig wordt ſamengedrukt: een klein hoofd, een wijd bekken, eene haſtig eindigende geboorte, bijzonder als de ſtreng zig, in den hoek, naast den voorberg des heiligenbeens bevindt, kunnen gevolgljk het drukken des navelſtrengs wat verminderen; dit alles is echter zelden, en men kan er zig niet zeker op verlaaten: men waagt het leven der vrucht, als men de zaak, in deezen gevalle, geheel alleen aan de Natuur overlaat (*)

Voelt men naa 't breeken van 't water, dat de navelſtreng naast het in zijnen natuurlijken ſtand liggende hoofd is gevallen, zoo moet men dezelve ten eerſten met twee vingers naast die plaats waar deezen is uitgezakt, over het hoofd des kinds zoo ver omhoog trachten te brengen, als 't maar mogelijk is: zakt deeze nu niet meer onder het hoofd uit, dan laat men de geboorte alleenlijk aan de Natuur over; als het hoofd door de daarop volgende weeën in den ingang van het bekken geperst wordt; zoo kan de navelſtreng naast het hoofd niet meer uitzakken; doch voelt men, dat de weeën den naar boven gebragten navelſtreng meer uitdrijven, zoo moet men hem met twee vingers zoo lang naast het hoofd omhoog houden, tot het hoofd in de bovenſte opening van het bekken ſtaat. (†)

Zo het niet mogelijk is door deeze handgreep den uitgezakten navelſtreng, of terug te brengen, of denzelven terug te houden, zoo moet men, zonder

(*) Profesſor LEBMACHER zegt, dat hij van vijftig zulke geboorten, waarbij hij te laat was geroepen, maar een eenig leevendig kind heeft zien verlosſen, en hier was de navelſtreng in den hollen hoek, die zig naast den voorberg des heiligenbeens bevindt; het bekken was wijd, en de geboorte ging zeer ſchielijk voort.

(†) Vroedkundigen, well en vreezen, dat het hoofd des kinds hunne vingers te hevig aan de beenderen van het bekken drukken, raaden, om het verder uitzakken des ſtrengs te verhoeden, een dun, ſmal, opgerold windſel zoedaniq naast het hoofd, in den mond der barmoeder, te brengen, dat het ééne einde daarvan op de ſchamelheid hangt: ik heb deeze wijze nooit beproefd.

iet anders te doen, het kind keeren, en het dan met de voeten haalen: staat het hoofd reeds geheel in het bekkenhol, zoo moet het voorzichtig door de tang verlost worden, om het leven der vrucht te behouden: bij een dood kind zijn, zoo als men buiten dien ziet, alle handgreepen onnoodig, om dat de voorkomende navelstreng geen hinder aan de geboorte kan toebrengen.

Gebreken aan den moederkoek.

Het grootste gebrek aan den moederkoek ontstaat door zijne ligging; zijne alte groote, of alte weinige vasthechting.

De natuurlijke vasthechting of plaatfing van den moederkoek, moet op den bodem der baarmoeder zijn: dezelve moet niet vóór de geboorte losgaan, en naa de geboorte niet zitten blijven: is de bedoelde vereeniging met de baarmoeder te zwak, zoo wordt hij te vroegtijdig voo., of in de geboorte losgetornd, en geeft dan aanleiding tot het gevaarlijkste van alle toevallen, tot eene dikwijls doodlijke bloeding; zoo hij daarentegen met de baarmoeder vast vereenigd is, kan hij niet naa de geboorte losgaan, en geeft dan tot andere gevaaren aanleiding.

Wij zullen de gebreken aan den moederkoek in de volgende drie afdeelingen beschouwen: zij zijn,

- 1) Het voorkomen van den moederkoek.
- 2) Het vasthechten van denzelven buiten den bodem der baarmoeder.
- 3) Het terugblijven van den moederkoek naa de geboorte.

Het voorkomen van den moederkoek.

De moederkoek kan zig op het binnenste vlak van den baarmoedersmond zoo vast hechten, dat hij den verwijden mond der baarmoeder, geheel of voor een gedeelte, opvult.

Het eerste noemt men, de *volkomene*, en het laatste de *onvolkomene* voorkoming van den moederkoek.

Het eerste geval is voor een ten besten staand hoofd des kinds onmogelijk, om verlost te worden; en als men niet eilings te hulp komt, zoo is de stroomswijze bloedvliet gewis doodlijk: in het tweede geval is de geboorte natuurlijker wijze mogelijk: daar hier de vloed maar half zoo sterk is, is het gevaar ook maar half zoo groot, om dat de geboorte voordgaat.

Wij zullen des beginnen bij het treurige en schrikvolle geval, als naamlijk de geheele moederkoek op het inwendige vlak van den baarmoedersmond ligt, en voorkomt: de tekens daarvan zijn met zekerheid en gemakkelijk te onderscheiden,

1) In de laatste maanden of weeken der zwangerheid, komen dikwijls kleene bloedvloeijingen te voorschijn, die door rust in het bed weder bedaaren.

2) Voelt men aan den mond der zwangere baarmoeder, zoo vindt men niet dat de uitgezette hals in deszelfs rondte, met een hard ligchaam is opgevuld, gelijk bij de natuurlijke hoofdgeboorte; maar men voelt den geheelen hals der baarmoeder zacht, als of dezelve met eenen spons opgevuld ware.

3) Zodra de weeën den mond der baarmoeder beginnen te verwijderen, beginnen de bloedvloeijingen ook weder heviger te worden, voornaamlijk neemt men onder iedere vlaag eenen bijzonderen stroom waar (*)

(*) Door deezen vermeerderden stroom des bloeds onderscheidt men gemakkelijk dit geval van die, waarin de moederkoek niet over den mond der baarmoeder, maar op de gewoonlijke plaats in de baarmoeder zit: want bij alle de andere bloedvloeijingen der baarmoeder neemt men onder de vlaagen geenen vloed waar, om dat door deeze het hoofd sterker in den baarmoedersmond ingeperst wordt, en de weg tot het bloedontlasten daardoor wordt toegestopt, waarvan men hier het tegendeel vindt.

4) Onderstaat men de vrouw onder de vlaag, zoo neemt men duidelijk waar, dat er geen water in den mond der baarmoeder groeit; in plaats van dit voelt men een zacht sponsachtig ligchaam, 't welk den geheelen baarmoedersmond opvult.

5) Ten laatste wordt de bloedvliet ook buiten de vlaagen aanmerkelijk; de vrouw sterft, door het groote verlies van bloed, in stuipen, al is somtijds de bloeding reeds bedaar, om dat de baarende vrouw uitgeput is. (*)

Als men des uit deeze tekens heeft waargenomen, dat de koek op den mond der baarmoeder geplaatst is, moet men de vrouw koude stovingen op den buik leggen, en inwendig de *tinct: cinamom* geeven, op dat de vloed wat bedaar, en ook deeze zaak niet langer aan de Natuur overlaten, dan tot dat de mond der baarmoeder zig zoo verwijd heeft, dat men, zonder geweld, twee vingers en den duim in denzelven kan brengen; wacht men te lang, zoo vloeit, met het bloed, het leven der vrouwe en van haar kind weg: ondertuschen dient men te weten, dat de hand des Vroedmeesters, door een geweldig verwijderen van den nog naauw zijnde baarmoedersmond, de vrouw stuipen of eene inscheuring veroorzaakt: bij vrouwen, wier baarmoedersmond slap is, heeft men dit niet te vreezen; maar daar dezelve gespannen en hard op het gevoel is, zijn dergelijke toevallen zekerlijk te verwachten: voor het overige heb ik waargenomen, dat op die plaats waar de baarmoedersmond hard en dikker te voelen was, de koek vaster zit; maar daar deeze op het gevoel dun was, zat hij minder of geheel niet meer vast; dit is alzoo de plaats, waar de Vroedmeester de hand in het hol der baarmoeder moet brengen.

Het grootste voordeel dat men in de verlossing van zulk eene ongelukkige moeder heeft, is het nog aanwezende water, 't welk het keeren te ligter maakt.

(*) Dit is de vreeslijkste bloeding van allen, indien noch de vermogens der Natuur, noch de geneesmiddelen in staat zijn te werken; alleenlijk kan hier de hand des Vroedmeesters het behoud zijn: want hier heeft het voorbeeld plaats, waar in de Vroedmeester geen onderdanige dienaar der Natuur kan wezen.

Dit keeren van het kind en de aflossing van den koek moet op de volgende wijze geschieden. (*)

1) Men brengt de hand door de schede tot aan den mond der baarmoeder; hier onderzoekt men met den vinger, waar de koek 't minst aan den baarmoedersmond vastzit, en aldaar begint men dan den koek wat omhoog te schuiven: nu lost zig dit gedeelte zeer gemakkelijk van den baarmoedersmond af — heeft men nu zoo veel daar van losgemaakt, dat men de hand tusfchen denzelven in den baarmoedersmond kan brengen, zoo gaat men met dezelve daar in, breekt de vliezen met de vingers, onderzoekt de ligging des kinds, en deeze moge natuurlijk, of tegennatuurlijk zijn, men keert hetzelfde, om tot de voeten te komen, en bij deeze het kind naar buiten te brengen.

Als het kind geboren is, zoo volgt ook meestal de nageboorte van zelve; of men brengt de hand weder in de baarmoeder, om dezelve los te maaken, en buiten te brengen, 't welk zelden noodig was, om dat zij door het uithaalen van het kind, behalven dat genoeg losraakt, en de bloeding dan van zelve ophoudt: bij dit keeren moet een Vroedmeester, met standvastigheid en kundigheid, in eenen korten tijd, en zonder zijne hand, als dezelve in de baarmoeder is, uittahaalen, om het geheele keeren te volbrengen, zig alle moeite geeven; want daarvan hangt het geluk der verlossinge af, dewijl onder het losmaaken van den moederkoek, de bloedvliet sterker wordt, om dat naa het breeken der vliezen, het water afloopt, en dus het keeren moeilijker en vertraagd wordt, hetwelk schielijk gedaan moet worden.

(*) Ik heb dit vreeslijke toeval in twee jaaren zesmaal, maar nooit zonder ontroering en angst gezien: in het eerste geval was de vrouw, bij mijne komst, reeds door het afvloejen van veel bloeds koud geworden, en is eenige minuten daarnaa gestorven: in het tweede geval werd de keering door eene Vroedvrouw gedaan, en de lijderes stierf onder de stuipen, ofschoon noch de zwakte noch de bloeding zeer groot ware: in het derde en vierde geval deed ik zelf de keering: in 't eens geval is de vrouw in 't leven gebleven; in het tweede is zij den negenden dag naa de geboorte door zwakte gestorven, ofschoon de bloeding geheel bedaard ware: de laatste twee gevallen zijn mij gelukt, zoo dat ook in het laatste het kind nog levendig ter waereld is gekomen: in de vijf overige gevallen waren de kinderen dood; daar in alle deeze gevallen het water nog niet weg vloede, heb ik de verlossing zeer gemakkelijk, en in een korten tijd, dat is, in eenige minuten, verricht.

Er is nog een geval te beschouwen over het op de helft voordkomen des koeks, naamlijk dat is, wanneer de verwijde baarmoedersmond op de helft door den koek, en op de helft door de vliezen bedekt wordt, en opgevuld is.

Bij deeze omstandigheid heeft juist geene zo vreeslijke bloeding plaats, en men kent dezelve zeer gemaklijk door het onderzoek.

Men kan dit geheel aan de Natuur overlaaten, als het kind een goede ligging heeft, en ook goed in de geboorte treedt; want het voorkomende hoofd drukt zeer gemaklijk het deel des koeks op de zijde; en de bloeding wordt hierdoor ook verminderd: ik heb deeze geboorte door de Natuur gelukkiglijk zien eindigen.

Het vasthechten van den moederkoek buiten den bodem der baarmoeder.

Men heeft den moederkoek buiten zijne rechte plaats, naamlijk den bodem der baarmoeder, ook in het voorste, achterste, linker, en rechter zijdelijke gedeelte der baarmoedersholte, vastzittende gevonden: de slechtste plaats is die, als dezelve zig recht op het binnenste vlak van den baarmoedersmond vasthecht: dit geval heet het voordkomen van den moederkoek; de Vroedvrouwen noemen het eene uitzakking des koeks, om dat zij gelooven, dat dezelve eerst onder de geboorte op den baarmoedersmond zakt, en zig dan vasthecht: de andere vier soorten kunnen tot eene kwaade ligging der vrucht, tot het scheeffstaan der baarmoeder, en het losgaan van den moederkoek zelve, naa de geboorte, aanleiding geeven: van de hulp in alle deeze gevallen is reeds ter behoorelijke plaatse gesproken.

Het terugblijven van den moederkoek naa de geboorte.

Hier over hebben wij in het eerste Deel, reeds breedvoerig gehandeld.

De gebreken aan de vliezen.

De tegennatuurlijke gesteldheid der vliezen, die de vrucht omkleeden, is zeer weinig, echter kunnen deeze eene ophouding der geboorte veroorzaaken; hiertoe behooren de alte groote dikte, en zoo ook de dunte derzelve.

De dikte der vliezen.

Somtijds neemt men waar dat het hoofd des kinds, zonder eene verbreeking der vliezen, tot aan den uitgang der schaamte geperst wordt: men voelt hier eene bijzondere dikte der vliezen, als of zij van perkament waren, en zoo taai, dat men ze dikwijls met de nagels der vingers niet kan breeken: hierom moet men in alle gevallen, daar men de vliezen tusfchen de schaamlippen zien kan, dezelve met de fchaar stuk maaken, om het hoofd eenen gemaklijken weg te baanen: deeze dikte der vliezen neemt men zeldzaam waar; zelfs bij de honderd vrouwen naauwlijks één, en hier maakten zij alleenlijk aan den uitgang des bekkens een hinder aan het hoofd: een tweede geval kan zig door de dikte der vliezen openbaaren, als naamlijk het geheele vliezige ei met het kind, den navelstreng en den koek uitgeperst wordt; hier moet men ten eerften het ei openen, en het kind daaruit neemen, op dat het dan adem kan haalen.

De dunheid der vliezen.

Als de blaas der vliezen in den baarmoedersmond voorkomende, te dun en teder is, breekt dezelve in het begin der geboorte: heeft het hoofd den baarmoedersmond nog niet geheel opgevuld, zoo laat deeze het vocht langs denzelven uit de baarmoeder heen sluipen; het kind blijft dus als het ware droog liggen, en de baarmoeder kan zig over de ongelijke ledemaaten en ligchaamsvlakten niet zoo gemakkelijk samentrekken, als over de, op ieder punt, gelijke vlakten der met vocht opgevulde huid, die het kind houdt; des zijn dergelijke geboorten langzaamer en moeilijker.

De gebreken van het lamsvocht.

Als de menigte vochts hetwelk 't kind omgeeft, buitengewoon groot, of te klein is; zoo heeft men, bij eene anders natuurlijke geboorte, ook eenige hinder waargenomen.

De alte groote hoeveelheid van het lamsvocht.

Als zig door eene of andere oorzaak, in de bevruchte baarmoeder, eene bijzonder grootte hoeveelheid van vocht ophoopt, wordt de baarmoeder over 't geheel sterk uitgezet; dit uitzetten verzwakt haare elasticiteit, even als de te groote menigte van pis de blaas verlamt: de buik is in dit geval buitengewoon groot: ontlast zig in den beginne der geboorte niet aanstonds eene grootte hoeveelheid van vocht uit de baarmoeder, dan hebben de weeën geene groote kracht om op denzelven te werken, om dat zij zig weinig kan samentrekken: hier moet

de Vroedmeester of de vliezen zelven breeken, of zijn zij gebroken, en belet het inkomende hoofd het afvloejen derzelven, zoo moet men het hoofd, doch in eene rechte lijn, wat omhoog schuiven, om naast dezelve een gedeelte vochts afteleidén; doch dit afleiden moet niet op ééns, maar in herhaalde keeren gedaan worden: op den buik legt men doeken, natgemaakt met warmen rooden wijn, of met azijn en water, ook kan men denzelven wrijven met gewierrookte doeken, en inwendig de *tinctur: cinam:* laten gebruiken, op dat de flappe baarmoedersmond niet door eene bloedvliet, of iet anders, overvallen worde.

De vermindering van het lamsvocht.

Sommige Vroedvrouwen getuigen, dat er kinderen zijn, die geheel geen water bij zig hebben: dan ik heb dit in omtrent duizend geboorten niet een eenige keer waargenomen, en begrijp er ook de mogelijkheid niet van.

Sluipt het water vóór de geboorte, door de eene of andere oorzaak, uit de baarmoeder, zoo trekt deeze zig om het kind, als een handschoen over de hand, samen, en in dit geval worden de natuurlijke geboorten zwaarder, en het keeren, dat bij een tegennatuurlijke ligging moet gedaan worden, is in dit geval voor de Vroedmeester zwaarder: ik herhaal nog eens, als het keeren noodig is, zoo moet dat zonder tijdverzuim gedaan worden, bij het nog staande water, om dat het dan nog gemaklijk is. (*)

(*) Ik werd bij eene vrouw geroepen, waar ik waarnam, dat het kind met de armen voorkwam, het welk ik in tien minuten, om dat het water nog tegenwoordig was, door het keeren, gelukkig verlost: bij de tweede geboorte werd het water door de Vroedvrouw gebroken, en ik werd geroepen, daar ik het kind weder met den arm voelde voorkomen: ik had een vol half uur noodig om het te keeren: hieruit is klaarlijk bewezen, wat de tegenwoordigheid, of het niet aanwezig van het lamsvocht, kan veroorzaaken, om dat bij deeze tweede geboorte, dezelfde ligging en grootte van het kind, dezelfde grootte van bekkenwijdte, en dezelfde hand van den Vroedmeesters tegenwoordig was.

Is in de geheele zwangerheid te weinig waters in de baarmoeder, hetwelk uit de eene of andere oorzaak kan geschieden, zoo kan dit verminderen op eene andere wijs schadelijk worden: RÖDERER geloofst, dat een gebrek van het lamsvocht het kind in zijne langzaame keering op het hoofd verhinderen, en eene stuitligging of wel geheel eene tegennatuurlijke ligging veroorzaaken kan.

De gebreken aan de ligging des kinds.

Zonder twijfel ontstaat het gebrek eener moeilijke of tegennatuurlijke geboorte ten opzichte des kinds, meest uit de kwaade ligging.

Als het kind zulk eene ligging in de baarmoeder heeft, waarin het door de Natuur bezwaarlijk of geheel niet geboren kan worden, zoo wordt hierdoor de geboorte zwaarder of tegennatuurlijk: er is geen punt aan de geheele oppervlakte des kinds, waar hetzelfde in de geboorte niet mede kan voorkomen: om dus eene naauwkeurige kennis van de ligging te hebben, moet men alle liggingen die een kind in de baarmoeder kan aannemen, naauwkeuriglijk beschouwen: dit zullen wij doen, naa wij te vooren van de kwaade ligging in het algemeen, en de daartoe dienende hulp, naamlijk de keering, gesproken hebben.

De kwaade ligging in het algemeen.

Men kan de ligging des kinds in 't algemeen, zoo als de geboorte, in eene natuurlijke of ligte, in eene zwaare of moeilijke, en dan in de tegennatuurlijke verdeelen.

De natuurlijkste van alle liggingen, waarin het kind door de Natuur op het gemaklijkste door het bekken heen geperst kan worden, is die, als de kruin des kinds

Zoo in de as van het bekken komt, dat het kind met het aangezicht naar het heiligbeen toe staat.

Alle overige liggingen die hier van afwijken, veroorzaaken reeds eene zwaare, of wel eene tegennatuurlijke geboorte; men noemt ze daarom moeilijke liggingen, om dat de Natuur in deezen de geboorte wel kan vol-eindigen, maar echter niet zonder veel moeite en gevaar voor moeder en kind: dergelijke zijn bij voorbeeld, als 't kind met het aangezicht tegen het schaambeen staat, of met hetzelfde in de geboorte treedt; of als het met den stuit of met de voeten voorkomt, (*) door welke liggingen de geboorte langzaam voordgaat, en somtijds eenige kunsthulp behoeft.

Maar tegennatuurlijk noem ik alle liggingen, waarin het kind door de Natuur geheel niet, maar alleenlijk door de kunst, door het keeren of door instrumenten, moet verlost worden.

De kunstige keering van een kind.

Eene keering noem ik dien kunstigen handgreep, waar door een kind met de voeten in den baarmoedersmond, en vervolgens ter wereld gebragt wordt; want alle geboorten, door keering, moeten op deeze wijze gedaan worden.

In 't algemeen is het keeren noodig.

1) Als het kind eene ligging heeft, zoo dat het door de Natuur niet verlost of geboren kan worden; want

(*) In het algemeen hebben de Schrijvers de hoofd- stuit- en voet-geboorte onder de Natuurlijke verlossingen geteld, als de kinderen naamlijk zoo voort- men, dat het aangezicht naar 't heiligbeen gekeerd is; dan daar de Natuur zeldzaam de stuit- en voet-geboorte geheel alleen volbrengt, maar het voorkomende kind meestal slechts tot op het hoofd uitperst, en des het hoofd met de borst uit het bekken moeten verlost worden; (zelfs heb ik dit bij zeven- en agt-maands kinderen moeten doen;) zoo zijn de geboorten half natuurlijk en half tegennatuurlijk; dat heet; zij moeten half door de kunst, en half door de Natuur volbragt worden: alzoo kan men deeze geboorte, gemeend, of zwaar tegennatuurlijk noemen: ik houde alleenlijk de eenige kruingeboorte, waarbij het aangezicht naar het heiligbeen toe staat, voor eene gemaklijke en natuurlijke geboorte.

zonder wezentlijke noodzaakelijkheid mag men geen kind keeren; (bij voorbeeld, niet om zig te oefenen;) om dat de geboorte door het keeren, voor de vrouwen zeer pijnlijk is, en het kind door het drukken van den navelstreng, in levensgevaar komt.

2) Als de baarmoeder volkomen scheef staat.

3) Als de uitgezakte navelstreng vóór, of om het hoofd des kinds, niet meer terug gebragt kan worden, en het kind nog leeft.

4) Als er eene bloedvloeijing door den voorkomenden koek, of

5) Als er eene stuiptrekking met eenen verwijden baarmoedersmond aanwezig is.

Voor het overige behooren nog tot de keering de volgende voorwaarden:

1) Dat de mond der baarmoeder zig reeds geopend hebbe, wel niet in zijn geheel, echter voor het minste zoo veel dat men met drie vingers van de hand, door denzelfden heen, in de baarmoeder kan komen, doch langzaam, en zonder eenig groot geweld aan te doen; het is niet geoorloofd den mond der baarmoeder met geweld te verwijden, om dat daardoor eene scheuring, bloedvliet, stuipen, of sterke ontsteeking ontstaan kan.

2) Dat het kind voldragen, of in de laatste maanden zij; want vier- of vijf-maands kinderen, of ook wel ouder, en bijzonderlijk die tot bederf overgegaan zijn, gaan, in meest alle liggingen, weg.

3) Dat er nog mogelijkheid zij om te keeren: onmogelijk is de keering, als het bekken te naauw is, of als het hoofd of de stuit geheel en al in het bekkenhol staat; want in dat geval kan men het hoofd onmogelijk meer in de baarmoeder terug brengen; men moet het des met de tang verlossen; maar den stuit, op eene wijs die wij in het vervolg zullen zien.

4) Dat men de ligging des kinds, door het onderslaan, en 't gevoel van het deel dat in den baarmoedersmond gekomen is, en door de beschouwing en 't gevoel van den buik vóór het keeren, wel moet beraadlaagen en kennen,

5) Dat men het kind moet keeren aanstonds naa het breeken der vliezen, of als men zelf de vliezen gebroken heeft.

6) Dat men de vrouw bij iedere keering, dwars over het bed op den rug moet leggen, ten einde zij met het bekken hoog, maar met de lendenen laager ligge.

De gemaklijkste ligging van hoogte is die, dat de vrouw zoo hoog ligt, dat de schamelheid met den omtrek der navel van den Vroedmeester gelijk sta: aan het hoofdeneinde der baarende vrouwe zet zig eene helpster op het bed, die het hoofd der vrouwe in haaren schoot laat rusten, en daarnaa het lijf vasthoudt, op dat hetzelfde zig niet beweëge, of de vrouw in 't geheel van 't bed valle: de voeten der baarende vrouwe moeten op twee stoelen gezet worden, en van een tweede helpster laat men de knieën van elkander houden: op zulk eene wijs plaatst de Vroedmeester zig tusschen de deien, en verricht de keering staande.

7) In alle gevallen waarin men de voeten des kinds boven het schaambeek der moeder moet zoeken, moet men de vrouw op de knieën en elleboogen laten rusten, wanneer de zijdelingsche ligging niet voldoende is.

8) Dat als men de voeten zoeken wil, men nooit langs den rug, maar altoos met de hand over het aangezicht, de borst, en den buik des kinds, moet gaan; ook nooit de voeten over den rug des kinds moet trekken, om dat men daardoor de deien en de ruggegraad van het kind zoude verplaatsen of breeken; want zulk een kind komt lam ter wereld, en sterft spoedig.

9) Dat de Vroedmeester, bij het voorkomen der handen of voeten, altoos de vlakte van zijne hand, die ter onderzoekinge dient, langs den binnenkant van dit deel brenge, om daarmede omhoog te gaan; dewijl, als men langs de buitenzijde naar het kind gaat, men altoos op den rug, en niet op de voorste vlakte van het kind komt.

10) Dat men altoos de hand meer naar het kind drukke, dan naar de binnenzijde der baarmoeder.

11) Dat, als men een voorkomend deel van den baarmoedersmond moet terug schuiven, men altoos van bui-

ten de baarmoeder tegenhoude, ook in het terug brengen geenig geweld uitoefene, ten einde de baarmoeder niet van de schede te scheiden, zoo als ik eens waargenomen heb dat eene Vroedvrouw gedaan had.

12) Dat men onder de weeën nooit moet werken, en ook de vrouw verbiede om te persen: al wierde onder de weeën den mond der baarmoeder verwijd, zoo wordt echter staande de vlaag, het kind en de hand van den Vroedmeester naar buiten geperst.

13) Dat men alleenlijk den rug der hand met vet besmeere, om dat, als men de hand ook van binnen besmeert, zij te glad en glibberig wordt, en geduurig afgleidt van het deel dat men naar zig wil trekken.

De hand brengt men op de volgende wijze in de baarmoeder: eerst brengt men den wijs- en middensten vinger langzaam in de schede, dan den derden, op het laatste den vierden; heeft men de vingers nu samen gebragt, alzoo dat zij eene soort van kegel vormen, zoo moet men den duim tussehen dezelve verbergen, en dusdanig met de geheele hand, boorender wijze, in de schede gaan: is men met het breedste gedeelte daar in gekomen, zoo begint men op gelijke wijze om met de hand uit de schede in den mond der baarmoeder, naar derzelver holte, te komen.

Nu is het zelden dat de vrouwen over groote pijnen klaagen, want de grootste pijn gevoelen zij, als men juist met het breedste gedeelte der hand, door den ingang der schede, en door den mond der baarmoeder, gaat.

Eindelijk is nog aantemerkten, dat men vóór het keeren van 't kind, het voorkomende deel doope, wanneer het vereischt wordt, zoo er anders geen zeker teken van deszelfs dood aanwezig is.

Dit is de inhoud der algemeene regelen, die in het keeren moeten waargenomen worden; de bijzondere regels zullen wij bij iedere keering, des noodig, in overweeging neemen.

Om dit keeren van een kind te leeren, kan men zig bedienen van een lederen pop, die de natuurlijke grootte heeft: met deeze oefent men zig in 't bekken van eene

vrouwe-geraamte, of in eene alzoo gemaakte machine : heeft men nu een begrip van de keering in een open bekken , zoo kan men zig in de genoemde machine oefenen, in dier voegen dat een ander het kind moet leggen, zonder dat de leerling het zie: deeze machine wordt van hout gemaakt, met paardenhair opgevuld en met leder bekleed; zij verbeeldt eene baarende vrouw in haare natuurlijke grootte: de baarmoeder zelve moet van leder zijn, om dat zij dan onder het keeren geduurig samengedrukt kan worden: het bekken moet de wijde en juiste gedaante hebben van een natuurlijk vrouwe-bekken.

Nu zullen wij alle liggingen, die een kind in de baarmoeder kan aanneemen, in haare gevolgen beschouwen, en bij iedere ligging in 't bijzondere haare kentekens, werkingen, en geschikte hulp aantoonen: om dat alle keeringen van het onderste gedeelte naar het hoofd gemakliker zijn, en daarentegen allen moeilijker, als het hoofd naabij den mond der baarmoeder geplaatst is, zoo zullen wij alleenlijk tot die liggingen overgaan, die de moeilijksten zijn, en dezelve van het hoofd tot de voeten, in bedenking neemen.

Men moet hier aanmerken, dat iedere geboorte haare naamen heeft ontleend, van dat deel van 't ligchaam des kinds, hetwelk 't eerste in den mond der baarmoeder voorkomt: bij voorbeeld; is dat deel het hoofd, zoo heet het de *hoofdgeboorte*; is 't den buik, de *buikgeboorte*; is 't de arm, de *armgeboorte*, enz., ook is 't voor een algemeenen regel te houden, dat ieder deel, 't welk in de geboorte komt, vierderleie liggingen kan aanneemen, met betrekking tot het overige gedeelte van 't ligchaam.

Het verlossen van een hoofd, hetwelk met den basis voorkomt.

In de verlossing bij de voeten, of bij de keering, waar het kind bij de voeten ter wereld gebragt wordt, kan het hoofd met zijnen basis op vierderleie wijzen in de geboorte komen, en wel 1) als de basis met het aangezicht naar achteren, naar het heiligbeen toe, schuin staat; of 2) als de basis met het aangezicht recht naar het heiligbeen gekeerd, in de geboorte ligt; 3) als de basis met het aangezicht naar het darmbeen gekeerd voorkomt, en 4) als de basis met het aangezicht naar het schaambeen gekeerd voorkomt: alle deeze gevallen hebben hunne eigene handgreepen, die men zoo veel te meer in aanmerkinge moet neemen, om dat zij dikwijls voorkomen.

In het eerste geval, waar de basis met het aangezicht naar achteren gekeerd, schuin naar het heiligbeen gekeerd voorkomt, is deeze ligging met den basis de beste en natuurlijkste; men moet alzoo de verlossing van het hoofd doen op die wijze als reeds gezegd is,

In het tweede geval, waar de basis met het aangezicht recht naar het heiligbeen gekeerd, voorkomt, laat het hoofd zig moeilijker verlossen, om dat de rechte afmeting van het bekken naauwer is, dan de schuine van de bovenste opening van het bekken, en het voorhoofd des kinds in zulk eene ligging door den voorberg des heiligbeens wordt tegengehouden: de Vroedmeester moet hier alzoo het hoofd uit de rechte in de schuine afmeting trachten te brengen, voords in den ingang van het bekken, en het dan heel naar buiten poogen te voeren.

In het derde geval, als de basis met het aangezicht naar het darmbeen gekeerd voorkomt, moet men slechts de armen van het kind losmaaken, en dan kan men

vervolgends het kind zelf op eene gemaklijke wijze ter wereld brengen.

In het vierde en laatste geval is het naar buiten brengen van het hoofd, wanneer naamlijk het aangezicht naar het schaambeen gekeerd is, moeijeliker, dan in de overige gevallen, om dat de kin des kinds in deeze ligging op den rand van het schaambeen zitten blijft, en als het hoofd nu niet klein, of het bekken niet wijd genoeg is, zoo is het naar buiten brengen des hoofds, altoos moeijelijk; men moet hier eenen vinger langs het schaambeen naar binnen en boven brengen, en het aangezicht des kinds door denzelven uit de rechte in de schuine afmeetinge poogen te brengen: als voords het achterhoofd wat omhoog gebragt is, moet men het kind naar beneden in het bekken drukken, tot dat het geheele hoofd naar buiten gebragt is.

Behalven deeze gevallen van hoofdgeboorten, moet men nog de andere soorten van hoofdgeboorten in 't oog houden: 1) als wel het hoofd met den basis natuurlijk komt, maar, door de grootte van het hoofd, niet door het bekken kan heengaan; 2) als de mond der baarmoeder door kramp wordt samengetrokken, en de basis des hoofds tegenhoudt; 3) als de basis wel natuurlijk ligt, maar de ingang of bovenste opening van het bekken te naauw is, en hierdoor de geboorte moeijelijk, of onmogelijk gemaakt wordt.

Is het hoofd, in 't eerste geval, te groot, of waterzuchtig, of verbeend, of dubbeld, of op eene andere wijs monstereus, alzoo dat de hand des Vroedmeesters, op geene wijze hoegenaamd, hetzelve uit het bekken kan brengen, zoo moet men alleenlijk letten of het kind nog leeft, dan reeds dood is.

Zoo 't nog leeft, het welk zeldzaam is, moet de geboorte door de tang, of door het klieven der schaambeenderen volbragt worden: is 't kind daarentegen dood, het welk men veelal in zulke zwaare geboorten ontmoet, zoo moet de verlossing door het ontlasten van de hersenen gedaan worden.

Maar zoo in het tweede geval, het verlossen van 't hoofd door kramp, in den mond der baarmoeder, verhinderd wordt, hetwelk men daaraan kent, dat de baarmoedersmond zig in de gedaante van eene gespannen koord vertoont, en het hoofd in de onderste opening terug houdt, zoo moet men de baarende vrouw pijnstillende middelen geeven, en haar de rust aanbeveelen, tot dat de kramp ophoudt, en het hoofd verlost kan worden; maar het kind sterft meestal onder deeze kramp, als dezelve niet bedaart, maar aanhoudt.

Het derde of laatste geval is als het kind wél natuurlijk ligt, maar het bekken der vrouwe te naauw is.

Houdt de rechte, of schuine afmeting vier duim Parijsche maat, zoo is de geboorte nog ligt en gemakkelijk; maar houden die afmetingen $3\frac{1}{2}$ of $3\frac{1}{4}$ duim, zoo wordt de geboorte, ja, wel zwaar, echter kan het kind nog in 't leven gehouden worden: 3 duim in de afmeting veroorzaakt een zwaare geboorte, met een dood kind.

In de afmeting van $2\frac{3}{4}$ duimen kan het hoofd des kinds niet zonder afscheuring naar buiten gebragt worden: hiervan daan is het, dat men zig bij een leevend kind bedient van de tang, of het doorklieven der schaambeenderen; maar is het kind dood, zoo bedient men zig van de kromme haaken.

In de afmeting van $2\frac{1}{2}$ of $2\frac{1}{4}$ duim kan de geboorte onmogelijk zonder ontlasting der hersenen voordgang hebben.

En is de afmeting twee duim, zoo wordt de geboorte insgelijks onmogelijk, als het hoofd niet van de hersenen onlast wordt, en het bekkeneel in stukken, door middel van de beentangen naar buiten gehaald wordt.

De afmetingen van $1\frac{1}{2}$ of $1\frac{1}{4}$ duim, laten geene keering toe; des kan het in stukken breken der vrucht geene plaats hebben, en de vrouw moet, als zij de verlossing door de keizerlijke snede niet wil toelaaten, sterven, zonder van de vrucht verlost te wezen.

Van de geboorte, waarbij de kruin voorkomt.

Als de kruin in den mond der baarmoeder inzakt, zoo kan het aangezicht tegen het heiligbeen, tegen het schaambeen, of tegen één der darmbeenderen gekeerd staan.

De eerste ligging geeft de gemaklijkste en natuurlijkste geboorte; de tweede ligging veroorzaakt eene zwaardere; maar de twee overigen veroorzaaken een, zonder kunsthulp naauwlijks mogelijke, geboorte:

Als de kruin in den mond der baarmoeder zakt, en het aangezicht naar het heiligbeen gekeerd is, noemt men deze geboorte; de natuurlijkste en ligtste van allen, om dat zij door de Natuur van zelve, zonder hulp van andere menschen, gedaan kan worden.

Deeze natuurlijkste ligging wordt gekend aan de volgende tekenen;

- 1) De buik der vrouwe is gelijkvormig rond.
- 2) De mond der baarmoeder opent zig in zijnen omtrek gelijk, en bij iedere vlaag iet meerder.
- 3) Het water groeit gelijkvormig, rond en hard op het gevoel, doch niet in die menigte, als of de stuit voorkwame.
- 4) Breekt het water, dan ontlast zig omtrent een groot kopjen vol op ééns, en verder niet meer, ook niet zoo sluipend, als wanneer het hoofd scheef staat.
- 5) Zoodra het water gebroken is, voelt men 't hoofd, hetwelk kenbaar is aan zijne rondte en hardheid: de fontanel des voorhoofds, welke in den beginne der geboorte nog niet overëengeschoven, en naar het heiligbeen gekeerd is, toont aan, dat het gezicht des kinds daarnaar toe ligt.
- 6) Bij iedere vlaag gaat het hoofd meer om hoog, en wordt het meer en meer puntiger.

Vindt men alzoo deeze kentekens, zoo kan men zeggen dat het hoofd natuurlijk ligt, en dat de geboorte

gemaklijk zal zijn, wanneer er anders geen gebrek aan het kind, aan deszelfs deelen, of ook niet aan de moeder plaats heeft.

Deeze geboorte vereischt het zelfde dat wij bij de natuurlijke geboorte bepaald hebben.

Wij zullen nu vervolgens de tweede ligging van de geboorte, als de kruin voorkomt, beschouwen, wanneer naamlijk de kruin in den mond der baarmoeder zoo komt te staan, dat het aangezicht naar de vereeniging der schaambeenderen gekeerd is.

In deeze ligging van de kruingeboorte zijn meest alle tekens der voorgenoemde kruingeboorte tegenwoordig: echter kan men dezelve uit de volgende tekens bijzonderlijk kennen.

1) De weeën persen het hoofd langzaam voord.

2) Men voelt de fontanel van het voorhoofd niet naar het heiligbeen toe, maar tegen de schaambeenderen.

3) Daar de fontanel, voor en naa overëengegeschoven en samengedrukt wordt, zoo dat men dezelve niet meer voelen kan, dan is het noodzaaklijk, dat men met de hand langs het heiligbeen omhoog gaat, om te onderzoeken, of het aangezicht, dan wel het achterhoofd, daar naa toe slaat: kan men nu onder het schaambeen naar de oogholten komen, zoo is de kennis van deze ligging des te zekerder.

4) Voelt men ook de overëengegeschovene naaden van het achterhoofd, aan het hoofd des kinds, tegen het heiligbeen aan, zeer duidelijk.

Deeze geboorte is wat langduuriger en ook zwaarder; echter kan dezelve door de werking der Natuur alleen volbragt worden: slechts de neus, de oogleden, en het aangezicht worden een weinig gekneusd, en door de schaambeenderen ontveld; hier van daan is 't dat het aangezicht van deeze kinderen blaauw wordt, door het uitgevaatte bloed, hetwelk door stovingen van witten wijn en dergelijke weder opgelost en verdeeld moet worden.

Deeze geheele geboorte kan men derhalven aan de Natuur alleen overlaaten, sommige Vroedmeesters geeven

den raad, om een paar vingers tusfchen de fchaambeenderen en het aangezicht te brengen, op dat hetzelfde niet gekneusd worde: dan, deeze handgreep is onnut, gelijk de ondervinding mij geleerd heeft.

Het derde en vierde geval van de kruingeboorte is, als de kruin zoo in den mond der baarmoeder staat, dat het aangezicht naar het rechter of linker darmbeen gekeerd is.

In den beginne der geboorte is het verfchil van dit geval met dat waarin de kruin natuurlijk voorkomt niet gemaklijk te onderscheiden; maar heeft de geboorte wat lang geduurd, en is het hoofd meer ingeperst, dan is het verfchil kennelijker geworden; naamlijk,

1) De weeën fchuiven of persen het hoofd in den beginne der geboorte gemaklijk en fchielijk voord, om dat het fmalfte gedeelte van hetzelfde in den kleinften diameter van het bekken geperst wordt:

2) Men vindt de voorfte fontanel nabij één der darmbeenderen; men kan met de hand langs het heilig- en fchaam-been gemaklijk hoog aan het hoofd komen.

3) Maar nu blijft het hoofd in den uitgang of de onderfte opening van het bekken op eens vast zitten, en vordert ook bij de fterkfte vlaagen niet met al, om dat het kind met de fchouders van vooren op het fchaambeen, en van achteren op den voorberg des heiligbeens staat en beklemd is: hoe gelijker nu het hoofd over dwars in het hol van 't bekken ingaat, hoe fterker en zekerder de fchouders hier op ftaan.

Daar in deeze ligging noch het hoofd noch de hals van het kind gedrukt wordt; kunnen deeze kinderen in dit geval zeer lang in 't leven blijven: ik heb voorbeelden van drie, en anderen hebben er van zes dagen gezien: hier moet men zeer voorzichtig zijn, omtrent het gebruik van fcherpe instrumenten.

Staat het hoofd van 't kind reeds in het bekkenhol, zoo kan men hetzelfde niet meer keeren: wordt men bij een nog niet gebroken water, of als het hoofd nog boven den ingang van het bekken is, deeze ligging gewaar,

zoo moet men het hoofd van den mond der baarmoeder zoeken terug te brengen, om de keering te doen, want deeze is in den beginne der geboorte gemakliker dan de herstelling, offchoon die al gemakliker blijke te zijn.

Men wordt meestal door de Vrouwen geroepen bij deeze geboorten, als het hoofd reeds te ver in het bekken is ingezakt, en met de schouders bekneeld is.

In dit geval moet men de hand tusfchen het hoofd en het heiligbeen, of langs het fchaambeen, tot den eerst vastzittenden fchouder, omhoog trachten te brengen, ten einde deeze wat op zijde te drukken: men maakt eerst dien fchouder los, welke het gemaklikste los gemaakt kan worden, het zij die op het fchaambeen, of die op den voorberg van het heiligbeen fta; want het is juist niet noodig alle twee te gelijk los te maken.

Het is ook juist niet noodig, om den fchouder geheel, tegen het zijdelingsche gedeelte van het bekken te brengen: het is genoeg, als zij maar eenen duim in de fchuinte gebragt wordt; om dat in deeze plaatfing de Natuur het overige van de geboorte volbrengt, zoo als ik verſcheiden keeren heb waargenomen.

Is het niet mogelijk de fchouders alzoo met de hand van het fchaambeen, of van den voorberg van het heiligbeen, aftebrengen; dan kan men eenen arm van de tang, of den hefboom boven of op den vastzittenden fchouder brengen, om door deeze de fchouders wat aftedrukken; is die handgreep niet toereikende, dan legge men de geheele tang aan, zoodanig, dat één arm over het aangezicht, en de andere op het achterhoofd te ftaan komt, zoo wordt door een zacht trekken aan het hoofd, de tegenftandbiedende fchouders los gemaakt; echter kan men met den hefboom dit beter en gemakliker doen.

Het scheefstaande hoofd.

Als het hoofd bij eene natuurlijke kruingeboorte niet recht, maar scheef in den mond der baarmoeder komt, dan is er wel eene natuurlijke, maar scheefstaande kruingeboorte te verwachten: dit scheefstaan van het hoofd veroorzaakt voor moeder en kind eene zwaare verlossing.

Hetzelve kan viervouwig zijn: als naamlijk de kruin niet rechtlijnig op den baarmoedersmond, maar op den rand van één der darmbeenderen, op de schaambeenderen, op de uitpuiling, of op den voorberg van het heiligbeen staat.

In dit geval komt het bovenste gedeelte van één der wandbeenderen, het voorhoofd, of het achterhoofdsbeen meerder dan de kruin voor.

Alle deeze scheeve liggingen kent men door het gevoel, door het sluipende water, door de langduurige geboorte maar meest naa de verlossing, als men aan het hoofd des kinds een miskleurig gezwel waarneemt, hetwelk niet op den kruin, maar vóór of achter, of op zijde, van hetzelve geplaatst is.

Somtijds neemt men naast dit gezwel, daar het hoofd op geltaan heeft, een kuil in het bekkeneel waar, dat bij de kinderen week, en bijna kraakbeenig schijnt te zijn.

Men moet het scheefstaan van het hoofd wel van het scheefstaan der baarmoeder onderscheiden: dit kan door het gevoel geschieden.

Laat men het scheefstaan van het hoofd aan de Natuur over, zoo is de geboorte langduurig, het kind blijft lang in het bekken vastzitten, en krijgt hierdoor een mismakkt scheef hoofd; en als het indrukken zeer sterk is, zoo kan daardoor ook nadeel veroorzaakt worden.

Men moet dus in dit geval de baarende vrouw, als bij het scheefstaan der baarmoeder, eene tegenoverhelende ligging geeven, daar het hoofd staat, ook kan

men eene hand in de schede brengen, en eenige vingers tusschen het hoofd en die plaats, waar hetzelfde op staat, steeken, om hierdoor het hoofd daar af, en in de as van het bekken te drukken: anderen willen deeze afdrukking, of met eenen arm van de tang, of met den hefbeen verrichten: met den hefboom is zulks gemaklijk te doen, als men denzelven tracht intebrengeu, waar de meeste tegenstand is, en vervolgens met de andere hand het hoofd ondersteunt, en dan met den hefboom, overeenkomstig zijnen naam, werkt, dat is, het hoofd opligt om hierdoor, en door de andere hand hetzelfde tevens te draajen, dat het natuurlijk te liggen komt, en dan de geheele verdere verlossing aan de Natuur overlaaten.

Als er kinderen met een mismaakt scheef hoofd ter wereld komen, dan bemoejen de Vroedvrouwen zig, dit scheefstaan en de daarbij zijnde indrukking te herstellen, (zoo als zij zig verbeelden) en het gelijkvormig te drukken; maar van deeze geweldige en lompe behandeling van het hoofd, heb ik de nadeeligste gevolgen gezien; ja zelfs de dood, bij een kind hetwelk naa de verlossing eerst zeer wél was.

De kunstige herstelling is onmogelijk, om dat wij niet weeten, hoe eigenlijk het hoofd van gedaante moet zijn: ik heb met veel verwondering gezien dat dergelijke hoofden, die scheef waren, zig in eenige dagen alleenlijk door de Natuur herstelden, en men kon van het indrukfel niets meer waarneemen; bij sommigen is deeze mismaaktheid levenslang bijgebleven.

Het insakken van 't hoofd met een ander gedeelte van het ligchaam.

Het hoofd kan in zijne natuurlijke ligging, zonder eenig gebrek te hebben, met een ander deel in den mond der baarmoeder insakken, 't zij een der bovenste, of een der onderste leden: de navelfstreng en de koek zijn

eigenlijk die deelen, welken wel eens met het hoofd inzakken : naa dat nu deeze deelen in staat zijn om de goede ligging en voordpersing van het hoofd niet te verhinderen, zoo wordt ook de geboorte weinig of geheel niet verhinderd : men zal des uit het gezegde, of uit het geen nog zal gezegd worden, reeds besluiten, of zulk een ingezakt deel kan weggebragt, dan wel alleenlijk aan de Natuur overgelaten moet worden.

De geboorte van het aangezicht.

Als het kind met het aangezicht in den baarmoedersmond dusdanig inzakt, dat het voorhoofd op het eene en de onderkaak op het andere bekkebeen staat, zoo wordt dit eene aangezichts-geboorte: het aangezicht kan op vierderleie wijze inzakken, en ieder van deeze kan twee graaden hebben.

De eerste ligging is die, als het aangezicht zoo inzakt dat het voorhoofd op den rand der schaambeenderen, doch met de onderkaak en de borst des kinds over den voorberg, of de uitpuiling van het heiligbeen gebogen ligt.

De tweede ligging van het aangezicht is die, als in tegendeel hetzelfde en het voorhoofd op de uitpuiling van het heiligbeen, maar met de onderkaak en de borst boven de schaambeenderen, tegen den buik der moeder aan ligt.

De derde en vierde ligging van het aangezicht is, als hetzelfde en het voorhoofd op één der darmbeenderen, en de onderkaak en de borst des kinds op één der tegenovergestelde zijden der darmbeenderen staat.

Men kent in 't algemeen, dat het aangezicht ingezakt is, en ook tegen welk gedeelte of zijde van het bekken, uit de plaatsing van de onderkaak en het voorhoofd.

Men onderscheidt de opening van den baarmoeders-

mond van dat open, waar de stuit voorkomt, door de grootte; door de zich beweevende tong; door de afwezigheid van het uitvloeyende *meconium*, maar meest door de bij zig hebbende deelen, als den neus en de oogen.

De Vroedvrouwen hebben eenen kwaaden regel, zoo zij alle vier de liggingen van het aangezicht van zelven door het bekken willen laten heengaan: bij de eerste en tweede ligging gaat dit somtijds wel goed; doch met groot gevaar voor 't kind, en nog bezwaarlijker voor de moeder; bij de derde en vierde liggingen van het aangezicht blijft het kind zekerlijk vastzitten, als hetzelve zijne natuurlijke grootte heeft; bij deeze laatste liggingen van het aangezicht, moet het kind noodzaaklijk gekeerd worden; de eerste en tweede ligging kan men herstellen, zoo het voorhoofd niet te veel opstaat; anders is hier ook het keeren noodig.

Laat men hier het kind zonder het te herstellen meer in- en door-zakken; dan wordt het gevaarlijk, langduurig en pijnlijk, zoo wel voor vrouw als kind.

Wordt niet zeer veel moeite eene aangezichts-geboorte wel eens door de Natuur volbragt, zoo neemt men tog altoos waar, dat bijnaa de meeste kinderen dood zijn, of zeer zwaklijk geboren worden; het geheele aangezicht is blaauw of zwart opgezet; de neus is als het ware ingedrukt; de lippen en oogen puilen naar buiten uit, en als deeze kinderen, hoewel zwak, echter leevendig ter wereld komen, zoo gaat de mis-keurigheid en zwelling wel, naa verloop van een paar dagen, over, bijzonderlijk door oplosfende stovingen; maar alle kinderen, die door deeze ligging eene zwaare geboorte ondergaan hebben, houden het hoofd echter niet recht op, maar laten hetzelve achterover hangen, om dat in deeze geboorte de spieren aan den hals, en de banden der halswervelen, verzwakt, of uitgerekt worden.

Wanneer zulk eene geboorte soms geenen voordgang heeft, zoo beginnen de Vroedvrouwen wel bij het een of ander deel van het kind te trekken; hierdoor worden de oogen als ook het geheele aangezicht, wel eens

elen.

elendig bekrabt; somtijds trekken zij, in den baarmoedersmond, aan de daarin gezakte onderkaak, waar door deeze wel eens ontwrigt, en dikwijls in haar midden vanëen getrokken wordt; en als de Vroedvrouw aan den hals van 't kind trekt, gebeurt het dat zij hetzelve, in den eigenlijken zin, den nek breekt.

Uit dit alles blijkt nu, dat men niet iedere geboorte des aangezichts, naar de gewoonte der Vroedvrouwen, aan de Natuur alleen moet overlaaten; maar men moet eerst wèl beschouwen, in welke ligging het aangezicht inzakt; in welken graad het voorhoofd staat; hoe wijd het bekken is; de grootte van het hoofd, en hoe de weeën zig tot de geboorte verhouden.

Is het kind, en des ook het hoofd, klein, of is het bekken wijd, en staat het voorhoofd maar weinig voor- of achter-waards omhoog; heeft de vrouw sterke en krachtige vlaagen, zoo kan men de geboorte aan de Natuur overlaaten; maar vindt men het tegendeel deezer bepaaling, zoo moet men trachten het hoofd wèl te plaatsen, of, is dit niet mogelijk, dan ten eersten het kind keeren, als dit nog geschieden kan.

Het eerste geval, 't welk het meest wordt waargenomen, als naamlijk het kind met het aangezicht zoodanig inzakt, dat het voorhoofd boven de schaambeenderen, en de onderkaak op de uitpuiling of den voorberg van het heiligbeen staat, zoo legt men de vrouw dwars over het bed, in diervoegen, dat zij met het bekken, door onderligging van matrasen of kussens, zeer hoog ligt: als dan zakt het kind meer naar het bovenste gedeelte der vrouwe, en ook naar den bodem der baarmoeder, en men kan de hand des te gemaklijker naar binnen brengen.

Nu brengt men eene hand langs het heiligbeen over het aangezicht, tot aan de borst naar boven, of men legt de borst zoo veel mogelijk omhoog, en laat ten gelijken tijde van buiten, door eene andere hand, boven het schaambeen den buik inwaards drukken; op die wijs brengt men dikwijls het hoofd in zulk eene lig-

ging, dat hetzelfde meer met het voorhoofd en de kruin recht naar beneden inzakt: nu brengt men de hand weêr naar buiten, en laat de geheele doorzakking van het kind aan de Natuur over.

Onder deeze bewerking moet men de vrouw alle persing verbieden, en desniettegenstaande, mislukt het dikwijls evenwel.

Het tweede geval van de geboorte des aangezichts, is, als het kind met het voorhoofd op den voorberg of op de uitpuiling van het heiligbeen staat, en met de onderkaak, hals en borst, boven de schaambeenderen, tegen den buik aanligt: deeze ligging komt zoo dikwijls niet voor als de eerstgenoemde; maar de geboorte gaat nog minder voord, en is gewis doodlijker voor het kind.

De herstelling is in de gewoonlijke ligging der vrouwe zeer bezwaarelijk, om dat men hierin met de hand niet zoo gemakkelijk boven het schaambeen kan komen, om het kind met de borst omhoog te ligten: men moet des, tot dat einde, de vrouw op den buik laten liggen zij moet, naamlijk, als 't ware op handen en knieën rusten, dusdanig kan men gemaklijker boven de schaambeenderen, bij de borst des kinds komen, en hetzelfde dan, op gelijke wijze als in het voorgaande geval, omhoog ligten.

Het voorhoofd en de kruin van het kind zakken somtijds over de uitpuiling van het heiligbeen benedenwaards, in den ingang van het bekkenhol: neemt men dit waar, zoo laate men het overige van de geboorte aan de Natuur over.

De ligging der vrouwe wordt, naa dit herstellen gedaan te hebben, weder op de gewoone wijze gericht, en het volbrengen der geboorte aan de Natuur overgelaten.

Er is nog eene andere wijze om den kruin, bij de geboorte van het aangezicht, in een goede plaatsing te herstellen; doch deeze is zeldzaam mogelijk en toereikende: men kan naamlijk beproeven of men niet bij de eerste en tweede ligging van het aangezicht, eene hand

over het voorhoofd en den kruin kan brengen: heeft men hiertoe plaats genoeg, zoo beproeve men om den kruin naar beneden te brengen.

Maar is het aangezicht in deeze of in de voorgenoemde ligging al te ver in het bekken gezakt, zoo kan men noch de verplaatsing of herstelling doen, noch het kind meer keeren, om dat men uit hoofde dat het aangezicht gezwollen is, niet meer naar deszelfs borst kan komen, noch het hoofd uit het bekkenhol terug brengen: hier is geene andere hulp meer overig, dan dat men, onder iedere vlaag, eenige vingers in den mond des kinds tracht te brengen, dezelve aan de bovenkaak plaatst, en daardoor dan het aangezicht, bij iedere vlaag, naar beneden trekt; doch dit trekken moet maatig zijn; want men kan die tedere schepseltjens ligtlijk de bovenkaak stukken breeken of drukken.

Het derde en vierde geval van eene aangezichts-geboorte, is dit: als het voorhoofd des kinds op den eenen, en de onderkaak op den anderen rand der darmbeenderen rust, en gevolgljik het lijf des kinds tegen de rechte of slinker zijde der baarmoeder aanligt.

Daar in deeze ligging het hoofd met zijn smalste gedeelte in de bovenste bekkenopening zakt, zoo wordt het aangezicht zeer schielijk en ligt naar beneden, in het bekken, tot aan den uitgang of de onderste bekkenöpening geperst; maar hier blijft het hoofd dan vastzitten, om dat het kind met zijne schouders op het schaambeen, en op den voorberg van het heiligbeen staat, en alzoo bekneeld wordt.

Dit geval is het, waarin men zig vergeefsch bemoeit, om langs de zijde van het aangezicht, aan het heiligbeen, of onder de schaambeenderen, tot een der schouders van het kind te komen, ten einde dezelve van dat been waarop zij staan, of zijdelings, in het bekken te brengen.

Dit afbrengen der schouders van het schaambeen, of van den voorberg des heiligbeens, is, bij het sterk zwellen van het aangezicht, somtijds bezwaarlijk, en

ja bijna onmogelijk: daarom moet men, als men deeze zijdelingfche ligging waarneemt, in het begin der geboorte, het kind geheel keeren: een handgreep, die bij een staand water zekerder en fchielijker voor het kind, en voor de baarende vrouw is, dan de verplaatfing of herftelling van het hoofd; want is dit reeds geheel in het bekken gezakt, zoo is het tot de keering te laat, om dat het hoofd zig niet meer terug laat brengen; hier moet men derhalven op andere hulp bedacht zijn.

De geboorte van het achterhoofd.

Het is geen zeldzaam geval, dat een kind met het achterhoofd in den mond der baarmoeder zakt.

Het achterhoofd kan, zoo als andere deelen, vierderlei liggingen aanneemen.

Voor eerst: als de kruin tegen het fchaambeene, en de nek tegen het heiligbeen gekeerd is:

Ten tweeden: als de kruin tegen het heiligbeen, en de nek naar het fchaambeene gekeerd is:

Ten derden en vierden: als de kruin op het eene, en de nek op het andere van één der darmbeensranden staat.

In het algemeen zijn de tekens van een ingezakt achterhoofd zeer bedriegelijk: men houdt fomtijds het achterhoofd voor den kruin, om dat dit ook een hard, rond en glad gedeelte voorftelt; alleenlijk door de breede rondte, wier punt hard is, door het afzijn der fontanel, en door het gevoel der nevendeelen; als de ooren, de hals, de rug, enz., kan men het achterhoofd van den kruin onderscheiden.

De eerfte twee liggingen kan men aan de Natuur overlaaten, als het hoofd niet te groot, of het bekken niet te klein is, maar in een tegengesteld geval, moet men ten eerften het kind keeren.

Is dit keeren niet meer mogelijk, zoo als ik eens onder-
vonden heb, dan moet men ten eerften de tang gebruiken.

De twee laatste liggingen, waarin naamlijk de kruin
op den eenen, en de nek op den anderen rand van het
darmbeen ligt, vorderen dat men met de hand den nek,
of het achterhoofd, op geene zijde van het darmbeen
brenge, alwaar de rug van 't kind geplaatst is, en
zoo verder, tot men het hoofd over één der vleugels
van de darmbeenderen gebragt heeft, waarna men het
kind moet keeren.

De oor-geboorte.

Als het kind met het eene slaapbeen, en met het aan
't zelve vereenigde oor, in den mond der baarmoeder
komt zakken, dan wordt dit de *oor-geboorte* genoemd.

Zoo lang het water nog niet gebroken is, zoo lang
is het inzakken van dit deel niet te kennen: door het
water alleen en als dit voorkomende deel niet kegels-
wijze gevormd, en zig in het midden eene beweege-
lijke verhevenheid bevindt, kan de Vroedmeester, naa
een naauwkeurig onderzoek, het ingezakte oor ver-
moeden; maar zoo het water breekt, kan men de slaap
met het oor duidelijker voelen, en dan is de kennis
vrij zekerder.

In 't algemeen kent men, dat het kind met het
oor inzakt, als men een breed, glad gedeelte ontmoet,
op welks bodem zig eene, deels vliezige, en deels kraak-
beenige, *elastique* uitpuiling bevindt, in wier midden
eene opening is: men moet den buitenften kraak beenigen
rand van het buitenoor wel van de voorfte uitrandig
onderscheiden, om hieruit de overige ligging van het
kind optemaaken.

Het kindt kan met de rechte of slinker slaap des hoofds
in den mond der baarmoeder zakken: iedere slaap kan
vierderleie ligging des kinds veroorzaaken; alzoo kan

het kind in het geval, waarin hetzelfde met de slaap en het oor voorkomt, agt liggingen aanneemen.

Uit de beschouwing van de vierderleic ligging met het rechter oor, kan men besluiten, tot de vier liggingen van het linker oor.

De vier liggingen met het rechter oor zijn deelen:

1) Het rechter oor zakt in; de kruin staat naar het schaambeen gekeerd, met het aangezicht tegen het linker darmbeen.

2) Het rechter oor zakt in, de kruin staat tegen het heiligbeen, en het aangezicht is naar het rechter darmbeen gekeerd.

3) Het rechter oor zakt in, de kruin is naar het rechter darmbeen, het aangezicht naar het schaambeen, en het achterhoofd naar het heiligbeen gekeerd.

4) Het rechter oor zakt in, de kruin is naar het linker darmbeen, het aangezicht naar het heiligbeen, en het achterhoofd naar het schaambeen gekeerd.

Het tegengestelde heeft plaats bij deese vier liggingen, als het kind met de linker slaap van het hoofd, en des ook met het linker oor in den mond der baarmoeder zakt; gevolglijk moet men, als het oor inzakt, altoos onderzoeken, waar het aangezicht, waar het achterhoofd, waar de kruin, en dan waar het kind met den hals en het overige lijf naar toe gekeerd is en ligt.

Maar men kent zeer gemakkelijk bij de oor-geboorte de plaatsing en ligging van het hoofd, als men aan het ingezakte oor nauwkeurig onderzoek doet, waarheen de kraakbeenige rand gekeerd is; want achter dezen rand is zekerlijk het aangezicht geplaatst; ook voelt men nog aan het ingezakte oor het kleene, doch door deszelfs slapheid, kenlijke oorlapjen: onder dit is gevolglijk de weg om tot den hals en het lijf des kinds te komen; en zoo vervolgens kan men gemakkelijk den weg naar de schouders en borst vinden, waarin men vooral onderwezen moet zijn.

Het is eene algemeene aanmerking bij de oor-geboor-

te, dat het hoofd van een voldragen kind, door een wél gemaakt, wijd bekken, in geene van deeze liggingen, kan heen gaan: hier van daan is het, dat sommige Vroedmeesters den raad geeven, om het hoofd in zijne natuurlijke ligging te herstellen: edoch in het begin der geboorte, als het hoofd nog niet in het bekkenhol is ingeperst, kan bij eenigen van deeze agt liggingen de herstelling beproefd worden; maar daar in den beginne der geboorte al het water nog in de baarmoeder, aanwezig is, is het keeren wel zoo gemaklijk als deeze herstelling, en verdient des den voorrang; want men kan nooit met de hand het hoofd geheel in den ingang van het bekken recht herstellen, en hierom kan men ook nooit van dit herstellen eene schielijke en ligte geboorte verwachten; dit is het geene wat mij sterkt, om mij nooit bij de oor-geboorte op de herstelling alleen te verlaten, maar altoos in den beginne der geboorte bij alle agt liggingen het kind te keeren.

Is eenmaal het water, onder de beproeving van de herstelling, weggevlueid, zoo wordt dezelve onmogelijk, en het keeren is dan ook zeer moeijelijk, al staat het hoofd nog boven het bekken; want hoe nader het hoofd bij het bekkenhol is, te moeijelijker is het keeren; men kan of, om de tegenwoordigheid van het hoofd des kinds, niet tot de voeten van het kind komen, of men brengt deezen tot aan den mond der baarmoeder, in wier naabijheid het hoofd geplaatst is, en alzoo heeft men het kind dubbeld, en men zoude hier eerder de voeten in de baarmoeder afscheuren, dan het hoofd en het geheele kind uit deeze dubbelde ligging brengen; men moet alzoo in de oor-geboorte, in den beginne van het keeren, alle voorzichtigheid aanwenden, om het hoofd van den baarmodersmond aftebrengen, ten einde hierdoor de verdubbeling van het kind te vermijden.

Al zakt het kind met het oor in, om 't even in welke ligging, zoo moet de Vroedmeester eerst zijne hand onder het oor langs, tot de schouders van het kind brengen: is deeze hand nu aldaar gekomen, zoo moet

hij het kind aan den schouder vatten, en het, door middel van denzelven, zijdelings op- of naar dat darmbeen schuiven, waar naar toe het voorhoofd gekeerd is: met deeze zelfde hand vat hij de borst van het kind, en schuift het naar boven: heeft hij het hoofd nu geheel over de vleugels van één der darmbeenderen gebragt, dan is er geene vrees meer, om het kind te verdubbelen: vervolgens gaat men over de borst en buik des kinds naar de voeten, en op die wijze volbrengt men het keeren.

Bevindt men zig in het geval, dat men het hoofd of niet over de vleugels der darmbeenderen heen kan brengen, of als men de voeten reeds daarheen gehaald heeft, met één woord, het geval, waarin het kind reeds dubbeld ligt, dan moet men de geboorte op de volgende wijze verrichten: eerstlijk brengt men aan den eenen of aan alle twee de voeten des kinds, eene luts, waartoe men een smallen linnen band, of een smal lint kan bezigen.

In het algemeen is van de geboorte met de luts aante-merken, dat men zig van dezelve kan bedienen in alle die gevallen, waarin het hoofd, of een ander gedeelte, zig naabij den mond der baarmoeder zoo vast gezet heeft, dat men die deelen niet ver genoeg van denzelven kan verwijderen: al komt men hier ook tot de op den bodem der baarmoeder liggende voeten des kinds, zoo vindt men echter meestal groote zwaarigheid, om alle twee de voeten naar beneden in den baarmoedersmond te brengen, om dat men alle twee de voeten niet tegelijk kan vatten, en de eene voet altoos weder omhoog, op zijne plaats, terug gaat als men den anderen wil zoeken; of dat men eerder het kind de voeten zoude afscheuren, dan denzelven genoegzaam naar beneden trekken.

Men legge dus eene luts om den eenen, of om alle twee de voeten, en trekke dan met dat gedeelte van 't lint, dat buiten de schede hangt, naar beneden, ten zelfden tijde, als men met de andere hand in de baarmoeder geplaatst, het hoofd dat zig naast den mond der

baarmoeder vast gezet heeft, of eenig ander deel, omhoog of ter zijde schuift.

Door deeze dubbelde werking, naamlijk het terug brengen van het eene, en de ten gelijken tijde gedwongene aanhaaling van het andere deel, kan men ongeloovelijke sterke en tegelijk geschikte kracht uitoefenen, waardoor ik altoos, in de zwaarste gevallen, schielijk en gelukkig mijn oogmerk bereikt heb.

Intuschen kost het aanleggen van deeze luts; (door verscheiden Vroedkundigen uitgevonden, en kunst-luts genoemd,) veel moeite: ik heb mij hierom altoos van eene eenvoudige wijze bediend en met veel geluk: een eenvoudig smal, gemeen, twee ellen lang windsel, legt men op de helft zamen; het gesloten einde of midden daarvan buigt men wat terug, om eene luts te vormen; in deeze luts brengt men den duim, wijs- en middensten vinger, en zoo brengt men de geheele hand in de baarmoeder tot aan den voet waaraan men de luts wil leggen: men schuift dezelve om de enklaauwen, en houdt dan met dezelfde vingers den voet boven dezelve vast, om te verhinderen dat de luts samentrekke: deeze luts laat zig, droog zijnde, beter aanhaalen, dan dat zij gesmeerd of natgemaakt is: heeft men nu dus aan den eenen, of, als het noodig is, ook aan den anderen voet, deeze luts wel aangelegd, zoo vat men het buitenzijnde einde met de eene, en het tegen den mond der baarmoeder zig vastgezette deel met de andere hand, en indien men met deeze het vastzittende deel omhoog en op zijde brengt, over een der vleugels van de darinbeenderen heen, zoo trekt men met de andere hand van buiten de luts naar beneden; en dusdanig brengt men ligtlijk en zeker het kind uit zijne kwaade ligging, en de voeten in de schede, van waar ze dan verder en geheel buiten dezelve gebragt kan worden, gelijk in andere geboorte der voeten.

Zoo de luts afgleidt, is dit een teken dat zij niet wèl aangelegd en samengetrokken is: men moet dezelve des op nieuw aanleggen.

De dunne linnen band , als ook de zijden lutsen , zijn niet zoo goed als een linnen windsel ; want zij snijden als het ware in den voet des kinds sterker in , gleiden ligt af , en men heeft geen kracht genoeg om te trekken : bij de borst- , buik- , rug- , en , met één woord , bij alle geboorte waarin het kind gekeerd moet worden , kan en moet men van de luts gebruik maaken , daar men de reeds gevatte voeten niet naar beneden kan haalen ; als men het bij den ingang en bij den baarmoedersmond geplaatste deel , hetwelk de voeten des kinds tegenstand biedt , niet genoeg verwijden kan.

De samengestelde hoofd-geboorte.

Als bij eene natuurlijke kruin-geboorte , eene bijvoeging geschiedt , alzoo dat tegelijk met het hoofd één of alle twee de voeten inzakken , dan wordt dit eene samengestelde hoofd-geboorte genoemd : de verplaatting geschiedt zelden van zelve ; meestal is het de schuld der Vroedvrouwen , als zij naamlijk , bij eene kwaade ligging van het hoofd , de keering willen doen , en hierdoor den voet te veel naar het hoofd toetrekken : in deeze ligging laaten noch de voeten zig meer naar beneden trekken , noch kan men het hoofd van den mond der baarmoeder afbrengen ; bij zulk eene saamgestelde ligging is noodzaakelijk , dat men om eenen voet of om den enklaauw des kinds eene luts legge , en als de Vroedmeester met de rechte hand het kind omhoog en ter zijde brengt , moet hij ten gelijken tijde met het , uit de schede hangende deel der luts , den knoop naar zig toe haalen , dan zal het hoofd ten eersten omhoog gaan , en de voeten zullen zig naar beneden begeeven — De afbeelding der luts vindt men achter dit werk medegedeeld.

De hals-geboorte,

De hals kan met iedere van zijne vier vlakten, naamlijk met de voorste, met de achterste, of met eene der twee zijden in den mond der baarmoeder tot de geboorte inzakken.

Ieder deezer zijden kan vierderleie liggingen aanneemen, het welk men zig ligt kan verbeelden: de liggingen van den hals zijn allen, voor een voldragen kind, tegennatuurlijk; want het kan onmogelijk in zulk eene ligging geboren worden.

De verplaatsing of herstelling kan hier ook niet gelden, maar het kind moet, in dit geval, volstrekt gekeerd worden; waarover wij nu zullen spreken.

Men kent den hals, in den mond der baarmoeder gezakt zijnde, aan zijne voorste vlakte, 't welk men de keel noemt, (zoo dezelve niet sterk gezwollen is) door het gevoel van het strottenhoofd, en wanneer men, ter zijde, de bijhebbende deelen voelt, als de kaak en de borst.

Dit kennen valt moeilijker, zo de hals sterk gezwollen is.

Een, met den hals ingezakt kind, kan met het overige gedeelte des ligchaams vierderleie liggingen hebben; naar dat het zelve of met het hoofd, of met het lijf tegen eene der darmbeenderen, op de schaambeenderen of op de uitpuiling of den voorberg des heiligsheens gekeerd is.

Als de hals dus inzakt, dat het aangezicht op het rechte darmbeen, de borst en het lijf op het linker darmbeen liggen, is het wat ver om over de borst en den buik naar de voeten te komen: hier moet men de hand tot onder de borst brengen, en ligten deeze eenigzins omhoog, tegelijk naar het darmbeen heen, daar het

aangezicht ligt, en alzoo maakt men dat de borst vóórkomt; in welke ligging men zeer gemakkelijk naar de voeten kan komen.

Hier is aantemerken, dat het kind niet bij den hals gevat moet worden, om het op zijde te brengen; want daardoor heeft men geene kracht om het te verplaatsen: men zoude het door dit samendrukken veeléer ongelukkig maaken.

Bij de twee overige inzakkingen van den hals met de keel, welke van vooren naar achteren, of van achteren naar vooren gekeerd is, vat men het kind bij de borst aan, brengt het wat op zijde, en beproeft men derhalven de keering, even als in het laatst voorgaande geval.

Wat de omtrek van den nek betreft, als het kind met den nek inzakt, is het gemakkelijk te kennen aan de harde graadachtige uitsteekfels der wervelen, die men op 't midden van het voorkomende deel voelt; de nek is gemakkelijk te onderscheiden van den rug, om dat men ter zijde geene ribben voelt: hij verschilt van de andere gedeelten van den hals door de bij-deelen, door het achterhoofd, enz.

Ook deeze ligging van het kind kan vierderlei zijn, zoo als wij gezien hebben, bij het voorste gedeelte van den hals: geene van deeze liggingen kan hersteld worden, en het keeren is buitendien moeilijker dan van het voorste gedeelte van den hals, om dat men met de hand langs den rug, en niet over de borst kan komen: en naar den rug heen, mag men nooit de voeten van het kind zoeken.

Als nu, bij voorbeeld, het kind met het aangezicht inzakt, en met het achterhoofd op het eene, maar met den rug op het andere darmbeen ligt, zoo brengt men de hand langs de ruggraad, op een der schouderen van het kind, alzoo dat men hetzelfde wat kan draaien, om over de borst en den buik heen, bij de voeten te komen.

De handgreep tot het omdraaien, moet zoodanig ver-

richt worden, dat, zoo men vier vingers op het schouderblad, en den duim boven de schouders, tegen de borst aanlegt, men het keeren gemakliker doen kan.

De zijden van den hals, als eene van dezelve in den mond der baarmoeder zakt, kent men, door dat men een lang rondachtig deel voelt, aan welks voorste einde het strottenhoofd, en van achteren de graadswijze uitsteekfels van de halswervelen te voelen zijn.

Daar nu de rechter of linker zijde van den hals in den mond der baarmoeder zijn kan, kan het overige gedeelte van het ligchaam vierderleie liggingen hebben, 't welk men door het gevoel moet weten.

In ieder van deeze liggingen, vat men, met de werkende hand, het kind bij de schouders, alzoo dat de vier vingers op het schouderblad-, maar de duim boven de schouders, tegen de borst aan geplaatst is: zoodanig gevat, ligt men het kind een weinig op, en op zijde, naar dien kant waar het hoofd ligt; dit brengt men dan wat ter zijde, en boven den vleugel der darmbeenderen, als wanneer men ruinite genoeg heeft, om tot de voeten te komen, en de keering te volbrengen.

De schouder-geboorte.

Als een kind met één der schouders in den mond der baarmoeder zakt, kan hetzelfde met den rechter, en met den linker schouder vier liggingen aanneemen, derhalven in 't geheel agt.

Men kan den schouder door zijne rondte en hardheid, bijzonderlijk als hij sterk gezwollen is, zeer wel van het hoofd onderscheiden: zoo men eenen vinger naast den schouder in den mond der baarmoeder brengt, voelt men ten eersten de sleuf van de oxelholte zoo wel voor als achter, en daardoor tevens de bij-deelen, als de borst

of rug : deeze kan men gemakkelijk door de oxelholten , van het hoofd onderscheiden : sommige Vroedvrouwen hebben de schouders wel eens voor het hoofd gehouden , naamlijk in den beginne der geboorte , om dat zij niet gewoon zijn , een behoorelijk onderzoek te doen maar alleenlijk met eenen vinger het ingezakte deel aanstooten : onder deeze dwaaling vloeit dikwijls het water af , en de arbeid wordt hier door zwaarder : daar in dit geval het water naast den schouder ligtlijk kan wegloopen , is het noodig deeze zaak naauwkeurig te onderzoeken : bijzonderlijk moet men wel trachten te weten , waarheen de borst van het kind ligt : deeze kan eene vier-vouwige ligging hebben.

De schouder-liggingen zijn , voor eene rijpe , tijdige vrucht , even als de borst-liggingen , geheel tegennatuurlijk , en zij vorderen , even als deezen , de keering van het kind :

Zoo lang het water nog aanwezig is , kan men den schouder en de borst des kinds gemakkelijk terug brengen , en tegen het darmbeen aan , werwaards het hoofd heen staat , en alzoo kan men gemakkelijk bij de voeten komen ; maar is al het water weggevloed , dan is dit terugbrengen moeilijker.

Hier moet men zig benaarfigen , om , zonder dit terugbrengen , over de borst heen , tot de voeten te komen ; of men kan den arm geheel naar beneden haalen , om des te gemaklijker bij de voeten te komen : voor het overige zijn alle graaden der borstliggingen en haare hulp , ook bij de schouder-inzakking te bemerken.

De geboorte waar de elboog voorkomt.

Kinderen die met den rechter of linker elboog in den baarmoedersmond zakken , kunnen met ieder van de-

zelve, eene viervouwige ligging met het ligchaam aanneemen.

Deeze liggingen verhouden zig even als de agt liggingen van de arm-geboorte, en derzelve behandeling is mede even eens.

Men voelt in dit geval een stomphoekig gebogen deel in den mond der baarmoeder, 't welk men zeer wel door een naauwkeurig onderzoek van het deel zelf, en van die der nabij gelegene deelen van een ingezakte knie, kan onderscheiden.

Meest altijd ligt het kind dwars in de baarmoeder, als het met den elboog inzakt, en men kan met eene kleene moeite den elboog recht omhoog in de baarmoeder terug brengen, 't welk niet gemakkelijk geschiedt, als de geheele arm uitgevallen is; is dit terug brengen niet meer mogelijk, zoo heeft zulks juist niet veel te beduiden; men buigt hem dan naar beneden, zoo dat het eene arm-ligging wordt, de elleboog moge terug gebragt kunnen worden of niet, en alzoo richt men zig naar die regelen der arm-geboorte, bij welke het keeren van 't kind moet gedaan worden.

De geboorte der hand.

Als eene der twee handen van het kind nog niet tot boven den elboog uit den mond der baarmoeder is gezakt, zoo wordt dit eene hand-geboorte, maar is de eene of de andere hand reeds tot boven den elboog uit den mond der baarmoeder gezakt, zoo noemt men het eene arm-geboorte gelijk reeds gezegd is.

De rechter of linker hand, of alle twee tegelijk, kunnen alleen of met een ander deel, bij voorbeeld, het hoofd, de voeten, de navelstreng, enz. in den mond der baarmoeder inzakken.

Men kent en onderscheidt de hand van het einde

des voets, door het gevoel aan den duim, en dat men daar bij geene enklaauwen, of hiel van de voet, waarneemt.

Maar daar de hand op zig zelve maar een kleen deel is, veroorzaakt zij in de geboorte geenen bijzonderen hinderpaal, zo anders het kind eene natuurlijke ligging heeft: zakt dit, of met het hoofd, of met den stuit of met de voeten in, en men voelt zulks in den beginne, zoo kan de Vroedmeester dezelve met eenige vingers gemaklijk langs het ingezakte deel weêr terug brengen; maar is het hoofd of de stuit alte ver in het bekken gezakt, en laat de hand zig niet meer zoo gemaklijk terug brengen, zoo zoekt men haar met dat gedeelte naar buiten te brengen, en laat het overige der Natuur bevelen.

Zakken integendeel een of alle twee de handen, alleen in den mond der baarmoeder, zonder het hoofd, de stuit, of de voeten, zoo heeft het kind eene tegennatuurlijke ligging, en men moet trachten de handen weêr naar binnen te brengen; de ligging onderzoeken, en de keering bij eene tegennatuurlijke ligging noodig, doen: ligt het kind dwars in de baarmoeder, en is de eene hand uitgezakt, het kind moge op de rechter of op de linker zijde liggen, zoo tracht men de hand aan de tegenovergestelde zijde te haalen, en dezelve als 't ware naar buiten te brengen; hier door wordt de andere hand een weinig naar binnen gehaald, en het kind omgewend of gedraaid; dan krijgt men ruimte voor de keering van hetzelfde, want laat men deeze geboorte een tijd lang aan de Natuur over, zoo wordt de hand door de weeën al verder in de schede geperst, en alzoo wordt dan uit eene hand-, eene arm-geboorte, waarvan wij nu moeten spreken.

Van de arm-geboorte.

Als een kind reeds met eenen arm tot over den elleboog buiten den baarmoedersmond gezakt is, wordt dit eigenlijk eene arm-geboorte genoemd; want zoo lang de elleboog nog niet uitgezakt is, is het alleenlijk eene hand-geboorte.

Het kind kan agt liggingen hebben, naamlijk vier met den rechter, en vier met den linker arm. Hoe men, door het gevoel, den arm van den voet kan onderscheiden, zullen wij in 't vervolg zien, bij het leerstuk van de geboorte der voeten.

Uit het beschouwen en voelen van de hand des kinds, die nog binnen of buiten de schede is, of reeds geheel buiten de lippen der schaamelheid hangt, moet de Vroedmeester zijn besluit opmaaken, of het de rechter- of linker-arm is, en of dezelve niet gedraaid is.

Dat de arm niet gedraaid is kent men, als men den in de schede hangenden arm wat omwendt; herstelt hij zig weder in zijne voorige houding en ligging, dan is zulks een teken dat hij niet gedraaid geweest is.

Ten tweeden neemt men waar, waarheen de duim, de pink, waarheen de rug, en waarheen het vlak der hand gekeerd is; hieruit kan men met zekerheid oordeelen of de rechter- dan wel de linker-arm ingezakt is, en te gelijk zien welke ligging het kind met het overige van 't ligchaam heeft aangenomen.

Dat overige van het ligchaam en de voeten kunnen tegen het rechter of linker darmbeen, tegen den voorberg of boven de schaambeenderen geplaatst zijn.

Onder alle tegennatuurlijke liggingen van een kind neemt men meest die van den arm waar: ik heb dezelve onder honderd- en- agt tegennatuurlijke verlosfingen, zeven-en-dertig maal ontmoet: om dat deeze geboorte

dikwijls voorkomt, moet men het leerstuk over dezelve met eene bijzondere oplettendheid behandelen.

De arm-geboorte heeft verschillende graaden, welken men op drie bepaalen kan.

De eerste graad is die, als het kind met den arm maar alleenlijk tot aan de schouders buiten den mond der baarmoeder gezakt is.

De tweede graad is die, waar de arm tot over de schouders heen, buiten den baarmodersmond hangt.

De derde graad is die, als reeds de arm en de schouders met een gedeelte der borst, buiten den mond der baarmoeder in het bekkenhol geperst zijn geworden.

In den eersten graad, bijzonderlijk als het water nog niet geheel afgevoeid is, kan de geboorte gemakkelijk en spoedig gedaan worden.

Men laat in dit geval den arm in de schede liggen; zoo als hij ligt; men brengt de vlakke hand langs de vlakke en binnen zijde van den arm des kinds, over de borst en buik tot de voeten, welken men vatten, en in den mond der baarmoeder brengen moet: op deeze wijze gaat, onder het keeren, de arm van zelve in de baarmoeder terug, of hij blijft in de schede, en men heeft dan geene moeite om denzelven los te maken.

In het tweede geval, als de arm zig reeds tot over de schouders buiten den mond der baarmoeder bevindt, kan men met de hand niet zoo gemakkelijk over de borst heen komen; bijzonderlijk als het water geheel weggevoeid is: in dit geval moet men de hand onder het oxel-hol van het kind tot aan de borst brengen, zoodanig, dat men de borst op en ter zijde tegen het darmbeen kan ligten, werwaards het hoofd des kinds heen staat: hierdoor wint men ruimte, om over de borst en den buik heen tot de voeten te komen: voor het overige gaat men te werk als in het vorige geval.

In het derde geval waarin de arm met een gedeelte der borst in het bekkenhol is uitgezakt, is de arm-geboorte het moeijelijkst.

Is hier nog veel waters in de baarmoeder tegenwoor-

dig, zoo laat zig de borst fomtijds, even als in het voorgaande geval, nog wel terugbrengen, en men kan de verlosling doen; maar is al het water reeds uit de baarmoeder weggevloeid, en heeft zig deeze om het kind sterk samengetrokken, zoo kan men noch de borst van den mond der baarmoeder terugbrengen, noch over de borst heen tot de voeten komen: men moet in 't oog houden, dat als de borst zig door een middenmaatige kracht niet laat terugbrengen, men geen grooter geweld moet gebruiken, om dat men anders den mond der baarmoeder van de schede zoude afscheuren, zoo als ik eens waargenomen heb: in alle deeze gevallen, waarin het kind dwars ligt, met den eenen arm uitgezakt, kan men bproeven, 't geen hier voor, bij de hand-geboorte, gezegd is.

In dit derde geval dus, als men de borst niet meer kan terugbrengen, moet men tot den tweeden arm trachten te komen, en denzelven wat naar zig toe haalen, alzoo dat men, als 't ware, eene dubbelde arm-geboorte veroorzaakt: hierdoor geschiedt het wel eens, dat een groot gedeelte der borst in de baarmoeder teruggebracht wordt, en men op dusdanig eene wijs ruimte maakt, om over de borst en den buik heen, tot de voeten te komen.

Voor 't minst kan men in dit geval dikwijls tot één der voeten komen, en denzelven dan in den mond der baarmoeder brengen; maar verder brengt men dien niet: men moet by denzelven dan gebruik maaken van de luts; met de eene hand drukt men de borst van 't kind omhoog, en ten gelijken tijde trekt men, met de luts, den voet naar beneden; op zulk eene wijs wordt hier eene *mechanische beweging*, door welke het mij dikwijls gelukt is, de geboorte te voleinden, dewijl ik de borst van den mond der baarmoeder zoodanig verwijderd had, dat ik tot den anderen voet konde komen.

Wanneer in een der arm-geboorten, de arm in de schede zoo sterk en groot gezwollen is, dat men door dat zwel-

len niet langs denzelven in de baarmoeder kan komen,

zoo moet men den arm niet ten eersten uit het gewricht neemen, al is dezelve blaauw en zwart gezwollen; het kind kan in deeze ligging tog nog leeven: men kan in dit geval kleene inkervingen in de bekleedselen van den arm doen, waarop dikwijls eene ontlasting van een dik gestold bloed volgt, en waardoor deeze inkrimpt en kleiner wordt, alzoo dat men somtijds dan gemakkelijk, langs denzelfen, in de baarmoeder kan komen.

Kan men daarentegen, in den derden graad der arm-geboorte, wegens de groote zwelling van den arm, met geene mogelijkheid bij de borst komen, ten einde dezelve wat omhoog en naar achteren te ligten, en is het kind reeds volstrekt dood, zoo kan men den arm van hetzelfde boven den elleboog vatten, en hem uit de gewrichtsholte van 't schouderblad uitdraajen, het welk men, door middel der vingers, zeer gemakkelijk, zonder instrument, kan doen.

En kan men, dit gedaan hebbende, de in 't gemeen zoo hard als een steen beknelde borst, op geene wijs terug brengen, zoo moet men het kind keeren; kan ook naa dat de arm afgenomen is, de borst niet van den ingang van het bekken teruggebragt worden, en is het des onmogelijk om tot de voeten te komen, zoo is er geen ander middel overig dan, door instrumenten, de ingewanden uit de borstholte te ontlasten; eene operatie waarvan wij in 't vervolg, in eene bijzondere afdeeling, zullen spreken.

In deeze afdeeling moeten wij nog de dubbelde, en met een ander deel vermengde arm-geboorte beschouwen.

Eene dubbelde arm-geboorte is die, waarin het kind met beide de armen tegelijk in den mond der baarmoeder zakt, zoodanig dat het, gelijk de Vroedvrouwen zeggen, gestort komt: ook in dit geval mag men geen der armen terugbrengen; (*) maar men brengt zijn hand

(*) De dubbelde arm-geboorte valt zoo dikwijls niet voor, als de Vroedvrouwen wel zeggen: in dit geval willen ze niet gelooven, dat men zonder

tusfchen de armen van het kind, over de borst en den buik heen, tot de voeten: als het water nog niet geheel weggevloeid is, dan is deeze geboorte zoo moeijelijk niet, als eene eenvouwige arm-geboorte, waarbij de borst bekneld zit.

Deeze arm-geboorte is wel eens vermengd, het zij met het hoofd, met de voeten, of met den navelstreng: wordt de arm met het hoofd in het bekkenhol geperst, dan is alle moeite om hem weder terug te brengen, en de keering te doen, te vergeefs: de Natuur volbrengt deeze geboorte meestal gelukkig, en men heeft er nog dit voordeel bij, dat men de eene hand langs de zijde des hoofds heen brengen, en met de andere aan den arm van het kind trekken kan, om de geboorte te verhaasten; dewijl dezelve anders zwaarder en langduuriger wordt, dan als het hoofd alleen ingezakt is.

Als de voeten met eenen arm inzakken, zoo is de geboorte nog gemaklijker; om dat men dan reeds bij de voeten is: ook in dit geval laat men den arm liggen, zoo als hij ligt, en trekt men alleenlijk aan de voeten — Soms tijds zakt één arm met den navelstreng in: deezen moet men, vóór de keering, weér naar binnen trachten te brengen, om hem, onder den arbeid, niet met de hand te drukken en te kneuzen.

terugbrenging van een of alle twee de armen, in den mond der baarmoeder, tot de voeten van het kind kan komen: maar ik heb zulk eene verlossing tweemaal, gelukkig, zonder terugbrenging der armen gedaan; in beide gevallen had de Vroedvrouw, in plaats van den voet, den anderen arm in de schede getrokken, en zij was niet in staat denzelven weder terug te brengen: in 't algemeen gaat bij iedere doorhaaling van het kind, of de borst met de twee armen, of het hoofd met de twee armen tegelijk door het bekken heen; en waarom zoude men de hand niet langs den in de schede hangenden arm in de baarmoeder kunnen brengen, daar tog de hand der Vroedvrouwe niet zoo dik als het hoofd of de borst van het kind is? ondervinding en vernuft stemmen gelijkelijk tegen dit vooroordeel.

De geboorte der borst.

Als het kind met de borst in den mond der baarmoeder komt te zakken, zoo maakt hetzelfde eene van de vier volgende soorten van liggingen:

In de beide eersten, is het hoofd op het eene, en de buik en voeten op het andere darmbeen geplaatst: deeze dwarse ligging der borst komt meest voor.

De derde ligging is als het kind met de borst ingezakt, met het aangezicht boven de schaambeenderen, maar met den buik en de voeten boven den voorberg van het heiligbeen geplaatst is.

In de vierde ligging is het aangezicht boven het heiligbeen, de buik en voeten boven het schaambeen gelegen: deeze twee laatste liggingen der borst zijn zeldzamer dan de eersten.

De tekens dat de borst dwars ingezakt is, zijn de volgende:

1) De buik der zwangere vrouwe is als dan breed, en in de het midden niet puntig.

2) Men voelt een groot slap water, om dat de borst in den beginne der geboorte nog hoog staat.

3) Onderzoekt men met de hand, zoo komt men aan de borst, die men door de sleutelbeenderen en ribben kan kennen: men onderscheidt de borst, door de gladheid des borstbeens, van de ruggewervelen, op wier midden de graatachtige uitsteekfels te voelen zijn.

4) Om de overige ligging van het kind wèl te kennen, moet men de geheele hand in de baarmoeder brengen, en zoeken, waar het hoofd, den buik en de voeten van het kind zig bevinden.

Alc de vier liggingen van de borst zijn tegennatuurlijke liggingen voor een negen-maands kind; want in geene van deezen kan het door de natuurlijke werking van zelf geboren worden; echter zijn over 't algemeen

deeze liggingen der borst, in den beginne, als het water nog niet afgevloed is, ligtlijk te keeren; maar moeilijker is zulks, als 't water reeds is afgelopen, en onmogelijk is het, als bij het afvloejen van 't water, de borst reeds sterk in het bekken bekneeld is.

Dit zijn dan de drie gevallen, waarin wij de geboorte der borst zullen beschouwen.

Als men, in het eerste geval, bij het breeken van 't water tegenwoordig is, (dat is als het kind nog hoog in het bekken staat,) brengt men de hand over de borst en den buik van het kind naar de voeten, en tracht men deezen naar den mond der baarmoeder te brengen, om alzoo het kind te verlossen.

Als er in het tweede geval reeds veel waters weggevloed, en de borst reeds zeer sterk in den ingang van het bekken gezakt is, dan kan men niet gemaklijk over de borst en den buik heen, tot de voeten komen: hier moet men de borst omhoog en ter zijde naar het hoofd van 't kind trachten te ligten en te schuiven: zoo men daardoor eene buik-geboorte veroorzaakt, kan men te gemakliker met de hand tot de voeten komen, en de geboorte voleindigen.

Is dit terugbrengen niet meer mogelijk, zoo is er nog eene handgreep te beproeven; naamlijk deeze:

Men tracht op zijde der borst tot één der armen van 't kind te komen; deezen haalt men naar zig toe, in de schede, zoo verre mogelijk is; zulks veroorzaakt somtijds eene zijdelingsche ligging, in welke men dan beter, over den buik heen, tot de voeten kan komen: het is 't zelfde of men onder het schaambeen, of langs het heiligbeen, den arm naar beneden brengt.

In het derde geval van de borst-geboorte, dan naamlijk als 't water geheel afgevloed is, en de baarmoeder zig samengetrokken heet, waarbij alle de genoemde handgreepen beproefd zijn; in dit geval, waarin de borst niet alleen in den ingang of de bovenste opening, maar reeds tot in het hol van het bekken, tot aan den uitgang of de onderste opening van hetzeive, als

een kogel, ingekneld is, blijft dikwijls geene andere hulp meer overig, dan het gebruik van snijdende instrumenten, naamlijk het ontlasten der borst van derzelve ingewanden, als er geene tekens van het leven des kinds meer gevonden worden, 't welk men in het tegenwoordige geval daaraan kent, dat men aan het hart geene klopping meer voelt, en de borst week is; voorts aan een doodschen reuk, en aan het afstroopen van de opperhuid. Over de doodlijke tekens, en hoe men de borst-ingewanden ontlast, zullen wij spreken onder het leerstuk der operatiën.

Van alle de andere liggingen der borst is hetzelfde aantemerken, dat hier van de verhandelenden gezegd is.

De geboorte waarbij de buik voorkomt.

De buik kan, even als andere deelen van het kind; op vierderleie wijzen inzakken, alzoo dat het kind met den buik inzakt, en met de borst en het aangezicht op het rechter of linker darmbeen ligt; of dat het van vooren naar achteren, of van achteren naar vooren gekeerd is.

Alle vier de liggingen van den buik zijn tegennatuurlijk; in geen derzelve kan een voldragen kind ter wereld gebragt worden.

De tekens dat de buik inzakt, zijn:

- 1) Een groot, breed en slap water.
- 2) In dit water voelt men, vóór het breken, meest altoos, den navelfstreng; want deeze zakt meest altoos vóór den buik in.
- 3) Breekt het water, dan ontlast zig op eenmaal eene groote hoeveelheid, en men vindt den navelfstreng alleen in de schede.
- 4) Brengt men langs den navelfstreng de hand naar

binnen, zoo geleidt deeze de hand op het midden van den buik, welke aan zijne eigenaartige zachtheid kenmerkend is.

By deeze omftandigheden onderzoekt men verder, waarheen de voeten en het hoofd van het kind gekeerd zijn.

Zakt het kind zoodanig in dat het hoofd en de borst op het rechter darmbeen liggen, en de voeten tegen den buik op het linker darmbeen, zoo is het eerste werk den navelstreng te doopen, als de Godsdienstige begriffen der lijderesse zulks vereifchen; voords denzelven zeer zacht met de holle hand te vatten, en zonder hem te drukken in de baarmoeder trachten te brengen: men brengt vervolgens de hand over den buik tot de voeten van het kind, houdt alle twee zoo vast, dat de teenen naar achteren gekeerd zijn, om bij het trekken aan dezelve het kind tegelijk te keeren, zoo dat hetzelfde met het voorfte gedeelte van den buik naar de lendenwervelen der moeder gekeerd staat.

Alzoo volbrengt men de geboorte van den buik zeer gemaklijk, om dat men niet ver van de voeten af is: op dezelfde wijze zijn alle deeze geboorten ligtlijk te doen.

De derde ligging van den buik is als het kind met den buik van achteren naar vooren inzakt, zoo dat het hoofd en de borst tegen den voorberg van het heiligbeen, en de voeten tegen het fchaambeek gekeerd zijn, en boven hetzelfde liggen: hier kan men niet gemaklijk met de hand, boven de fchaambeekenderen der vrouwe, tot de voeten van het kind geraaken, als men niet eerst het hoofd en de borst eene zijdelingsche ligging geeft, waardoor men gemakliker boven de fchaambeekenderen kan komen.

Het keeren is nog gemakliker als men het kind bij de borst vat, en hetzelfde eenigzins wat op zijde van de fchaambeekenderen legt; want als dan kan men beter tot de voeten komen.

De vierde ligging van de buikgeboorte is die, waar-

bij het kind van vooren naar achteren gekeerd ligt; wanneer naamlijk de borst en het hoofd boven de schaambeenderen, en de voeten boven den voorberg van het heiligbeen gekeerd zijn.

Hier kan men gemakliker tot de voeten van het kind komen, echter is het ook in dit geval beter, dat men vooraf het kind bij de borst wat op zijde draait, om dat dan de spieren van den buik niet zoo uitgerekt worden; ook dat het kind niet zoo schielijk bij het trekken aan de voeten, met het hoofd achterover slaat: somtijds gebeurt het, dat het kind zig met den buik in de bovenste opening van het bekken, als 't ware inklemt; zulks geschiedt dikwijls, als het kind de buikwaterzucht heeft: in dit geval is ook altoos de ingezakte navelstreng waterzuchtig en dik; de uitgezakte buik is zeer groot, en perst allengkens zoo vast in, dat hij gelijk het hoofd bekneld wordt.

Dit inklemmen van den buik is hinderlijk aan het binnenbrengen van de hand des Vroedmeesters: men moet zig des moeite geeven, om den beknelden buik opwaards en ter zijde tegen de borst van het kind te ligten, ten einde alzoo ruimte te maaken om tot de voeten te komen: maar is de met water gevulde buik de oorzaak der beklemming, dan moet het water alvorens afgetapt worden.

De onderscheiden gevallen der buik-geboorte, zijn des drie: 1) de eenvouwige, 2) de beknelde, en 3) de waterzuchtige: van de laatstgenoemde hebben wij hier voor reeds gesproken.

De geboorte van het zijdelijk gedeelte van het lijf.

Als het zijdelijke gedeelte van het lijf, naamlijk het gedeelte tussehen de ribben en het darmbeen van

't kind, inzakt, kan hetzelfde met de rechter zijde vier liggingen aanneemen, en ook vier met de linker zijde.

Als het kind met de zijde zoodanig inzakt, dat de rug tegen de uitpuiling of den voorberg van het heiligbeen, de borst en buik naar de schaambeenderen gekeerd is, en 't met het hoofd op het rechter, met de voeten op het linker darmbeen ligt, dan kent men deeze geboorte,

1) Aan het groote, maar slappe water, waarin men dikwijls den navelstreng, althans voor een gedeelte, kan voelen.

2) De buik der vrouwe is plat en breed, als het kind dwars ligt; meer puntig op 't midden, als het kind van vooren naar achteren, of van achteren naar vooren ligt.

3) Men moet des de geheele hand in de baarmoeder brengen, om deeze ligging van het kind wèl te kennen; bijzonderlijk moet men zig bevljtigen, om te voelen waar de rug, en waar het hoofd ligt.

Men gaat alzoó gevolglijk gemakkelijk met de hand over den buik heen, naar de voeten, en volcindt de geboorte.

Om het kind zoodanig te keeren, dat het met het aangezicht en de borst naar achteren, tegen de lendenen der moeder gekeerd is, haalt men den bovensten voet eerst naar buiten, en trekt er eenigzins aan.

Men moet voorzichtig zijn, dat men de hand niet over den rug van het kind bringe, want zoo men dit doet, komt men, of niet tot de voeten, of men haalt dezelve over den rug, waardoor veel nadeels aan het heupgewricht veroorzaakt wordt: men moet, als men deeze ligging kent, niet lang toeven met het keeren; want daar het finalste gedeelte der zijde van het lijf, den mond der baarmoeder niet geheel opvult, vloeit het water meestal weg, en hierdoor wordt de keering moeilijker: uit deeze beschouwing en het keeren van deeze zijdelijke ligging van het lijf, kan men alle de andere liggingen gemakkelijk beoordeelen en behandelen.

De geboorte van den rug.

Het kind kan op drierleie wijzen met den rug in den mond der baarmoeder zakken.

De eerste is als de rug inzakt, en als de stuit op het een, en het hoofd op het andere darmbeen ligt: de tweede, als het kind met den rug inzakt, en het hoofd boven de uitpuiling of den voorberg van het heiligbeen, maar met den stuit boven de schaambeenderen ligt; de derde, daar de rug inzakt, en het hoofd boven de schaambeenderen, naar de stuit boven het heiligbeen ligt.

Meestal zakken zulke kinderen dwars met den rug in: de tekens van deeze ligging zijn de volgende:

1) Ligt het kind dwars, dan is de buik der moeder zeer breed en plat: men voelt op de eene zijde, van buiten aan haaren buik, eene aanmerkelijke uitpuiling, welke het hoofd van het kind is; maar legt het kind van vooren naar achteren, of van achteren naar vooren, naar de schaambeenderen, dan is de buik smaller, men voelt boven de schaambeenderen het hoofd van buiten, dat aldaar eene uitpuiling vormt.

2) De mond der baarmoeder wordt sterk verwijd, en er groeit een groot, maar slap water.

3) Breekt het water, zoo ontlast er zig op ééns een groote hoeveelheid, en van langzaamerhand wordt geheel het water ontlast.

4) Het ingezakte deel staat nog zoo hoog dat men hetzelfde met den vinger niet bereiken kan; maar heeft men de geheele hand naar binnen gebragt, dan komt men:

5) Aan een breed ligchaam, aan 't welk men niet alleen de ribben, maar ook tusfchen deezen de graat-achtige uitsteekfels van de wervelen voelt; door deeze

onderscheidt men den rug van de borst, om dat het borstbeen geheel glad is.

Men onderzoekt vervolgens naar de omliggende deelen, om te weten, waar het hoofd en waar de voeten zijn: meestal liggen de voeten over den buik opwaards, tegen den bodem der baarmoeder; zelden of ooit zijn dezelve benedenwaards, over den stuit gelegen.

De geboorte van den rug is veel zwaarder dan die van de borst, om dat men in deeze ligging in 't geheel niet bij de voeten kan komen; en al kan men zulks, dan mag men dezelve niet langs den stuit en rug achterover haalen; want of men breekt of men ontwricht het deiebeen, of men veroorzaakt eene vanéénwijking der wervelen, en dan komen deeze kinderen met de onderste ledemaaten verlamd ter wereld.

Om de geboorte van den rug te voleinden, raaden sommige dezelve tot eene geboorte van den stuit te brengen, dat is zij willen, men moet met de vlakke hand het kind daarheen trachten te brengen, waar het hoofd ligt, tot dat de stuit vóór den mond der baarmoeder komt: maar dit te beproeven is dan alleenlijk maar mogelijk, als 't water nog niet afgevloeid is; is dit meestal weg, en is de baarmoeder om het kind samengetrokken, dan is dit niet meer mogelijk, 't welk ik meer dan eenmaal ondervonden heb: ik houde 't het beste te zijn, het kind met de vlakke hand zoo aantevatten, dat men den rug op zijde, voor- of achter-waards kan draaien, dat het met het zijdelijk gedeelte der borst of van de lendenen in den baarmoedersmond zakt; hierdoor wint men in ruimte, om tot de voeten te komen, en alzoo de geboorte te doen.

Nu moet men wél weten, waarheen de borst en waarheen de rug gekeerd is; naamlijk of de borst tegen de schaambeenderen dan tegen de uitpuiling, of den voorberg van het heiligbeen is; want van de zijde der borst moet men trachten tot de voeten te komen; heeft men deezen, zoo volbrengt men de

verlosling naar de regelen der geboorte van het zijdelijk gedeelte van het lijf: de rug kan zoo ligt niet in het bekkenhol bekneld geraaken, als de borst.

Het zelfde moet men bij de andere liggingen van den rug doen: in alle gevallen moet men trachten den rug van den baarmoedersmond naar één der darinbeenderen te brengen.

De geboorte waarbij de stuit voorkomt.

Met den stuit kan het kind vier liggingen aanneemen; en zoo als anders, met ieder der andere deelen, tot de geboorte inzakken.

Deeze liggingen van den stuit zijn door de Schrijvers verdeeld in eene natuurlijke en tegennatuurlijke geboorte: als naamlijk het kind dusdanig met den stuit in den baarmoedersmond zakt, dat de buik tegen de lendenwervelen der moeder ligt, dan wordt deeze geboorte eene natuurlijke stuitgeboorte genoemd; maar zakt het kind met den stuit in, en is hetzelfde met den buik naar den buik der moeder gekeerd, of tegen één der zijden van het bekken, dan wordt dit eene tegennatuurlijke stuit-geboorte genoemd; om dat het kind in 't eerste geval met de onderkaak op de schaambeenderen zoude blijven hangen, en in de twee laatste liggingen zoude het zig met de schouders op het schaambeen en op de uitpuiling of den voorberg van het heiligbeen beknellen.

Wij zullen ieder deezer vier liggingen van den stuit, en dan de beknelling van denzelven, beschouwen.

1) Het water vormt zig in de rondte, zoo als bij de geboorte van het hoofd; maar het wordt breeder en grooter.

2) Neemt men in dat groote water een groot rond deel waar, 't welk zachter op 't gevoel is dan het

hoofd; ook vindt men er geene fontanellen aan, noch overëenschuiving der bekkeneelsbeenderen aan het ingezakte deel, als bij den kruin.

3) Als het water breekt, vloeit het groen en dik af.

4) Onderflaat men de vrouw, dan brengt men den vinger, met het *maconium* bemorst, weder terug.

5) Eindelijk voelt men de opening van den endeldarm van het kind onder den schaambeensboog, en de uitwendige teeldeelen van hetzelfde aan den voorberg des heiligbeens van de moeder.

Wordt men nu bij deeze natuurlijke ligging van den stuit nog gewaar, dat dezelve niet groot, en het bekken wijd genoeg is, en heeft de vrouw aanhoudende en sterke weeën, dan kan men deeze geboorte aan de Natuur overlaten, tot dat de stuit geboren is, en de naar boven geslagene beenen van zelven neêrvallen.

Voords kan men het overige ligchaam van het kind rekken, tot dat het hoofd in het bekkenhol is, dan de armen los maaken, en het hoofd naar buiten brengen, zoo als wij zullen zien bij de geboorte der voeten; ook kan men, als alles wèl en de stuit diep genoeg ingezakt is, de vingers haakswijze in de liesch van het kind zetten, en hetzelfde naar buiten voordhaalen, tot men de voeten kan losmaaken; is het kind nog te hoog voor de vingers, dan kan men gebruik maaken van éenen stompèn haak.

Het eerste geval van een zwaare stuit-geboorte is, als de stuit van het kind te groot, of als het bekken der vrouwe voor den stuit te naauw is.

Dit beknellen van den stuit kent men, als dezelve zig in den beginne der geboorte sterk uitperst.

Heeft nu het kind ook eene natuurlijke ligging, dan moet men in dit geval ten eersten de hand langs het heiligbeen naar binnen brengen, de tegen den buik aangelegde voeten zoeken, en dezelve in de schede brengen, om alzoo eene geboorte der voeten te maaken.

De keering hiertoe is de volgende: men moet den rug der hand tegen de lendenwervelen der vrouwe,

en het hol der hand, tegen de voeten en den buik van het kind richten: men moet de voeten onder de knie aan den kuit vatten, en hen niet recht uitgestrekt, maar ter zijde, of naar binnen gebogen, daar heen geleiden, en naar buiten brengen; want anders zetten zig de knieën van het kind tegen de uitpuiling, of den voorberg van het heiligbeen stijf aan, en zoo men als dan maar eenige kracht gebruikte, zoude men de deien breeken.

Ik ben van gevoelen, dat men alle geboorte van den stuit ten eersten in geboorten van de voeten moet veranderen, en haar niet aan de Natuur alleen overtelaaten: want

1) Zijn tog alle geboorten van den stuit langwijdig, zwaar en pijnlijk, van wege de geboorte van het ingezakte deel, om dat naamlijk de billen, met de naar boven gekeerde beenen, dikker en grooter zijn dan het hoofd; des verhaast men, door middel der kunst, de geboorte klaarblijkelijk, en vermijdt veele smarten.

2) Verhindert men ook hierdoor het inscheuren der bilnaad, hetwelk anders in die geboorten meestal gebeurt.

3) Verhindert men het inklemmen van den stuit; een toeval 't welk moeilijker, dan eene geboorte van een groot hoofd, te verhelpen is; want de stuit kan zig niet puntig genoeg vormen, zoo als het hoofd, en men kan bij deeze, met instrumenten dat niet doen, dat men bij het hoofd doen kan.

4) Is de stuit reeds ver in het bekkenhol ingezakt, dan kan men de voeten niet meer losmaaken.

5) Men vermijdt groote kneuzingen der teeldeelen, zoo wel aan het kind, als aan de baarende vrouwe.

6) Men vermijdt de lange en sterke drukking des navelsstrengs, waarvan de dood des kinds dikwijls een gevolg is.

7) Kan men tog niet meer dan de halve geboorte aan de Natuur overlaaten, want het hoofd en de armen moeten bij ieder deezer geboorte ook losgemaakt worden.

8) Is het naar beneden brengen der voeten in den beginne voor den Vroedmeester gemaklijk, de vrouwen

ven lijden daardoor weinig, en men voleindigt in eenige minuten eene geboorte, waartoe de Natuur veele uren noodig heeft.

Uit deeze grondstelling fluit ik uit, dat men bij alle geboorten van den stuit, ten eersten de voeten moet trachten naar buiten te brengen, 't welk bovendien in deeze ligging het gemakkelijkste is.

Is al reeds de geheele stuit in het bekken ingekneld, dan houden meest alle weeën op, om dat de mond der baarmoeder door het sterk drukken bijna lam wordt; de ingeknelde stuit en de schaamdeelen der moeder en van 't kind, zwellen geduurig meer op, en door het drukken van den navelstreng sterft het kind: de voeten kan men, als de stuit reeds in het bekken gekneld zit, niet meer losmaaken; en wil men door geweld den stuit weder terug in het hol der baarmoeder brengen, dan kan hierdoor de baarmodersmond van de schede afgescheurd worden.

Bij eenen ingeknelden stuit moet men beproeven, om op zijde van het kind, één of twee haakswijs gebogen vingers in deszelfs liesch te brengen; door middel van deezen moet men zig beijveren, door eene heen- en weêr beweging van de eene naar de andere zijde, den stuit naar buiten te brengen; maar de vrouw moet met alle haare krachten medewerken.

Men kan de vingers ter wederzijde niet tegelijk in de liesch van het kind brengen, zoo lang de stuit zig nog niet in den uitgang of de onderste opening van het bekken bevindt: ook moet men hierbij de bilnaad en het staartbeen wat tegenhouden, om het scheuren voor te komen.

Het in de liesch zetten der haaken is gevaarlijk, als het kind nog leeft; alzoo moet men desaangaande zeer voorzichtig zijn.

Nooit moet men de vingers bij een nog levend kind in de opening van den endeldarm, of, als de vrucht een meisje is, in de schaamelheid zetten, om het eenigzins naar buiten te haalen: veel minder moet men aan

den gezwollen balzak van een jongetjen trekken: aan deezē misflag maaken veele Vroedvrouwen zig schuldig.

De tweede ligging bij de geboorte van den stuit is, als het kind met den stuit zoodanig inzakt, dat de voorste vlakke van het lijf tegen de schaambeenderen ligt: dit is eene tegennatuurlijke ligging van den stuit.

Want laat men het kind tot den uitgang naar buiten inzakken, zoo zal het zekerlijk met de onderkaak op, of boven de schaambeenderen blijven zitten.

De tekens van deeze ligging zijn de algemeene tekens van de stuit-geboorte: het bijzondere teken is, dat men de uitwendige teeldeelen van het kind onder de schaambeenderen der moeder, en de opening van den endeldarm aan het heiligbeen voelt.

In dit geval brengt men, in het begin der geboorte, eene hand dusdanig in de baarmoeder, dat het kind als 't ware in de vlakke hand van den Vroedmeester zit: heeft men op deeze wijze den stuit wèl gevat, dan draait men denzelven om, alzoo dat de beenen en de buik naar de lendenwervelen der moeder, of op zijde in het bekken tegen één der darmbeenderen gekeerd zijn: nu brengt men de voeten naar onderen, en gaat voort, als in de voet-geboorte: want van boven het schaambeen zijn de voeten moeijelijk wegtebrengen, des moet men den stuit te vooren wat op zijde werken.

Wordt men geroepen in het geval als het kind in zulk eene ligging van den stuit, tot in het bekkenhol ingezakt is, alzoo dat men hetzelfde niet meer in de baarmoeder kan terugbrengen, zoo laat men het kind tot aan den buik buiten komen; maar dan moet men het van den buik ter zijde en achterwaards naar het heiligbeen toe keeren.

De derde en vierde ligging van den stuit is, als het kind met den stuit zijdelings inzakt; dat is als de eene bil op het schaambeen, en de andere op de uitpuiling of den voorberg van het heiligbeen slaat, en het des

met het aangezicht en den buik tegen één der darmbeenderen gekeerd is.

Laat men in deeze ligging het kind doorzakken, dan zal het zig met de schouders en armen tusfchen het fchaambeen en den voorberg van het heiligbeen beknellen: deeze ligging kent men bijzonderlijk aan de plaatsing der teeldeelen, en de opening van den endeldarm des kinds.

Daar het kind nu reeds met den buik tegen één der darmbeenderen gekeerd is, kan men zeer gemaklijk met de vlakke hand den fluit van het zelve opligten; de voeten naar beneden brengen, en het kind geheel met den buik naar het heiligbeen keeren; maar men moet wél letten, om het van de zijde des buiks, en niet van de zijde des rugs omtedraaen; men zoude hierdoor eenen te grooten weg maaken.

Ten laafcen is ten opzichte van de geboorte van den fluit nog in aanmerking te neemen, het geval als de fluit inzakt, en de baarmoeder fcheef ligt: hier voelt men maar ééne bil: in dit geval is niet anders te doen, dan het kind ten eerften met de voeten naar buiten te brengen.

De knie-geboorte.

Als een kind met één of beide de knieën in den baarmoedersmond ter geboorte inzakt, dan is er eene kniegeboorte te verwachten: het water is in dit geval flap; men voelt in hetzelfde één of twee stompen deelen van het kind: naa 't breeken van het water kan men deeze deelen eerst door het gevoel recht kennen; de knieën hebben de meeste overéenkomsr met den elleboog, des moet men de kniegeboorte van de elleboogsgeboorte wél onderscheiden.

De eerste kan men in den beginne aan de Natuur overlaaten, als het kind wèl staat, 't welk men daarentegen nooit bij die van den elleboog kan doen.

De knie is niet zo puntig, als de elleboog, en men vindt aan denzelven de beweegelijke knieschijf: brengt men de hand nog hooger, dan zal men tot aan den stuit en aan de uitwendige teeldeelen van het kind komen.

Het kind kan met de knie de zelfde vier liggingen aanneemen, als met de voeten: zo men de knie naar beneden trekt, wordt het eene voet-geboorte, welke dezelfde behandeling vereischt, gelijk wij in de volgende afdeeling zullen zien.

Somtijds neemt men waar, dat al heeft men alle twee de voeten naar beneden gebragt, dat één van dezelven korter dan de andere schijnt te weezen; al kan dit natuurlijk zoo zijn, is 't echter duizend keeren tegen één het gebrek, dat het kind met den kortsten voet door den navelstreng gestrengeld is: hier moet men des niet met geweld aan den kortschijnenden voet, of aan het geheele kind trekken; want daardoor zoude men, met den streng, aan den navel van het kind trekken, en den navelstreng af-, of den moederkoek los scheuren, of men brake ligt' het gestrengelde been; men moet veelëer in dit geval den navelstreng naar het kind toe haalen, om het gestrengelde been of de voet, of als dit niet meer te doen is, en men met de schaar daar tusschen kan komen, moet men den navelstreng stuk knippen, en het kind schielijk, ver genoeg naar buiten haalen, om den strengte binden: kan dit niet gedaan worden, zoo moet men de einden zoo lang laten digthouden tot men ze binden kan.

De Voet-geboorte.

Als een kind met één of beide de voeten in den baarmoedersmond zakt, word het eene geboorte van de voeten genoemd: het kind kan bij het inzakken der voeten, eene viervouwige ligging hebben: het kan met de voorste vlakke van het lijf naar het heiligbeen, naar het schaambeen, of tegen één der darmbeenderen gekeerd zijn.

In het eerste geval is 't eene natuurlijke, en in de andere drie gevallen eene tegennatuurlijke geboorte.

De tekens, dat het kind met de voeten in den mond der baarmoeder zakt, zijn de volgende:

1) De weeën verwijden den baarmoedersmond zeer langzaam.

2) Het water groeit niet in de rondte, maar in de langte, worstvormig, en slap.

3) In de vliezige blaas voelt men niet de bolswijze hardigheid van het hoofd, maar alleenlijk kleene leden.

4) Breekt het water, dan ontlast zig allengskens eene groote hoeveelheid van hetzelfde.

5) Eindelijk kan men de voeten van de handen onderscheiden, om dat de groote teenen met de anderen in eene rei, en niet van dezelveu afstaan, zo als de duim van de overige vingers: niet minder kan men, door middel der hiel en enklaauwen, de voeten van de handen onderkennen.

Maakt men nu gevolglijk uit deeze tekens op, dat het kind met de voeten ingezakt is, en voelt men te gelijk dat de baarmoedersmond genoeg verwijd is, zoo moet men ten eersten de geboorte door de hand voleinden, dat het water niet weg sluipe, en het kind alzoo droog liggen blijft, waardoor de geboorte moeilijker wordt: hierom is het ook, dat men de geboorte niet aan de

Natuur moet overlaaten, zo anders het kind niet klein of het bekken niet te naauw is.

Heeft men nu de baarende Vrouw dwars over het bed gelegd, en is de hand binnen den mond der baarmoeder gebragt, dan vat men beide de voeten boven de enklaauwen, zoodanig, dat de middenste vinger tusfchen de voeten van het kind geplaatst zij, en dan trekt men het kind tot aan de kuiten uit de fchede.

Staan nu de teenen van de voet naar 't heiligbeen, en de hiel naar het fchaambeene der moeder gekeerd, dan is dit een teken dat het kind op den buik, en met het aangezicht naar achteren ligt; en dit is eene natuurlijke geboorte der voeten.

Deeze ligging is het, waarin men het kind vervolgens, tot over de knie, uit de fchede kan trekken; men bedekt de voeten alsdan met warme doeken, en trekt hetzelfde dan aan de dije tot over de billen naar buiten: als men trekt draait men het kind, als 't ware, in de rondte; doch zoo, dat men altoos de vingers om den buik of de borst van het kind, en de duim op de wervelen geplaatst heeft; dusdanig kan men het zelve veelal gemaklijk, tot op de armen en het hoofd naa, uithaalen.

In zoo verre ja is het uithaalen gemaklijk; in zoo verre perst de Natuur zelve 't meestal uit, als men de geboorte aan haar over laat; maar is de basis van het hoofd tot in het bekkenhol gekomen, dan is 't het bedenkelijk tijdstip waarin het leven des kinds in gevaar is, vernids de Natuur zeer zelden, en niet dan naa een langen tijd, het hoofd verlost: hier van daan is het dat de kunst behulpzaam moet weezen, om 't nog vastzittend hoofd te verlossen, en 't leven van het kind aan 't gevaar te onttrekken.

Het hoofd van 't kind kan met den kin onder of boven de uitpuiling, of den voorberg van het heiligbeen geplaatst weezen: in 't eerste geval zal het achterhoofd van boven de fchaambeenderen, en in het tweede tegen de fchaambeenderen staan.

In het eerste geval kan men het hoofd des kinds, door sterk te trekken, gemakkelijk affcheuren; maar in het tweede geval gaat het hoofd door het sterk trekken dikwijls beneden in het bekkenhol; in beide gevallen moet men niet geweldig trekken, zo het hoofd niet gemakkelijk wil volgen; maar men moet te vooren de armen eerst losmaaken, en dan kan het hoofd gemakkelijk naar buiten gebragt worden.

Men brengt des de hand op zijde, langs het hoofd des kinds, om hoog in het bekken, tot boven den elleboog van het kind; dan drukt men aldaar den arm over het aangezicht, naar de tegenover staande zijde van het bekken, en brengt denzelven, in eenen cirkel, voor bij het aangezicht naar beneden, naar de borst, en vervolgens naar buiten.

Bragte men den arm van het kind niet zijdelings en binnenwaards, maar van het voorste gedeelte van het bekken recht naar achteren, tegen het heiligbeen, zoo zoude men denzelven ligtlijk breeken.

Er is nog waarteneemen, dat men altoos dien arm moet trachten los te maaken, die naast aan den endeldarm der moeder ligt; want men trekt het hoofd van 't kind altoos wat schuin in 't bekkenhol, in dier voegen dat de eene arm wat nader bij den endeldarm ligt, en op die zijde kan men het gemakkelijkste naar binnen komen.

Heeft men nu één arm los gemaakt, dan kan men op de andere zijde gemakliker naar den anderen arm komen, om ook deezen, even als den eersten, los te maaken.

Als men op gezegde wijs de armen uitgehaald heeft, zoo kan men beproeven, om door eene zachte drukking op de schouders, het hoofd naar buiten te buigen; kan dit nog niet, zoo moet men niet meer trekken, maar dat deel op de volgende wijze uithaalen.

Wij hebben reeds gezegd, dat het hoofd met het onderste gedeelte, boven of onder den voorberg kan

vastzitten: in het eerste geval brengt men de vlakke hand over den hals van het kind, en tusschen het heiligbeen tot onder den kin; deezen drukt men omhoog, zo dat men met twee vingers in den mond van het kind kan komen; door die twee vingers brengt men de onderkaak onder de uitpuiling of voorberg van het heiligbeen, en dan tracht men eenige vingers op den nek van het kind te brengen, om denzelven naar onder te dwingen, ten einde het achterhoofd van de schaambeenderen in het bekken te drukken.

Is het hoofd reeds in het hol van het heiligbeen geplaatst, zoo kan de vrouw met de weeen sterk persen: nu brengt men de vingers op nieuw in den mond; tevens het hoofd van de bilnaad naar het schaambeen, en voords uit de schede geheel naar buiten.

Het neêrtrekken van 't hoofd in eene rechte lijn, waardoor men het lijf van 't kind boven de schouders trekt, is zelden toereikend, om het hoofd naar buiten te brengen, al trekt men ten gelijken tijde met de eene hand aan de onderkaak; maar men moet daartoe de volgende handgreepen gebruiken: men laat naamlijk het reeds geboren lijf van 't kind door eene helphand vasthouden; dan trekt en drukt de Vroedmeester het hoofd nu eens omhoog naar de schaambeenderen, om de onderkaak en het aangezicht naar beneden te brengen; dan drukt hij weder met den duim het achterhoofd van 't kind van de schaambeenderen naar 't heiligbeen, alzoo dat hetzelve zig meer van het schaambeen verwijdt: dit op- en neder-beweegen van het hoofd helpt veel, gelijk ik dikwijls waargenomen heb, en meer dan het sterkste trekken in eene rechte lijn: maar als de onderkaak van het kind, boven het hol van het heiligbeen op staat, en niet door de vingers daarvan afgebragt kan worden, zo zoeken men het geheele hoofd op zijde te brengen, zoodanig, dat de onderkaak met het aangezicht tegen den rand der darmbeenderen gekeerd staat.

In deeze zijdelingsche ligging van het aangezicht kan het hoofd dikwijls buiten het bekken gebragt worden,

om dat het breedste gedeelte van het hoofd in den grootsten diameeter van het bekken komt te liggen.

Bijzonder gemakkelijk scheurt men het hoofd van een dood en reeds half verrot kind af; ook hoofden van gezonde kinderen, waaraan lang en sterk getrokken is, hangen dikwijls alleenlijk door de huid nog aan den hals vast: dit kan den kundigsten Vroedmeester gebeuren, en daarna moet men niet veel aan de onderkaak van half verrotte hoofden trekken; want daardoor scheurt men dezelven stukkend of geheel af; men moet bij deeze hoofden den vingers tot in de oogholten, of is het mogelijk, (om dat verrotte hoofden week zijn, en zig gemakkelijk samen laten drukken,) de vlakke hand tot over de kruin van het hoofd brengen en het neêrdrücken; dusdanig scheurt men hoofd zekerlijk niet af, bijzonderlijk als men van achteren, boven den hals, de kracht om neêrte drukken aanbrengt.

Maar zo het hoofd bovenmatig groot, monstereus, of waterzuchtig is, dan is 't somtijds onmogelijk om hetzelve, zonder 't van den hals aftefcheuren, naar buiten te brengen: in dergelijke gevallen moet men dan, als 't kind nog leeft, de tang onder deszelfs lijf aan het hoofd leggen, en met dezelve het hoofd trachten uittehaalen: maar weet men zeker dat het kind dood is, dan moet men met het *perforatorium* eene opening maaken, om de hersenen uit het hoofd te ontlasten, alzoo dat hetzelve kleiner wordt; als dan kan het hoofd gemakkelijk verlost worden, 't zij met de hand of met de haak, die men in de oogholte, of in de gemaakte opening aan het achterhoofd zet, gelijk wij bij het spreken over de operatiën zullen verklaren.

Mij blijft nog aanteteken en dat men, bij alle geboorte der voeten, niet vergeete ten eersten den navelstreng naar het kind toetehaalen, zoodra hetzelve tot over den buik buiten de schede der moeder gebragt is, anders zoude de streng breeken.

Dit zelfde is noodig, als de streng tuschen de beenen

van het kind doorgaat; hier trekt men denzelven naar de navel van het kind, alzoo, dat men de voet van het kind daar kan uitbrengen.

Er is nog eene natuurlijke geboorte der voeten, als dezelve naamlijk beiden inzakken, en het kind op den buik ligt: doch vindt men dat het alzoo inzakt, dat de buik niet naar de lendenwervelen maar naar het schaambeen gekeerd is, of tegen één der darmbeenderen, dan moet men het niet in deeze ligging naar buiten brengen, maar het zelve eerst op den buik wenden, alzoo dat, in het eerste geval, de onderkaak zig niet op het schaambeen vastzet, en, in het tweede geval, dat het kind niet met zijne schouders tuschen de uitpuiling of den voorberg van het heilig- en schaambeen beklempt raakt.

Dat het kind op den rug ligt, weet men, als de voeten die men uit de schede gebragt heeft zoodanig liggen, dat de teenen naar het schaambeen, en de hiel naar het heiligbeen gekeerd is.

In dit geval kan het kind maar tot aan het hoofd geboren worden; dan gaat de onderkaak op den bovenrand der schaambeenderen zitten, en men zoude door sterk te trekken het hoofd veeléer afscheuren, dan hetzelfde in deeze ligging naar buiten brengen; wanneer het niet zeer klein is.

Heeft men nu de voeten uit de schede gebragt, dan trekt men dezelve niet meer naar zig; maar men vat het eene been boven de knie, en buigt het over 't andere heen; op deeze wijs kan men het kind dikwijls gemaklijk van den rug op den buik brengen; maar men moet altoos dien voet over den anderen trachten heen te brengen, die het verste van den endeldarm is, dat is, die het naaste bij het schaambeen ligt; want meestal heeft het kind eene schuinsche ligging naar eene zijde van het bekken, en hier door wordt het omdraaien gemaklijker.

Maar ligt het kind in eene rechte lijn van het bekken, dan is het om 't even, of men den rechter dan

den flinker voet ombuigt : heeft men het kind nu van den rug op den buik gelegd, zoo voleindt men de geboorte, als boven gezegd is.

Is het kind, door eene onverftandige Vroedvrouw, reeds tot aan het bekken, tot de lendenen, of tot de borst uitgehaald, dan is het omdraajen van den rug op den buik zoo moeijelijk als gevaarlijk; want is men niet voorzichtig, dan kan men de dijen of wervelen van het kind ontwrichten, afbreken, of de borst indrukken, en het kind echter niet naar buiten brengen: des is het een hoofdregel, dat men de voeten nooit te verre uit de fchede moet haalen, als de teenen naar boven gekeerd ftaan.

Wanneer het kind tot aan de lendenen geboren is, dan legge men de eene hand op de lendenwervelen, de andere onder den buik, en beproeve alzoö het omdraajen.

Is het kind tot aan de borst geboren, dan is dit omdraajen nog minder mogelijk, en alzoö te gelijk veel gevaarlijker; want drukt men het kind de borst in, dan fterft het; en wordt het levendig geboren, dan fpuwt het bloed, en kan geen ademhaalen, maar ademt gelijk een ftervend mensch; ja als men de borst draait, terwijl het hoofd en de armen reeds in den ingang van het bekken zijn, dan draait men het kind ligtlijk den hals om.

Dus is 't het beste dat men in dit geval, als het kind naamlijk tot aan den hals in het bekken is, tracht tufchen het aangezicht van hetzelve en het fchaambeeneenen arm los te maaken, en uittehaalen.

Heeft men nu eenen arm naar buiten gebragt, dan brengt men de hand op de andere zijde, ter losmaakinge van den anderen arm, ook in de fchede.

Naa dat, ten laaftten, de armen geheel los gemaakt zijn, brengt men den kin van de fchaambeenderen af, en ter zijde.

Men brenge de vlakke hand, of eenige vingers, op de zijde van het hoofd des kinds; zoodanig dat men het geheele aangezicht van het fchaambeene naar één der

darmbeenderen keert; tegelijk laate men het lijf van 't kind op dezelfde zijde draaien, waar het aangezicht naar toe staat: in deeze zijdelingsche ligging brengt men twee vingers in den mond van het kind, of van buiten op de bovenkaak; en zoo helpt men het hoofd, naar onderen door te persfen, dewijl men tevens aan het lijf van 't kind trekt; want het is juist niet noodig, dat men het aangezicht naar het heiligbeen brengt, en ook niet dat men altoos eerst alle twee de armen los maakt.

Bij de zijdelingsche voet-geboorte, dat is als het kind met de voeten zoodanig inzakt, dat de teenen naar één der darmbeenderen, en de hiel naar het tegenoverstaande gekeerd is, dan ligt hetzelfde ook op ééne zijde in het bekken: in deeze ligging kan men het kind in 't geheel niet uithaalen: het hoofd op zig zelf zoude gemakkelijk doorgaan, maar de schouders gaan tusfchen het fchaambeene en den voorberg van het heiligbeen vastzitten: in dit geval beproeft men om den eenen fchouder met het hoofd op zijde in het bekkenhol te drukken, en het alzoo naar buiten te brengen.

Er zijn ook geboorten der voeten waar bij maar één voet inzakt: hier moet men den tweeden voet zoeken, om dat het gevaarlijk is het kind aan den eenen voet te trekken; want men ontwricht of breekt het been, of men veroorzaakt eene afwijking van het kraakbeenige aangroefel, van het boveneinde des deiebeens: men heeft ook soms, door de onvoorzichtigheid van aan den éenen voet te trekken, het been of de voet afgescheurd.

Niet altoos vindt men den tweeden voet zoo gemakkelijk als men wel denkt, om dat dit been en voet fomtijds zoo stijf aan den buik van het kind ingeperst is, dat men het niet voelt, maar dikwijls met de hand daarover heen gaat, bijzonderlijk als de werkende hand door den langen arbeid verhit, krachtloos is geworden, zonder eenig gevoel.

De misflag, waardoor eenige Vroedvrouwen fomtijds uren lang naar den tweeden voet gezocht en denzelven niet gevonden hebben, bestond daarin, dat zij de hand aan den buitenkant van het been binnenbragten.

Als men 't kind aan den eerstgevonden voet te ver in het bekken brengt, bijzonderlijk als het bekken wat naauw of het kind zeer groot is, kan men veelal onmogelijk den tweeden voet buiten brengen: in dit geval moet men het kind met het geheele lijf wat terug in de baarmoeder dringen; dan heeft men meer ruimte om tot den anderen voet te komen, en dien buitentebrengen.

De tweede voet kan ook van achteren tegen den rug aanliggen, want de gewrichten en banden des kinds in 'smoeders ligchaam zijn zoo slap, dat men ieder derzelve in alle vormen kan buigen en draaien, 't welk bij een geboren kind zonder ontwrichting niet kan geschieden; om dus met zekerheid den tweeden voet te vinden, brengt men de vlakke hand aan de zijde van den grooten teen, langs het been tot aan de teeldeelen van het kind: hier zal men zekerlijk ontdekken, waar het andere been en de voet ligt, dien men dan naar beneden bij den andere voet brengt, en alzoo de geboorte daarfelt

De zwangerheid buiten het hol der baarmoeder.

Volgens de gewoone wetten der Natuur, wordt een bevrucht ei in de baarmoeder overgebracht, aldaar vast gehecht, en tot op den tijd der geboorte bewaard: intuschen blijft het bevruchte ei somtijds in één der eier-nesten, in één der trompetten, in de schede, of buiten de baarmoeder in de buikholte liggen, en zet zig aldaar tot eene zekere grootte uit.

Deeze ongelukkige ontvanging noemt men eene tegen-natuurlijke bevruchting, en is altoos twijfelachtig voor moeder en kind.

De kennis van deeze tegennatuurlijke bevruchting en zwangerheid is in de eerste helft der dragt geheel onzeker, haare waarschijnlijkheid veronderstelt men door de volgende verschijnselen.

1) De buik zet slechts op de eene zijde uit.

2) In deeze uitgezette zijde des buiks, wordt de beweging der vrucht gevoeld, en nog beter en duidelijker kan men dezelve door de bekleedfels van den buik voelen.

3) De maandlijksche bloedontlasting neemt men zeldzaam waar, en de overige waarschiynelijke verschijnselen der zwangerheid zijn ook tegenwoordig.

4) De uitzetting van den buik is in dergelijke zwangerheden lastig en pijnlijk.

Het beste verschijnsel vindt men echter in de onveranderlijkheid van den baarmoedersmond: deeze blijft in de geheele zwangerheid hard, langachtig, open en puntig, zoo als hij buiten de zwangerheid is.

Nadert de geboorte, dan ontstaan er afwisselende valsche weeën, staande welken de mond der baarmoeder onveranderlijk blijft; er vloeit geen bloed, gemengd met slijm uit de schede; in den mond der baarmoeder voelt men geen groeijing van het water, ook niet van het hoofd, of eenig ander deel des kinds; de weeën zijn zoo sterk als of het gezwel wilde openbarsten; somtijds wordt er eene sterke beweging der vrucht gevoeld, en de moeder en omtanders hooren ook soms eene inwendige breeking van 't gezwel; nu bedaaren de weeën op ééns, de vrouw wordt krachtloos, valt in onmagt, of sterft onverwachts.

Niet altoos echter is de uitgang van de bevruchting in den buik zoo ongelukkig: de levendige en groote vruchtjens alleen hebben deeze gevaarlijke zwangerheid dikwijls alzoó doen eindigen: als de vrucht in de eerste maanden, wanneer dezelve nog klein en rustig is, sterft, dan heeft de Natuur zig dikwijls, dooreene wondervolle verandering, gered.

Gelijk het kennen en de uitgang van de zwangerheid in de buiksholte twijfelachtig zijn, zoo is ook de hulp onbepaald: wij zullen den uitgang of de eindiging deezer zwangerheid in vier soorten van gevallen onderscheiden; waarvan het eerste is, als het kind, onder de slechtste

toevallen, zijne bewaarplaats breekt: het tweede, als 't kind, zonder eenig toeval, in zijne bewaarplaats verhard: het derde, als zig eene waterzucht in den buik daarftelt, en het vierde geval is, als het kind verrot, en er dan een etterzak en ontlasting in of door den endeldarm, of aan het onderste gedeelte van den buik plaats heeft.

In het eerste geval, als men uit alle verschijnselen besluit, dat het kind zijn ei gebroken heeft, en in de buikholte uitgestort is, dan is er geen ander middel ter waereld overig, als de Keizerlijke snede: deeze is in dit geval niet zoo gevaarlijk, om dat men hier alleenlijk de buikbekleedselen behoeft te openen, zonder de baarmoeder te beschadigen: in het losmaaken van den koek ligt echter de grootste zwaarigheid; evenwel is het beter een onzeker middel te beproeven, dan de baarende vrouw aan den zekeren dood overtegeeven.

In het tweede geval, als het kind zig met zijne aanhoorige deelen verhard, naamlijk als de weeën en de beweeging van het kind zig allengskens verliezen; als zig geen teken van het scheuren van het ei; geene tekens van ontfteeking der ingewanden opdoen, in dit geval kan geene hulp toegebracht worden; zij is ook niet noodzaaklijk: er zijn voorbeelden dat dergelijke vrouwen haar geheele leven door, zulke verharde kinderen in haaren gezwollen buik omgedragen hebben, en wel zonder eenigen hinder.

In deezen toestand is 't alzoo beter alles aan de gevolgen overtelaaten, dan bij eene onzekere operatie hulp te zoeken; ja men heeft waargenomen, dat dergelijke vrouwen in deezen tijd eenige maalen in de baarmoeder bevrucht zijn geworden, en gelukkiglijk verlost zijn.

Het derde geval eener buikbevruchting is een door het drukken van het kind veroorzaakte verzameling van etter: dit gezwel wordt aan zijne eigene verschijnselen gekend: somtijds opent het zig van zelf, en de beentjens van het kind dringen dan wel in de opening van het-

zelve; men heeft het van onderen en ter zijde aan den buik, en aan den endeldarm waargenomen: het moet behoorelijk verwijd worden, en het kind, met de daartoe dienende instrumenten in stukken of, is het mogelijk, geheel uitgebragt worden; dan moet men de zweer zuiveren en tot geneezing brengen: wordt dezelve niet op de eene of andere wijs geopend, dan sterft de vrouw aan het koud vuur, of aan eene uitteering in een sleepende ziekte.

Het vierde geval is, als de vochten van het ei zich zoodanig ophoopen dat er een watergezwel uit onstaat: men kan in den beginne het water door de *paracentesis* ontlasten; echter is het beter terstond eene genoegzaame verwijding in het gezwel te maaken, ten einde het kind geheel naar buiten te kunnen brengen, als men naamlijk in 't zekere overtuigd is, dat er eene bevruchting in den buik plaats heeft.

Voor het overige is nog aantemerken, dat men niet tot deeze bevruchting moet rekenen, het geval als een kind door het scheuren der baarmoeder in de buiksholte valt; daarvan hebben wij reeds gesproken.

De geboorte door den endeldarm.

Onder de veele tegennatuurlijke geboorten heeft men ook eenige gevallen, waarin vrouwen door den endeldarm gelukkig verlost hebben: men heeft tweeërle soorten daarvan waargenomen, naamlijk dat kinders geheel of ook reeds verrot door denzelfen zijn uitgekomen: als men derhalven weet dat eene vrouw zwanger is, en er zig, slaande de weeën, in den endeldarm

een

een groot bolrond ligchaam laat ontdekken, dan is dit een teken, dat de vrouw door den endeldarm zal verlossen: van dergelyk eene geboorte, kunnen verscheiden oorzaken weezen: de schede kan samengegroeid of te naauw voor de geboorte zijn, of zij kan haare opening in den endeldarm hebben; men moet des de schede hier verwijden, of den uitpuilenden ronden bol in den endeldarm, door eene lange insnijding, openen, en uit deeze opening van den endeldarm, het kind naar buiten brengen; maar willen de beenderen van een verrot kind door een ettergezwel uit den endeldarm naar buiten komen, dan moet men den weg daartoe openen, en de zweer zoo wel van binnen als van buiten door *antiseptische* middelen geneezen.

Over de instrumentaale operatiën, in de Vroedkunde, in het algemeen.

De ten allen tijde waargenomene onmogelijkheid om te baaren, de verschrikkelijke toevallen daarmede verbonden, hebben het menschlijke hart, door een aangeboren medelijden, van de vroegste tijden af, aangespoord tot het uitdenken van verscheiden werktuigen, welke de Natuur ondersteunden, wanneer de best daar toe dienende middelen, en de kundigste hand onvermogen waren.

Doch juist ook hier is het, waar het naar uitvindingen hunkerende verstand der menschen wel het meest gedwaald heeft: het getal der vroedkundige instrumenten is verbazend vernienigvuldigd: het gebruik en de tijd hebben het grootste deel derzelven als volstrekt gevaarlijk, anderen als onbruikbaar, weder anderen onvolgende gevonden, en de meesten derzelven zullen in vervolg van tijd meer tot een gedachtenis van schrik, dan tot eere van hunnen uitvinder verstrekken.

Men werd reeds gewoon de bedoelde doodlijke ijzers in de ingewanden der menschlijke vruchtjens te brengen; men kende in de barbaarsche tijden geene gemakliker hulp, dan de jammerlijke stuksnijding der ongelukkige wichtjens; zij werden de slagtoffers der eenvoudigheid en blindheid van de eeuw waarin zij stonden geboren te worden.

Het is hier de plaats niet, om een lijst te geeven, der uitgevondene Instrumenten voor de Vroedkunde, dezelve stukswijs te beschouwen, te verdoemen, of met lof te kroonen, dit was eens het werk van eenen onzer grootste Vroedkundigen, den beroemden KRANZ, wiens werken voor altoos der waare geleerdheid ter eere zullen verstreken: men kan alle operatiën in de Vroedkunde onder de volgende afdeelingen brengen, als daar is,

- 1) Het gebruik van den Roonhuysiaanschen hefboom.
- 2) ————— der tangen.
- 3) Het ontlasten der hersenen.
- 4) — — — — van de ingewanden der borst.
- 5) Het naar buiten brengen van een afgescheurd hoofd.
- 6) — — — — — van een van 't hoofd afgescheurden tronk.
- 7) Het klieven van het kraakbeen der schaambeenderen.
- 8) De buik-snede.
- 9) — keizerlijke snede.

Van de ontelbaare menigte instrumenten hiertoe gebruikelijk, heb ik, door veelvuldige ondervinding, alleenlijk vijf als noodig, nuttig, en in alle gevallen toereikende bevonden te weezen: zij zijn 1) de Hefboom, 2) de Tang, 3) het Perforatorium, 4) de Stompe haak, 5) de Beentang, zoo als men dezelve hier achter afgebeeld ziet: het gebruik en de werking van ieder deezer instrumenten, zullen wij in de daartoe behoorende operatiën aantoonen.

In 't algemeen is omtrent het gebruik der instrumenten aantemerken, dat men zig nooit van dezelve moet bedienen, als men de verlossing door de hand kan ver-

richten; dat men altoos, als de nood het gebruik der instrumenten vordert, de stompen voor de snijders den voorrang geeft; dat men alvorens de operatie te doen, wèl moet overleggen, of het kind dood dan nog levendig is, en of de baarende vrouw nog in staat is de operatie doortestaan, en eindelijk, of de operatie ten eersten moet gedaan worden, dan of dezelve uitstel kan gedoogen; welke plaatfing de baarende vrouw en de Vroedmeester moeten neemen, enz. dit alles moet vooraf, gelijk gezegd is, wèl aandachtig overwogen worden.

De voorrang der hand-operatie boven die der instrumenten, en de voorrang der stompe boven de scherpe werktuigen, vallen van zelve in 't oog, om dat men door de handen en door de stompe werktuigen niet zoo ligt de moeder, het kind, of zig zelv' kan beschadigen, als door de scherpe werktuigen.

De tekenen of een kind nog leeft, dan of het dood is, moeten bij sommige kunstbewerkingen met zekerheid bepaald worden; wij hebben dezelve in de afdeeling van *de geboorte van een dood kind* opgegeven.

Of eene baarende vrouw nog in staat is de operatie door te staan, hangt af van de krachten der vrouwe zelve, ook van den staat der baarmoeder: als de vrouw bij krachten is; als de pols gelijk, zacht, en maatig vol is; als de tong vochtig en rood is; als het ademhaalen gemakkelijk geschiedt; als het aangezicht en de ledemaaten hunne natuurlijke warmte hebben; als de stem helder en duidelijk is; als 't gelaat zig blijmoedig vertoont, en er geene neêrslagtigheid plaats heeft, dan heeft de baarende vrouw genoeg krachten: gevoelt zij geene brandende hitte in de baarmoeder; kan zij het drukken en betasten verdraagen; gevoelen de teeldeen en de baarmoeder de naar binnen gebragte hand of de instrumenten des Vroedmeesters, en weent de vrouw bij eene kleene verwijding van den baarmoedersmond, maar zonder dat niet, dan is de baarmoeder in een goeden staat.

Maar neemt de Vroedmeester waar, dat de teeldeen

en de plooijen der schede sterk zwellen; volgt, naa eene koude en rilling, eene koorts, met een harden en gezwinden pols, en groote krachtloosheid; is de tong met een bruine slijm bedekt, en is het drukken van buiten op den buik zeer pijnlijk, zoo dat de baarende vrouw niet zonder groote angstvalligheid tot het onderflaan kan besluiten; is ieder der weeën kort, maar gevoelig, dan is de baarmoeder ontstoken.

In dit geval moet men, nog vóór de operatie, gebruik maaken van aderlaatingen, en uitwendige stovingen, met azijn van goudglid en water, (*aqua vegeto mineralis*) op den buik te leggen, amandelmelk of gortwater, enz. in eene groote hoeveelheid te laten drinken, en dan tot de operatie overgaan.

Maar ook in eene beginnende versterking der baarmoeder, moet men de baarende vrouw niet onverlost laten sterven: bijzonderlijk als men uit de verschijnsels kan besluiten dat het kind nog leeft.

Men kent de versterking van de baarmoeder, als naa de voorgegane tekens van ontsteking, of ook zonder dezelve, de weeën en de pijn geheel ophouden, en als er een lijkachtige stank uit de baarmoeder komt; vervolgens aan de ongevoeligheid en koude der teeldeelen, en der baarmoeder, alzoo dat de vrouw de operatie wel met eenig gevoel, maar echter met groot geduld ondergaat en doorstaat; aan eenen zachten, maar elastiquen opgezetten buik; als alle leden mat en als geslagen zijn; als de pols koortsig, maar klein is; als de tong bruin wordt; als het naar buiten gebragte kind en de nageboorte zwart en verrot is; als naa de verlossing weinig of geheel geen bloed meer vloeit.

Ook bij deeze ongunstige verschijnsels heeft men soms nog het geluk gehad, van naa de verlossing, de vrouw, door sterfende, verkwikkende, en rotting tegenstaande in de deelen te behouden.

Maar daartoe is geene hoop, als, bij de voorgaande tekens, de buik allengskens, zonder pijn, heel hoog opziet, welzacht is, maar een rottig, kraakend gezwel vormt;

als de teeldeelen yskoud en ongevoelig worden; als zig uit dezelve een stinkend vocht ontlast; als de vrouw aan den ruggegraat pijn gevoelt, en ook niet op den rug liggen kan; als de onderste leden lam, en de pis en drekstoffen zonder gevoel ontlast worden; als de adem korter wordt; als de pols klein, allengskens sneller, en ten laatste uitzettend wordt en beeft; als eene bijzondere kalnte des gemoeds plaats heeft; als de lijderes zig over niets meer bekreunt, naar niets meer vraagt, offchoon zij ook tot haar' dood toe van alles bewust zij: het vrijwillige braaken van eene groene of zwarte stoffe; de hik; het geluid geëvend neêrslikken van het drinken; verschrikkelijke oogen; met wijd openstaande pupillen, die voor het sterkste licht onbeweegelijk blijven; bleeke lippen; krampachtige beweging, bezwijming, het koude zweet op 't voorhoofd, de koude van het aangezicht en der leden, geeven den Vroedmeester onwederspreekelijk te kennen, dat de baarende vrouw zig door eene geheele versterfing reeds op den boord des grafs bevindt.

De Vroedmeester moet deeze ongelukkige niet meer aanraaken, om de kunst geen schande te doen ondergaan; de sterfende lijderes de laatste oogenblikken haars levens niet ondraagelijk te maaken, en alzoo een leven te verkorten; op de behoudenis van 't welke geene hoop meer overig is.

Of in de andere overige gevallen de operatie moet gedaan worden, dan of dezelve nog uitstel kan lijden, moet de Vroedmeester uit de gesteldheid der omstandigheden, uit de krachten, en uit de gesteldheid der baarmoeder en der vrouwe zelve opmaaken; de dringende toevallen, als, eene hevige bloeding, de ontsteeking der baarmoeder, de inscheuring derzelve, enz., dulden geen uitstel: maar een beknelde hoofd met goede omstandigheden ten opzichte der moeder, en de tegenwoordigheid van sterke weëen, veroorlooven met de operatie nog te toeven: als het kind nog leeft, kan men de hersenen niet ontlasten, 't welk wij bij ieder operatie afzonderlijk zullen aantoonen.

De plaatfing eener baarende vrouw tot de operatie is

dezelfde welke bij het keeren wordt in acht genomen : de hefboom alleen kan in de gewoone ligging gebruikt worden ; maar alle de andere instrumentaale operatiën moeten geschieden of in het kunstige bed of op een gewoon bed , mids de vrouw er dwars over ligge : deeze liggingen heb ik in het spreken over de keering reeds beschreven.

Bij het in- en uit-brengen der instrumenten in het ligchaam der baarende vrouwe , is 't een hoofdregel , dat , als de eene hand binnen gebragt is , de andere het instrument op die hand naar binnen stuwt : het instrument moet van de bedoelde hand niet afgaan.

Thans zal ik de kunstregelen van iedere operatie afzonderlijk verklaren.

*Over het gebruik van den Roonhuysiaanschen
hefboom.*

Het instrument, hier achter afgebeeld, wordt *Hefboom van Roonhuysen* genoemd: de verdoemde zucht naar goud heeft reeds voor honderd jaaren dit nuttige werktuig, aan het welzijn der baarende vrouwe in 't algemeen onttrokken.

De uitvinding van hetzelfde heeft men te danken aan wijlen den Heere CHAMBERLIN, een beroemd Vroedmeester in *Engeland*, die, en met hem zijne drie zoonen, welken ook Vroedmeesters waren, dit werktuig langer dan 60 jaaren verborgen gehouden heeft ; vervolgens werd het bekend bij sommige Vroedmeesters, die er dezelfde schandelijke geheim kraamerij mede dreeven, daar zij het niet verkochten dan voor groote geldsommen, en onder belofte van een eeuwig stilzwijgen : te *Amsterdam* heeft ROGIER VAN ROONHUYSEN, door middel van dat zelfde werktuig, zijnen roem verworven;

de erfgenaamen van deezen hebben het voor veel gelds verkocht aan J. FISCHER, en HUGO VAN DE POLL, twee stads Geneesheeren ter gemelde plaats; en die twee oprechte menschevrienden maakten het openlijk bekend, tevens met eene verklaring van deszelfs gebruik.

Het instrument bestaat in een hefboom van de eerste soort, die aan het einde wat gebogen is: ROONHUYSEN en zijne opvolgers, hebben hetzelfde geheel met hondenleer bekleed; doch dat maakt het zonder noodzaakelijkheid dikker, en alzoo onbekwaamer om langs een groot hoofd naar binnengebragt te worden: hierom heb ik mij altoos van den onbekteeden hefboom bediend, doch hem tevens vóór 't gebruik, in warm water gelegd, om de koude van het ijzer te verdrijven; voords heb ik hem met pomade besmeerd om hem des te glibbriger te maken.

Het voornaamste gebruik van dit instrument heeft plaats in 't geval van een in den in- of uit-gang van het bekken beklemd hoofd; wanneer naamlijk 1) de rechte lijn van het bekken maar $3\frac{1}{4}$ of $3\frac{1}{2}$ duim wijd is; 2) als de grootte van het hoofd $\frac{1}{2}$ duim meer is, 3) als de weeën te zwak zijn, en eene langduurige, en moeilijke geboorte veroorzaaken, en 4) als 't hoofd te veel naar de bilnaad ligt: door den hefboom voorkomt men in dit geval het inscheuren.

Men bedient zig in dat zelfde geval van dit instrument op de volgende wijze.

Men legt de vrouw op het zoogenaamde korte bed, of in den geboortestoel, en brengt de met vet besmeerde linkerhand in de schede, tusfchen het bekken, en de zijde van het hoofd: vervolgens brengt men het instrument op de vingers van die hand, met de holle vlakke naar het hoofd gekeerd, mede naar binnen; men gaat verder van terzijde over het hoofd, onder de fchaambeenderen, zoo dat het instrument zig aan het nederdaalende gedeelte van dit been en het achterhoofd bevindt; nu brengt men hetzelfde geheel over de op-

pervlakte van het achterhoofdsbeen, tot aan den nek; alzoo dat het geheele achterhoofd zig in de holte van het instrument bevindt, en dit is juist het deel 't welk de kracht van het werktuig het best kan tegenstaan: de binnengebragte hand haalt men nu weder naar buiten, en men steunt met het middengedeelte van 't werktuig, met de hand naast deeze hand, tegen het zijdelijke en onderste gedeelte van het schaambeek, het welk 't steunpunt moet weezen: hierop drukt men hetzelfde aan 't hoofd van het kind, door dat men het andere einde, dat buiten is, met de hand wat opligt, en alzoo het hoofd te gelijk neêrdrukt (*).

(*) De Heer DE BREE zegt in zijne verhandelingen: blad. 7. §. III:
 „Om met den hefboom een beklemd hoofd te verlossen, laat ik de beenen
 „der vrouw van het ledikant of rustbank aftillen, en doe dezelve ter we-
 „derzijden vasthouden: hier door vermijde ik het altoos meer onslagtig,
 „volstrekt noodloos, en, voor vreesagige vrouwen meestal schrikbaarend ge-
 „bruik van het kortbed, waar van men gewoon is zig in dit geval te bedie-
 „nen; ik zeg aan de kraamvrouw, ten einde haar zoo veel mogelijk gerust
 „te stellen, dat ik haar dus plaats, alleen om haare niet voldoende vlaagen
 „op te wakkeren, en door deeze opwakkering haar te spoediger, en met
 „meer gemaks te kunnen verlossen.”

„Zo dra hier na geene weeën komen, breng ik den hefboom, met de
 „holle zijde naar het hoofd des kinds gekeerd, langs de binnente opper-
 „vlakte der schede, op eene onmerkbaare wijze, zoo hoog mij mogelijk is,
 „in- en op-waards, en wel aan die zijde waar ik den meesten tegenstand
 „gewaar worde: gelukt mij dit niet, tot zoo verre dat ik eenig gedeelte
 „van het hoofd in de holte dezès werktuigs kan besluiten, als dan haal ik
 „den hefboom zachtlijk terug, en breng hem wederom binnen, met dezelf-
 „de zijde naar den kant der schede gekeerd, (dus met de holle,) doch ik
 „bedien mij daarvan maar alleenlijk tot het maaken van zoo veel ruimte,
 „als genoeg is om het werktuig, weder terug gehaald zijnde, andermaal op
 „de eerstgenoemde wijze intebrenge.”

„Het werkpunt van den hefboom behoorelijk geplaatst zijnde, 't geen ik
 „daaraan weet als het bij eene geringe poging tot oplichting houdt, ligt ik
 „langzaam het beweegpunt meerder op, en oefen hierbij nooit meer kragt,
 „dan of ik eene sterke vlag wilde veroorzaaken; ik laat vervolgens van
 „tijd tot tijd het beweegpunt zakken, zoo om dat zulks medehelpt ter ont-
 „klemming, als om dat het de vrouw doet gelooven dat de vlag afgebroo-
 „ken is; ook somwijlen verplaats ik het werkpunt, als het mij toefchijnt dat
 „ik daardoor eenig voordeel kan aanbrengen; ik druk na dit alles eindelijk,
 „op voormelde wijze, dat is te zeggen, door het beweegpunt van den
 „hefboom zagtelijk op te ligten, het hoofd langzaam naar beneden, tot dat
 „het de ruimte van de bilnaad vult, en de beklemming opgeheeven is, als
 „wanneer ik den hefboom wegneem, dan breng ik den voorsten vinger in
 „den endeldarm tegen het voorhoofd van het kind, en druk het zelve daar
 „mede naar buiten, houdende de binnezijde der hand tegen de bilnaad, om

Het instrument moet zeer voorzichtig opgeligt worden, om dat de werking van een groot gevolg en het werktuig volkomen een hefboom van de eerste soort is, waarbij de naast de schaamelijkheid gelegene hand het steunpunt, het hoofd des kinds de last, en de rechte hand van den Vroedmeester aan het buitenste einde, de magt verbeeldt.

Uit de beschouwing deezer werking kunnen de volgende bepalingen opgemaakt worden.

De eerste is: dat het hoofd in zijn Natuurlijke ligging moet zijn; naamlijk het achterhoofd tegen het schaambeent, en het aangezicht naar het heiligbeen gekeerd, om dat men het instrument alleenlijk onder het schaambeent, en over het achterhoofd met zekerheid kan aanleggen, en om dat het hoofd maar alleen op deeze wijze, in deeze eenige richtingslijn, door het instrument, uit de beklemming kan gebragt worden.

Ten tweeden moet het hoofd onbeweegelijk in de bovenste opening van het bekken staan; is het nog beweegelijk; dat is, is het nog boven den ingang of de bovenste opening van het bekken, dan zoude men het rechtstaande hoofd schuin drukken.

Ten derden moet de rechte lijn van het bekken nauwer dan $3\frac{1}{4}$ of 3 duim zijn, of de grootte van het hoofd meer dan $\frac{1}{4}$ duim; ook moet de ligging van het hoofd niet tegennatuurlijk weezen.

Ten vierden moet men bij het opligten van het instrument wel acht geeven, dat de *clitoris*, de pisbuis of de blaas niet gekwetst word (*): deeze moet men eerst

„ verscheuringen te verhoeden; waar na ik de verlossing voltooi, op gelijke
„ wijze als men gewoon is te doen in natuurlijke gevallen.”

„ Bij dit alles plaats ik het steunpunt van den hefboom meest al tegen den
„ tak van het een of ander schaambeent; zeer zeldzaam tegen de vereeniging
„ der schaambeenten: de pisbuis derhalven, wier belediging men den *Roon-*
„ *huyslaanen* zoo algemeen gewoon is ten laste te leggen, word voor het
„ minste door mij niet beschadigd, en daarom ben ik nimmer bevreesd voor
„ eene daarvan afhangelijke tegenwillige pisonlasting, even weinig voor eene
„ verscheuring van de bilnaad of verbreeking der bekkeneelsbeenderen.”

(*) Dit gevaar loopt men ondertuschen niet, als men doet zoo als de Heer DE BREE leert: zie de laatstvoorgaande noot.

ledig maaken; en met de slinkerhand moet men onderzoeken, om de menigmaal gezwollen ploojen der schede, of de gezwollen *clitoris* niet te kwetsen, daar men hier tevens de hand tot een steunpunt voor den hefboom kan maaken.

Voor het overige zal ik er nog bijvoegen, hoe ik altoos, bij het gebruiken van dit instrument heb waargenomen, dat men door eenen zachten druk van hetzelfde de sterkste weeën kan verwekken, en dit schijnt mij ook de grootste werking te zijn, van welke de waarde van den hefboom afhangt.

Ik heb mij alzoo bij langdurige verlosfingen, als het hoofd niet zoo zeer om deszelfs grootte, als om het uitblijven der weeën was blijven zitten, met veel voordeels, van dit werktuig bediend.

Daar het niet steekt of snijdt, en dun is, kan het bij iedere vrouw gemakkelijk en zonder eenig gevaar naar binnen geschoven worden: uit een en ander blijkt dan dat de *Roonhuysiaansche hefboom* het eenvoudigste en onschuldigste van alle werktuigen in de Vroedkunde is, en gevolglijk, zonder eenig bedenken, in de des vereischende omstandigheden, gebruikt kan worden.

Over het gebruik der tange.

De gewigtigste uitvinding in de Vroedkunde is ongetwyfeld de tang, door middel van welke men, als 't ware met ijzeren handen het hoofd van 't kind, zonder het te beschadigen, uit het bekkenhol kan haalen.

Ook deeze uitvinding was onze eeuw voorbehouden; zij wordt wel eens de *Engelsche tang* genoemd, om dat zij eerst door CHAMBERLIN is uitgevonden, zoo als men voorgeeft, doch 't welk bij sommigen echter in twijfel wordt getrokken: zoo veel is zeker, dat men reeds bij AVICEN-

NA-een bewijs van geboortetangen vindt, en dat JACON RUYF een *Zwitsfer*, ook reeds dergelijke tangen gehad heeft, al zijn dezelve dan niet zoo volmaakt geweest, als die in Engeland waren.

Deêze tang is door den bezitter derzelve langen tijd geheim gehouden, tot dat de Engelsche Vroedmeester, CHAPMAN in 't jaar 1733, haar geheel bekend maakte: van deeze tijd af, is zij door veel Vroedkundigen verbeterd: LEVRET een beroemd Fransch Heel- en Vroedmeester, heeft het meeste daaraan toegebragt; hij vindt dat de eerste soort te kort, te recht, te weinig holstaande, en van eene slechte sluiting voorzien was: LEVRET heeft de tang langer gemaakt, naar de gedaante van het bekken gebogen, meer uitgeholt, haar eene betere sluiting gegeven, en ze des zoo volkomen gemaakt, als wij ze thans, onder zijnen naam, in 't gebruik hebben.

Maar daar zijn tegenwoordig nog drie tangen in gebruik, naamlijk de *Levretsche*, de *Smellische*, en de *Leakische*; de *Smellische* is veel korter dan de *Levretsche* en zij kan alleenlijk dan gebruikt worden, als het hoofd van 't kind reeds ver in het bekkenhol is ingezakt: de *Levretsche* is langer en hier achter, in de verkleening afgebeeld; de *Smellische tang* vindt men op veele plaatsen afgebeeld: de *Leakische* heeft drie armen; deeze tang verlengt het hoofd niet alleenlijk zijdelings, maar de derde arm drukt ook het achterste gedeelte van het hoofd in zijnen diameter naar vooren puntig.

De geboorten waarin het gebruik der tangen vereischt wordt, zijn de volgende.

- 1) Als het hoofd te groot, en in 't bekkenhol ingeklemd is; het kind moge leven of dood zijn.
- 2) In alle gevallen, waarin de weeën geheel wégblijven, waar het hoofd, al is het ook niet te groot, reeds in het bekkenhol staat.
- 3) In gevalle de baarende vrouw te zwak is om de weeën genoegzaam te verarbeiden.
- 4) In gevalle het daarzijn van een gevaarlijk toe-

val eene haastige verlossing vordert: dergelijke toevallen zijn, eene bloedvliet, eene ontsteeking der baarmoeder, de verschijnsels van eene scheuring der baarmoeder, de stuipen der baarmoeder, enz.

5) Als het hoofd door 't strengelen van den navelstreng terug wordt gehouden, of als deeze afscheurt, of met het hoofd tegelijk inzakt, en niet terug gebragt kan worden.

6) Als 't hoofd met den nek of met het aangezicht inzakt, van vooren naar achteren, of van achteren naar vooren gekeerd is.

7) Ook als het hoofd van een dood kind zig niet overeen schuift, maar zitten blijft.

8) Als het hoofd zeer schuins staat, en men 't met de hand niet weder kan herstellen.

9) Een hoofd, waarvan de hersenen ontlast zijn, en ook dat afgescheurd is, kan men door de tang naar buiten brengen, als het zig in 't bekken bevindt.

10) SMELLI bedient zig van zijne tang, als het kind met de voeten gehaald wordt, en het hoofd in 't bekken ingeklemd is.

In alle deeze gevallen wordt de tang gemakliker aangelegd, als het hoofd zig in 't bekken, of reeds in den uitgang bevindt, dan dat het nog in den ingang of de bovenste opening ware: het aanleggen is ook ligter, als 't hoofd natuurlijk dan tegennatuurlijk geplaatst is.

De geheele tang bestaat uit twee deelen, die men van elkander kan brengen: het eene stuk, hetwelk de stift heet, wordt het manlijke deel genoemd; het andere stuk, waar de opening in is, kan het vrouwlijke deel genoemd worden: van deeze twee stukken wordt het eene naar het andere naar binnen gebragt en aangelegd; ieder van deeze twee armen en de tang zelve wordt in drie deelen verdeeld, in den lepel, in het scharnier, en in de handvat, waar de kromme haaken geplaatst zijn.

Het manlijke deel wordt eerst ingebragt, zoo dat de vlakke, waarop de stift staat, boven is; dan wordt het

vrouwlijke deel ingebracht, naamlijk op de andere zijde van 't hoofd, en zoodanig dat de platte zijde van de geleding naar onderen is, op dat zig hetzelfde met den stift vereenigen kunnen, om te sluiten; want deeze sluiting der tang moet den Vroedmeester altoos voor 't gezicht weezen.

Sommige leggen de tang alvorens dezelve te gebruiken in warm water, om haare natuurlijke koude wegte-neemen, andere bekleeden haar met leer: deeze voorzichtigheid is onnoodig, en maakt het instrument, zonder noodzaaklijkheid, dikker: de lepel van de tang moet men met ongezouten boter, of, *a. d. g.* besmeeren, om dien gladder te maaken.

Veronderstellen wij nu het geval, dat een te groot hoofd in zijne natuurlijke ligging, zoodanig in den ingang van het bekken ingeklemd is, dat de *basis* van het hoofd in den ingang, maar met het overige deel in het bekkenhol ligt.

In dit geval moet men de baarende vrouw dwars over 't bed, het zij in een ledikant of op een rustbank leggen: dan wendt men de tang op de volgende wijze aan.

1) De Vroedmeester brengt zijne rechte hand zoo ver als er ruimte is, tusschen de linker zijde van het bekken en het hoofd naar binnen: op deeze hand brengt hij met de andere den manlijken arm der tange naar binnen, en omhoog, tusschen de hand en het hoofd; de arm der tange wordt, uit vreeze van den mond der baarmoeder te beschadigen, meer aan het hoofd, dan aan de schede en den baarmoedersmond gedrukt, en des zoo ver men kan, omhoog geschoven: schreeuwt de vrouw, dan is 't een teken dat men aan den mond der baarmoeder is gekomen; in dit geval haalt men den arm wat terug, en zoekt zachtkens tusschen het hoofd en den baarmoedersmond in; en om hoog te komen; terwijl men altoos meer aan 't hoofd dan aan de schede drukt: in deeze plaatsing blijft de arm der tange, of

van zelf vast staan, of men laat hem door eene helpende hand vasthouden.

2) Op dezelfde wijs, wordt de tweede arm der tange naar binnen gebragt aan de andere of rechter zijde van het bekken.

3) Ieder arm van de tang wordt schuin, tot aan de bovenkaak van het kind, om hoog gebragt, welke plaats men uit het lange deel, 't welk naar binnen gebragt is geworden, en uit het schielijk vallen der tange in eene ledige ruimte, kan beoordeelen: het bovendeel der tange plaatst zig van zelf naar het voorste en bovenste gedeelte van het bekken,

4) Worden de armen der tange in de geleding wél vereenigd:

5) De Vroedmeester begint met de tang langzaamerhand samen te drukken, om het hoofd wel te vatten; doch hij hebbe te zorgen dat de huid of de haren der schaamlippen niet mede gevat worden, 't welk groote pijn veroorzaakt; nu beproeft hij om, op eene maatige en kundige wijze het hoofd des kinds wat losser te maken, door hetzelfde eenigzins te draajen, doch alzoo, dat de zachte teeldeelen en van het hoofd en van de tang afwijken — hij stelt tuschen beiden zijn poogen een oogenblik uit, om zig te verpoezen, ende vrouw nieuwe krachten te doen verzamelen, ook om haar moed in te boezemen.

6) In deeze onregelmaatige beweeging trekt hij het nog hoog staand hoofd in het bekken, en zoo verder naar beneden, maar altoos in eene lijn naar de as van het bekken gericht, en tot ontfrent aan den uitgang van het bekken: ten laatsten wordt de geleding van de tang, van vooren, over de verëeniging der schaambeenderen, als het ware om een steunpunt, gebogen, zoo dat het voorhoofd en 't aangezicht het eerst naar buiten komen.

Onder deeze geheele kunstbewerking, bijzonderlijk als het hoofd door den uitgang van het bekken gaat, moet

een helpende hand de bilnaad tegenhouden, op dat dezelve niet scheure.

Is nu het hoofd buiten gebragt, dan neemt men ten eersten de tang weg, en haalt het kind verder op de gewoone wijze met de hand.

Als de tang wel aangelegd is, en ook het daaraan trekken regemaatig gedaan wordt, zoo kan men, zonder de baarende vrouw te beledigen, bijzonderlijk als zij staande de operatie weeen krijgt, (die de werking der tange sterk bevorderen,) soms, door eene geringe trekking, al naar dat het hoofd bekleind is, gelukkig verlossen: de flauwe drukking is voor het kind niet zeer nadeelig; dezelve verliest zig naa de geboorte welhaast: zo het niet mogelijk is om de armen van de tang over den basis van het hoofd te brengen, dan mag men ook met dezelve niet drukken, om dat men de slaapbeenderen dan zoude indrukken, en ook om dat de tang afgleiden zoude.

De *Leakische tang* met drie armen heeft van de twee andere dat bijzondere, dat de derde arm tusfchen het achterhoofd van het kind en het schaambeen der moeder gebragt wordt: het hoofd wordt dus van het schaambeen afgehouden, en maakt dat de tang niet afgleiden kan.

Allen die in het oefenende gedeelte der Vroedkunde eenige ondervinding gehad hebben, zullen weeten dat er somtijds gevallen zijn, waar men noch met den hefboom, noch met de tang, het hoofd uit het bekkenhol kon brengen: in die gevallen heeft de volgende operatie plaats.

Het ontlasten der hersenen uit het hoofd.

Als het hoofd te groot is, en dus den arbeid der tange verijdelt; als het te nauw zijnde bekken de tang

niet inlaat, of als de sterk ontstokene teeldeelen zonder de grootste verscheuring, het gebruik der tang niet toelaaten; dan is er geen ander middel voor de baarende vrouw, als het ontlasten der hersenen uit het hoofd des kinds; maar leeft in dit geval het kind nog, dan is de eerste aanwijzing voor de keizerlijke snede.

Is de moeder nog in staat om deezen doortestaan, en is het kind gevolglijk nog leevendig, wat is hier dan te doen? hier heeft zekerlijk ieder Vroedmeester, die een geweeten heeft, om te antwoorden: moet het kind der moeder, of moet deeze het kind opgeofferd worden? de Keizerlijke snede is voor het kind een zeker; maar voor de moeder een onzeker elendig redmiddel; het ontherfenen is voor het kind een zekeren dood, maar de moeder wordt door deeze eiselijke operatie gered.

Laat men de geheele zaak aan de Natuur over, dan sterft de vrouw zekerlijk; doch langzaam; en juist daarom redt men maar zeldzaam het kind, naa den dood der moeder.

Hier moge de *Theologant*, de *Jurist* of de *Moralist* beslissen, ik voor mij zal nooit het doodelijke eizer in een levendig kind brengen: met meer moeds zoude ik de keizerlijke snede onderneemen, als zig moeder en kind nog in goede omstandigheden bevinden, en alle de andere operatiën te vooren beproefd waren.

Het ontherfenen van 't hoofd heeft alleenlijk bij doode kinderen, en bij al te groote afgescheurde hoofden plaats, daar het op geene andere wijze, door de grootte van 't hoofd, en de naauwte van het bekken, zoo wel bij een geheel kind, als bij een afgescheurd hoofd, of om eenige andere oorzaak, verlost kan worden (*).

Zijn

(*) Dit is eene vraag van het grootste gewigt in de Vroedkunde, eene vraag, die de naauwkeurigste onderzoeking verdient, of een kind dood is of niet; als men dus niet de openlijke tekens der verrotting aan het kind vindt, dan moet men, als het de omstandigheden toelaat, zig niet met de operatie overhaasten; want een nog niet lang gestorven kind, geeft niet aanstonds verschijnselen van rotting; en worden deeze niet gevonden, dan kan men zig ligtlijk bedriegen.

Zijn er zekere tekens dat het kind dood is, dan moet het ontlasten der hersenen op de volgende wijze gedaan worden:

1) Legt men de vrouw dwars over het bed, en brengt menj eenige vingers der linkerhand op de fontanel, als het kan geschieden, of aan de tusschenruimte, die tusschen de twee wandbeenderen van het bekkeneel is.

2) Op en tusschen deeze vingers wordt door de rechterhand het *perforatorium*, op dezelfde plaats, aangebragt.

3) Hier wordt het instrument opgezet, en, zoo sterk als noodig is, in het bekkeneel en hoofd ingedrukt: het werktuig wordt dan bij wijze eener schaar vanëen getrokken, om de opening te vergrooten: met dit zelfde instrument moet men ook eene dwarse steek doen, en het dan als eenie schaar drukken; of door het omdraajen van hetzelfde de hersenen breeken, op dat zij beter kunnen uitvloejen.

4) Men neemt dikwijls waar, dat de opening door het *perforatorium* gemaakt, door het overëenschuiven der bekkeneelsbeenderen weder gesloten wordt: in dit geval kan één der wandbeenderen door eene gekartelde beentang ingedrukt, en dan of met deeze tang of met den vinger gevat, bewogen en uitgehaald worden; en alzoo

Heer v. KRANZ, mijn Leermeeester, heeft in *Parijs*, drie dergelijke schandelijke gevallen gezien, waarvan hij een, met zijne gewoonlijke ongeveinsdheid, oprechtlijk verhaalt.

Eene vrouw, zegt hij, (moeder van drie kinderen) die weeën had, was al voor vier-en-twintig uren het water gebroken, toen ik en mijn onderwijzer in de Vroedkunde werd gehaald: deeze, naa dat hij de vrouw op de lompste wijs onderlagen had, schuddede het hoofd tegen mij, en lag de haaken aan het hoofd van het arme kind, scheurde met geen kleen geweld de bekleedselen van het bekkeneel, bragt een gedeelte der hersenen uit, en eindelijk, naa een uur toevens, het kind, elendig mishandeld, naar buiten; terwijl het hem, met schreeuwen, zijne gruweldaad te kennen gaf; dan, dit gewaar wordende, zette hij den voet op den hals van 't kind, zo dat hetzelfde, nog half huilende den eersten en tevens den laatsten suik gaf, dien deeze onnensch het nog gaarne in 's moeders ligchaam had doen geeven.

Ik eize nog, zegt de gevoelige waarneemer, van dit gruwelijke toeval, als ik aan die onnenschlijke daad denk.

De Heer v. ZWIETEN voegt hier bi: „Deeze schandelijke daad hadde de hand des heils verdiend.

wordt de gemaakte opening groot genoeg — eene zaak die bij een verrot kind zeer gemakkelijk gedaan kan worden, welks fontanel men dikwijls zonder *perforatorium*, met den blooten vinger naamlijk, kan doorbooren.

5) Daar de bekkeneelsbeenderen nog vast vereenigd zijn, zijn de vingers te zwak: als dan moet men gebruik maaken van de beentang, hier achter afgebeeld: met deeze vat men één der wandbeenderen en buigt hetzelfde naar binnen, tegen de bekkeneels-holligheid aan; voords breekt men hetzelfde af, en brengt het met dezelfde tang naar buiten: echter moet men de beenderen die aan den rand scherp zijn, altoos tuschen en op de linkerhand uithaalen, op dat dezelve de schede niet beschadigen.

6) Is dit alles gedaan, dan persen dikwijls de weeën, door de gemaakte opening in het bekkeneel, de hersenen met het hoofd naar buiten, even als in eene natuurlijke geboorte.

Maar hebben de weeën opgehouden, dan blijft het hoofd stil liggen, en dus moet men hetzelfde door de kunst afhaalen: men beproeft daartoe om met eenen stompen haak in één der oogholten, in den mond, enz., waar dezelve maar wil vastzitten, het hoofd langs de as van het bekken uittetrekken: ik heb dit altoos met den stompen haak gedaan, anderen willen het met de tang doen, doch het plat en zamen gedrukt hoofd, kan niet wel met de tang gevat worden.

Maar als het hoofd overmaatig groot is, en de beenderen al te hard zijn, dan moet men, naa het weggenomen wandbeen, met de breede beentang beproeven, om één der slaapbeenderen uittebreken; alzoo wordt de basis van het hoofd sneller, en bereikt men gewislijk zijn doel.

Alle andere, in deeze operatie aangeraden werktuigen, zijn ontoereikend en gevaarlijk: de haaken alleen maaken het hoofd niet kleiner, ook niet de hoofdtrekker, beide werktuigen schieten ligtlijk uit, en kunnen de

baarende vrouw of de hand des Vroedmeesters beschadigen: de verborgen zaag van FRIED door THEBESIUS tot het ontherfenen aanangeprezen, is gevaarlijk en over-tollig.

Het ontlasten der borst-ingewanden

Als een bijzonder groot kind met de geheele borst- of met den rug zoo vast en zoo diep in het bekken geklemd is, dat men, om het te keeren, voftrekt niet bij de voeten kan komen, moet men het kind verkleenen, dat is de borst en buikholte van derzelver ingewanden ontlasten.

Deeze operatie is zeldzaam noodig; evenwel ben ik genoodzaakt geworden dezelve te doen; echter slechts eenmaal, offchoon ik eene groote menigte van geklemd borst-geboorten behandeld hebbe.

Men ziet dus ligtlijk in, dat zij alleen kan plaats hebben, als er vaste tekens van den dood des kind aanwezig zijn, of als het keeren onmogelijk is; als het kind monstereus is; of als het samengegroeide tweelingen zijn; want een, in dit geval, leevend kind, kan alleen door de keizerlijke snede, of door het klieven der schaambeenderen in 't leven blijven.

Daar de kinderen in zulke eene ligging lang kunnen leeven moet men, alvorens de operatie te bewerkstelligen, zeer naauwkeurig de verschijnselen van een dood kind overweegen.

Is nu in den derden graad der geklemd borst, het kind dood, dan moet men hetzelfde op de volgende wijze ontlasten.

Voor eerst, moet de vrouw zig dwars over 't bed liggen: de Vroedmeester brengt zijne linkerhand in de schede; twee vingers dier hand zet hij op die plaats van

de borst des kinds, waar hij de borst wil en kan openen: de plaats naast het borstbeen is het zachtste van allen, om door te booren.

Ten tweeden, wordt het *perforatorium* met de rechterhand des Vroedmeesters van buiten in de borst gebragt, zoodanig dat de punt van het instrument op de in de schede zijnde vingers der linkerhand voord gaat, om den mond der baarmoeder niet te beschadigen: nooit moet de punt van het werktuig van het gevoel des vingers afwijken.

Is men dus zeker, dat de punt van het *perforatorium* op de borst des kinds, naast de ribben geplaatst is, dan drukt men hetzelfde tusschen deezen door in de borst: zoo men het *perforatorium* vanëen doet, verwijdt men de wonde zoo veel men kan: dezelfde wond en verwijding maakt men meer naar onderen: men brengt als dan het *perforatorium* en de linkerhand, uit de schede, en de rechte hand weêr in dezelve, om met den vinger de ribben, die zig tusschen de gemaakte opening bevinden, te breeken.

Dit heb ik eens zeer gemakkelijk gedaan, alhoewel het kind toen nog niet geheel verrot en bros ware geworden.

Heeft men eene genoegzaame opening in de borst, dan trekt men met den vinger, of met de stompe haaken, de ingewanden der borst naar buiten: men breekt het middenrif met den vinger, of als dit niet kan geschieden, gelijk ik ondervonden heb, met het *perforatorium*, en verwijdt de wond met den vinger; en dan kan men de ingewanden der borst- en buikholte, zeer gemakkelijk met den vinger of met eenen stompen haak uithaalen.

Zijn de borst- en buikholte op deeze wijs ledig gemaakt, dan heeft men ruimte genoeg om met de hand bij de voeten te komen, het kind te keeren, en bij de voeten uit de baarmoeder te haalen: ik heb dit bij een groot kind gelukkiglijk volbragt.

Ik houde de door RÖDER en andere aangeprezene sterke snijdingen van den ruggegraad in twee of meer

stukken geheel onnoodig: al is het kind dood, moet men echter geene stuksnijding van het ligchaam doen, zonder daartoe genoodzaakt te weezen, om de baarende vrouw en omstanders niet nog akeliger te maaken.

Zijn met de borst een of beide de armen in het bekken gezakt, en sterk opgezwollen, dan moet men dezelve, als zij hinderlijk zijn, vóór de operatie, uitdraajen, welverstaande, als het kind dood is.

Om het uitdraajen van één der armen te doen, draait men, zoo veel mogelijk, dien aan den schouder aangevatten opper-aam, zoodanig om, dat dezelve uit het gewricht kan genomen worden: meestal blijft het schouderblad en het sleutelbeen, tegelijk aan denzelven hangen; is dit het geval niet, dan buigt men de twee beenderen op zig zelve uit, en men heeft ruimte om tot de borst te komen.

Alle tot deeze operatie uitgevonden scherpe haaken, schaaren en mesfen zijn onnutte en gevaarlijke werktuigen; slippen zij uit, dan kwetst men de baarende vrouw, of zig zelve: het eenvoudige *perforatorium*, en dergelijke stompe haaken, zijn toereikende genoeg (zoo als ik ondervonden heb) om de borst en buikholtten ledig te maaken.

Hoe een afgetrokken en teruggebleven hoofd uit de baarmoeder gebragt moet worden.

In alle geboorten, waarin men het kind met de voeten ter wereld tracht te brengen, is veelal het moeijelijkste om 't hoofd door het bekken te haalen: men heeft in de volgende gevallen den tronk van het hoofd des kinds afgescheurd:

1) Als men de keering gedaan had, daar het hoofd te groot, en het bekken te naauw was, en het lijf geweldig werd getrokken,

2) Als het hoofd niet te groot, maar tog door de rotting heel slap aan de banden der halswervelen was.

3) Als het kind in die tegennatuurlijke ligging getrokken werd, daar het aangezicht naar vooren met de onderkaak boven op den rand der schaambeenderen hing.

4) Als men het hoofd met de armen met geweld in de kleene diameters van het bekkenhol trok.

5) Als een hevige kramp in den mond der baarmoeder of de schede, het hoofd, onder het sterk trekken, terughield.

Hoe het afscheuren van het hoofd in alle deeze gevallen te verhoeden is, hebben wij reeds bijzonderlijk in de afdeeling van de geboorte der voeten afgehandeld. Hier is alleenlijk de wijs te beschouwen, hoe een afgescheurd en terug gebleven hoofd van zulk een kind vervolgens uit de baarmoeder is te brengen.

Het afgescheurde hoofd kan nog geheel in de baarmoeder, of reeds in het bekkenhol, dat is in de schede zijn: aan het afgescheurde hoofd kan zig nog een of meer, of geheel geene, der halswervelen bevinden; dit laatste gebeurt zelden: deeze verschillende omstandigheden moet men door het gevoel naafpeuren.

De Vroedkundige Schrijvers zijn 't in dit geval niet eens; sommigen willen dit afgescheurde hoofd aan de Natuur overlaten; doch wel overwogene aanmerkingen, bepaalen de volgende regelen.

Is het hoofd nog in het hol der baarmoeder, dan kan hetzelfde door de sterkste weeën niet uitgeperst worden; om dat de basis altoos grooter is dan de bovenste opening van het bekken, en om dat deeze vlakke zig nooit kegelswijs kan vormen, zoo als de kruin.

Maar is het afgescheurde hoofd reeds in het bekken; dan heeft men wel eens de geheele uitpersing door de Natuur zien verrichten.

Mijn raad is, in het eerste geval, zig nooit, en in het

tweede zelden op de weeën, en op de Natuur te verlaten; maar ten eersten de hand aan 't werk te leggen, om de vrouw van het teruggeblevene hoofd te verlossen.

Maar men moet trapsgewijs van de kleenen tot de grootte handgreepen overgaan.

In het geval nu, daar zig het afgescheurde hoofd in de baarmoeder bevindt, moet de Vroedmeester beproeven, om zijne twee vingers in den mond des kinds, en den duim in het groote achterhoofdsgat te brengen, om dus het hoofd niet in zijne Natuurlijke richting, maar dwars door het bekken te brengen.

Deeze handgreep gaat dikwijls goed, als het hoofd niet te groot, niet verrot, en geen der halswervelen aan zig heeft; want een groot hoofd is onmogelijk zonder ontherfening uit te haalen: in dit geval en in de verrotting scheurt de onderkaak ligtlijk uit het gewricht, en het aanweezen der halswervelen verhindert ons den vinger of duim in het groote achterhoofdsgat te brengen; dus heeft men geene vastigheid, en kan men ook niet sterk trekken.

Hier nu, daar men met de hand niets doen kan, neemt men den stompen haak te hulp, dien men in de oogholte, in de neusgaten, of waar men kan, zet, en zoekt dus deels met de hand, deels met den haak, den uitgang te bewerken: deeze verëenigde krachten zijn meestal toereikende, als het hoofd niet te groot is, zoo als ik reeds in drie gevallen heb waargenomen.

Maar is dezelve te groot, dan is men in dit of in ieder ander geval genoodzaakt (als men met de hand of de haaken niets kan verrichten,) om het hoofd te ontherfenen: dus zoekt men het hoofd door de hand zoo te draaien, dat de kruin aan den baarmoedersmond en de bovenste opening van het bekken te staan komt: in deeze plaatsing laate men den kruin van buiten op den buik vasthouden, dat het bij de werking van het *perforatorium* niet uitwijke: voor het overige wordt de geheele operatie zoodanig voortgezet, als wij bij het ontherfenen van het hoofd gezien hebben.

Is het hoofd daar en tegen in het bekkenhol afgescheurd geworden, dan kan men de hand wel gemakliker daar naa toe brengen, of het met de tang uithaalen; maar om de grootte vereischt het de ontherfening; dan dit is moeijelijk aan den basis van het bekkeneel te doen, gelijk ik ondervonden heb, toen ik eens genoodzaakt werd, het *perforatorium* door den basis van 't bekkeneel in de holligheid van 't hoofd te brengen.

Er is een groot getal van wijzen, waar op, en ook veele werktuigen, waarmede het uithaalen van een afgescheurd hoofd moet geschieden, zoo door de oude als hedendaagsche Vroedkundigen beschreven en voorgedragen; maar ik vermeet mij te zeggen, dat zij allen gevaarlijk en onvermogen zijn.

Voor onnut houde ik de zakken van AMAND en GREGORIE; de van veele uitgevondene slingers; de door elastiken draaden gemaakte banden van SMELLI en BOURTON; de hoofdtrekkers van MAURICEAU en anderen, enz.: zelfs de drie-armige hoofdtrekkers van LEVRET.

De wijze, om naa een afgescheurd hoofd, den in de baarmoeder teruggeblevenen tronk uithaalen

Zeldzaamer en niet minder verdrietiger is het geval in de Vroedkunde, als in of buiten het bekkenhol het hoofd des kinds van den hals, of met den hals van den tronk gescheurd wordt, zoo dat dezelve in het bekkenhol, of in de baarmoeder terug blijft: de oorzaken van dit afscheuren des hoofds van den tronk, kunnen één of meer van de volgenden zijn:

1) Als het reeds buiten den uitgang staande hoofd met geweld, en uit onkunde, getrokken wordt: bijzonderlijk,

- 2) Als de uitgang van het bekken te naauw is.
- 3) Als het geheele kind reeds verrot is.
- 4) Als de schouders te breed zijn.
- 5) Als het kind zoodanig met het hoofd staat, dat de schouders vast tusfchen de fchaambeenderen en den voorberg van het heiligbeen geklemd zijn.
- 6) Als de armen kruislings op den rug liggen.
- 7) Als de fluitfpiet der fchede den hals terug houdt.

8) Doch meestal is het gebrek, als het lijf des kinds monftrous, of dat de buik, water- of trommel-zuchtig is.

9) Ook door de tang is het mogelijk het hoofd van den hals af te fcheuren.

Den tronk van dit ongelukkige kind zoekt men op de volgende wijze uit het bekken te haalen.

Is dezelve in de baarmoeder, of, zoo als meestal gefchiedt, in het bekkenhol met den afgefcheurden hals dan zoeke men ten eerften, één of alle twee armen lostemaaken, en deeze van den tronk aftebrengen: men vat dan de armen bij de fchouders, zoo dat men een vast deel tot het trekken heeft, (als de vrouw nog fterke weeën heeft, gaat dit dikwijls goed, in zoo verre geen bijzonder gebrek aan het bekken, of aan het ligfchaam der vrucht plaats hebbe.)

Kan men den tronk door het losmaaken van, en trekken aan de armen, niet naar buiten brengen, dan kan men tusfchen de ribben, al waar zij beenig zijn, of tusfchen de wervelen eenen ftompen haak inzetten, en daar mede het uittrekken beproeven: is dit ook niet voldoende, dan is meestal de tronk waterzuchtig of monftrous: in dit geval ftoot men tusfchen de ribben het *perforatorium* in de borstholte; men verwijdt de opening met dit instrument, en brengt den ftompen haak daarin: men trachtte de longen om deeze te wikkelen, en dezelve uittehaalen; is de borst ledig, dan brengt men het *perforatorium* weder in de borst, om door middel van hetzelfde het middenrif met de punt van het instrument

te klieven: naa het uitgehaalde *perforatorium* volgt meesal het water uit den waterzuchtigen buik; en als er geen water aanwezig is, dan brengt men met den stompen haak, de ingewanden naar buiten, wanneer de buik samenvalt en men terstond gemakkelijk den tronk met den haak, of met den losgemaakten arm kan uittrekken, zoo als ik reeds tweemaal gedaan heb, waar de Vroedvrouw het hoofd van een waterzuchtig kind afgetrokken had.

Het is voor de baarende vrouw veel voordeeliger het ontlasten der ingewanden te doen, dan een dik lijf zonder dit, uit te haalen: trekt men deeze met geweld door, dan worden de baarmoedersmond en de bilnaad elendig gescheurd.

Zoo de geheele tronk in de baarmoeder blijft, en is dezelve niet geheel groot, dan kan men beproeven, om door het keeren den afgescheurden tronk met de voeten uittehaalen, 't welk mij eens wèl gelukt is.

Het doorklieven van het tuschen de schaambeenderen liggende kraakbeen en de bandachtige zelfstandigheid.

Deeze operatie is ééne der nieuwste uitvindingen in de Vroedkunde, en heeft door haare nu eens gelukkige, dan eens ongelukkige gevolgen, eenen algemeenen twist onder de kundigste Vroedmeesters veroorzaakt.

Dezelve bestaat in het doorklieven van de kraakbeennige verëeniging der schaambeenderen.

Zij wordt alleenlijk dan verricht, als het kind nog leeft, en deszelfs hoofd in het bekkenhol, alzo is ingeklemd, dat het noch met de tangen, noch door den hefboom verlost kan worden; ook als het bekken niet meer dan drie duim in de rechte lijn heeft, of als de

dwarfe afmetting te klein is, en de breede schouders van het kind niet doorlaat.

Offchoon nu in deeze gevallen de operatie altoos gedaan moet worden, zij men voorzichtig echter dezelve te doen daar de rechte afmetting, boven in het bekken, minder dan drie duim houdt; want al worden de schaambeenderen aan de rechte afmetting omtrent twee duim verwijld, zoo zoude deeze snede het bekken maar twee lijnen wijder maaken, en alzoo voor het hoofd des kinds niet voldoende zijn; dewijl men reeds ondervonden heeft, dat de schaambeenderen niet over de twee duim vanëen wijken, zonder breeking der banden van het kraakbeen aan de darmbeenderen en het heiligbeen; vervolgens als het kraakbeen der schaambeenderen verbeend is, of dat het te naauwzijnde bekken geheel mismaaft is; maar moet de operatie gedaan worden, dan moet men de volgende noodige instrumenten, en de hiertoe behoorende verbanden gereed hebben.

De instrumenten tot de operatie zijn: 1) een gemeen scherp mes, om de zachte deelen doortefnijden, 2) een middenmaatig groot heel plat en scherp mes, om het kraakbeen te klieven, 3) eene zaag om het kraakbeen, als het zelve verbeend is, door te zaagen.

Tot het verband bereidt men het bekende vereenigde verband, om de wond te verbinden; een stuk spongie om het bloed afteveegen, en genoeg droog plukfel om de wond te dekken.

De baarende vrouw laat men op den rug liggen, en men laat de deiën zoodanig vanëen houden, dat de heelmeeester met de hand den geheelen omtrek der schaambeenderen vrij heeft om, ongehinderd, zijn werk te kunnen doen: de operatie wordt op de volgende wijze verricht.

1) Men ontlast de blaas van haare inhoudende pis, door middel van eenen mannen Katheter.

2) Op gelijke wijze ontlast men den endeldarm, door middel van klyfsteeren, van de drekstof.

3) Snijdt men met het gemeene mes, de algemeene

bekleedselen en het vet der schaambeenderen, tot op den band die over het kraakbeen ligt, stukken: de vrouwelijke roede of de klitoris brengt men op de eene of andere zijde, op dat zij niet gekwetst worde.

4) Is dit doorgesneden, dan snijdt men ook het voorste gedeelte van den bandachtigen ring, en het daar tuschen liggende kraakbeen met het daartoe bepaalde mes stukken.

5) Hier op snijdt men nog het achterste gedeelte van dien ringvormigen band, met groote voorzichtigheid, door.

6) Naa dat nu deeze snede goed gemaakt is, worden de beenen en het schaambeen zoo ver vanëen gebragt, als noodig is, om het kind uittehaalen; ook moet men hier bij voorzichtig zijn, dat niet de kraakbeenderen, die het heilig- en darm-been verëenigen door het schielijk vanëen drukken, nadeel lijden: ten laafsten

7) Wordt het hoofd door de tangen uitgehaald; of als het kind eene kwaade ligging heeft, hetzelfde gekeerd en ter wereld gebragt.

Bij het eerste verband wordt de wond alleenlijk met droog draadplukfel, en met het verëenigde verband om het bekken heen, zeer los verbonden: de geheele geneezing wordt door de *essent: mastich: of tint: myrhe* volbragt: in den tijd der geneezing moet de lijderes geduurig op den rug liggen, tot dat de schaambeenderen vereenigd zijn.

De Vroedmeester moet bij de operatie ook op de toevallen gevat zijn, die naa dezelve kunnen gebeuren: want

1) Of de pisblaas, of de baarmoeder, of ook de kraakbeenige verëeniging der heilig- en darm-beenderen kunnen ontfloken zijn; dit wordt door aderlatingen en stoovingen verholpen.

2) Kan eene tegenwillige verlossing door een kwetsing of uitrekking der schaambeenderen aan den hals der pisblaas volgen: dit herstelt men door aanhoudende

rust, en door het gebruik van antiphlogistische geneesmiddelen.

3) Bemerkt men naa verloop van tijd, meest altoos dat op de operatie een mank gaan der lijdereſſe volgt, het welk door het vanëenſtaan der ſchaambeenderen ontſtaat: dit gebrek vergaat ook van langzaamerhand, als men de vereeniging der ſchaambeenderen eenigen tijd door het vereenigde verband onderſteunt en ſamen houdt.

De buikſnede.

Deeze operatie wordt in de Vroedkunde dan ondernomen, als er eene zwangerheid buiten de baarmoeder plaats heeft; het kind in dien tijd in de buikholte voldragen is geworden, en nu eenen uitweg zoekt door de buikbekleedsen, of dat in deeze zwangerheid het kind in het buikhol dood is, en zig den uitgang door een ontſtoken ettergezwel, of door het in verſterving overgaan der bekleedselen, op eene of andere plaats zoekt; of eindelijk ook daar, als het kind door het ſcheuren der baarmoeder in den buik overgegaan is, en men hetzelve in de algemeene wegen, tot de geboorte niet kan terug brengen.

Tot deeze operatie houdt men de volgende instrumenten in gereedheid: 1) een recht ſtaande mes; 2) een mes met eene bolle ſnede; 3) een met een holle ſnede; 4) eene breede holle ſonde; 5) eene rechte en kromme ſchaar; eenige naalden met gewaſchte zijden toebeleid.

Tot het verband behoort: 1) genoegzaam kleevende pleiſter; 2) drooge wicken en, 3) een groot op twee hoofden gewikkeld windſel.

Naa dat nu alles tot deeze operatie bereid is, laat

men de lijdere ruglings op een tafel leggen, of ook des nood op een bed, en begint op die plaats, waar men waarneemt dat het kind ligt, de operatie op de volgende wijze,

1) Men klieft de bekleedselen en spieren tot op het buikvlies, ter lengte van zes duimen: als men door deeze insnijding eene slagader kwetst, waar door eene sterke bloeding ontstaat, zoo moet dezelve eerst onderschept worden.

2) Maakt men voorzigtiglijk eene insnijding, in het buikvlies: in deeze insnijding brengt men twee vingers, en opent het buikvlies met het bolstaande mes naar boven, en dan naar onder tegen de ingesneden buikspieren: als hier de ingewanden uitvallen, moeten dezelve door eene helpende hand terug gehouden worden.

3) Na dat nu de buik geopend is geworden, wordt het geene, waarmede het kind omkleed is, en uit de trompet, of uit het eiënest, of uit de vliezen van het ei zelf bestaat, geopend; echter wordt hetzelfde meestal open gevonden.

4) Het kind wordt voords uitgenomen.

5) Wordt de koek losgemaakt, en met het vliezige ei, weggenomen.

5) Zuivert men de buikholte door middel van sponsjes van het uitgestorte bloed, of van het lamsvocht.

7) Voords wordt de wond met pleister, drooge wicken, en het verëenigende verband verbonden.

8) Kan men, als men het noodig vindt, den onderste hoek der wonde, door middel van één daarin gelegd strookjen linnen, openhouden.

9) Is de wond wél verbonden, dan legt men zoo wél over den buik, als over de wond zelve, stovingen van wijnmoër met water en gestampt lijnzaad.

10) Men schrijft eene aderlaating voor, als mede een goede eetregel, klysteeren en ook inwendige geneesmiddelen tegen de ontsteeking, bedeed met pijnstillende middelen, ten einde de ontsteeking tegen te gaan.

De toevallen die soms op deeze operatie volgen en de geneezing verhinderen, zijn:

1) Ontsteeking der wonde, en van den buik, bijzonderlijk als de buikshechting gedaan is geworden: deeze ontsteeking moet men met gepaste genees- en heelmiddelen tegen gaan, of verminderen.

2) Het braaken, waardoor de darmen uit de wonde vallen: in dit geval geeft men *opium* en houdt de wond met de hand samen, tot het braaken bedaard is.

3) Ten laatste heeft men dikwijls waargenomen, dat het lidteken van deeze wond, niet zelden de aanleidende gelegenheid tot eene buikbreuk is geweest: des is het noodzaaklijk, dat het verband wel aangelegd worde, bevochtigd met versterkende stovingen.

De keizerlijke snede.

De voorbepaalde orde brengt mij thans tot de ake-
ligste en gevaarlijkste aller operatiën: ik meen de door-
snijdingen van de buikbekleedselen, en van de baar-
moeder, om het kind ter wereld te brengen.

PLINIUS verhaalt, dat SCIPIO de *Africaaner* uit het lijf zijner, onder de geboorte overleden, moeder was gesneden: het geschiedverhaal van deezen Schrijver leert ons de oorzaak van deeze benoeming kennen, daar hij zegt; dat het kind *a caesa matre*, CAESAR genoemd was geworden, en dat men daarom die snede den naam van *operatio caesarea* heeft gegeven: veele Schrijvers bevestigen, dat deeze operatie reeds voor dien tijd van SCIPIO was gedaan, des moet zij te vooren nog eenen anderen naam gehad hebben.

Naar het bericht van PLINIUS is deeze operatie der-
halven reeds voor 1500 jaaren bekend geweest: de me-
nigvuldige proeven en ondervindigen hebben geleerd,
dat dezelve aan levende vrouwen, *zonder zeker gevolg*

des doods gedaan kan worden: in de *Verhandeling der Academie der Heelkunde te Parys*, vindt men meer dan zestig voorbeelden van deeze operatie, alle welke met een goed gevolg gedaan zijn.

Zij is volstrekt noodzaakeijk in alle die gevallen; waarin men het kind op geene wijs, noch door het keeren, noch door instrumenten, langs den gewoonen weg, ter wereld kan brengen, en waarin de moeder tog, zonder die operatie het leven zoude verliezen.

De gevallen, welken de keizerlijke snede bij nog leevende vrouwen vereischt, zijn de volgende.

1) Als de rechte afmeeting in den ingang van het bekken naauwer dan drie duim, maar het kind levendig en voldragen is

2) Als de bovenste rechte afmeeting minder dan twee duim is, al zij het kind ook dood; want in dit geval kan noch het ontherfenen, noch het uithaalen van een voldragen kind geschieden; en wordt een verrot kind aan de Natuur overgelaaten, dan kan hieruit eene versterving der baarmoeder ontstaan, waarop gemeenlijk de dood volgt.

3) Als het kind in het buikhol, door eene scheuring der baarmoeder is gekomen.

4) Als de bevruchting buiten de baarmoeder is geschied.

5) Als de lijderes vóór de verlossing sterft: zie, om het kind in 't leven te houden, het geen ik gezegd hebbe wegens het geval, als de baarende vrouw dood is.

Dit zijn de vijf hoofd-aanwijzingen der keizerlijke snede: de kundigheid der nieuwe Vroedmeesters, heeft alle de andere aanwijzingen tot deeze operatie zeer verminderd: want 1) de breuk der baarmoeder; 2) de vernauwing van den mond der baarmoeder, 3) deszelfs verharding, samengroeijing, of toesluiting door gezwellen en 4) het alte groote hoofd of de andere liggingen, zijn nooit, of alleenlijk maar in zekere omstandigheden, aanwijzingen tot de keizerlijke snede, zoo als wij in de beschouwing over deeze gevallen gezien hebben.

Doch

Doch ook in de eerste vier hoofd-aanwijzingen moeten dringende toevallen, ten opzichte van een levendig of dood kind, daar zijn: want het is niet onmogelijk, dat het kind, verhard, als 't ware versteend, het geheele leven door, van de vrouw gedragen wordt, en wel zonder eenig nadeel: de keizerlijke snede wordt alleenlijk gedaan, om het kind, of om kind en moeder het leven te redden.

Ten opzichte der vrouwe wordt vereischt, dat zij krachts genoeg hebbe, en welgesteld genoeg zij, om deeze operatie uithouden; want eene zwakke vrouw, of wier baarmoeder in versterving begint te vallen, moet in rust haar einde afwachten.

Voor het overige is het in sommige Landen eene algemeene wet, iedere zwangere of baarende vrouw, als zij sterft, ten eersten te openen, om het kind te doopen, en als het mogelijk is, in 't leven te houden.

Wij zullen de operatie in de halve, en in de geheele keizerlijke snede verdeelen: de halven noem ik, waar men alleenlijk de wanden van den buik, en de geheelen, daar de baarmoeder ook moet geopend worden.

Van de vier hoofd-aanwijzingen, is alleen in de eerste en tweede, waar het kind zig bij een naauw bekken in de baarmoeder bevind, de geheele snede noodig: in de twee laatste aanwijzingen, is het kind buiten de baarmoeder geplaatst, des is hier alleen de halve of buiksnede van nooden.

Deeze kan men zonder eenig gevaar te vreezen onderneemen; maar de geheele snede is om de groote bloeding der baarmoeder geheel gevaarlijk: doch de zekere dood kan den Vroedmeester ook tot een twijfelachtig middel, een onomstootelijke aanwijzing zijn en blijven; bijzonderlijk als men beschouwt, het groote getal gelukkig volbrachte keizerlijke sneden, die opgetekend zijn, en dat de groote gemaakte opening in de door de zwangerheid groot geworden baarmoeder, zig geheel samentrekt, zodra de baarmoeder van het kind verlost is, en hierna houdt de bloeding geheel op: de groote overvloed van bloed in de baarmoeder maakt de bloedvliet minder gevaarlijk, en de baarmodersmond, als ook de groote buikwonde, zijn tot het ontlasten van het uitgevoerde bloed zeer dienstig: voor het overige zijn ook de groote buikwonden geneezelijk.

Wat aangaat den tijd waarin de operatie het best kan gedaan worden, die is, naa dat het water is afgevlodid; wordt de operatie, vóór de aanwezigheid der sterkste

weeën begonnen, dan zoude zig misfchien de baarmoeder niet naa gedaane operatie famentrekken; maar wordt dezelve te laat gedaan, dan kan deeze zig ontfteeken, om dat zij alte veel door de weeën uitgeput is.

Zodra nu de vrouw en haare vrienden in de operatie bewilligd, en de des kundigen dezelve noodzaakelijk gevonden hebben, dan moet men ten eerften de verbandstukken en instrumenten in orde leggen; de baarende vrouw haare gewoone bezigheden laaten bezorgen, en dan op de volgende wijze de operatie beginnen,

1) Twee *bistouris* van middenmaatige grootte, het eene bol, en het andere met eene holftaande snede en een knop er op; eene breede holle sonde; drie naalden met eenen gewaschten draad voorzien, tot de buikschechting en tot de onderfchepping der vaten, zijn de noodzaakelijke instrumenten: tot het verband behooren, het breede vereenigde verband en drukdoeken met eene toereikende hoeveelheid van plukfel, eiken zwam en spongie, om de wond van het bloed te zuiveren: dit alles moet niet onder het oog der vrouwe gebragt worden.

2) Naa men de pisblaas en endeldarm ledig gemaakt heeft, wordt de vrouw op den rug dwars op het bed gelegen, of op eene tafel, waarop men het hoofd door kussens laat ondersteunen, en daar het licht genoeg is; de beenen worden door de helpende handen bijeen gehouden: het aangezicht kan bedekt worden.

De plaats tot de insnijding is het midden van den buik, of op de witte lijn van den navel tot aan de verëeniging der fchaambeenderen; maar indien men de snede op de witte lijn maakt, begint men twee vingeren breed boven de fchaambeenderen, en snijdt naar boven tot twee vingeren breed onder den navel, de huid en spieren dóór, tot op het buikvlies; maar eerst maakt men voorzigtiglijk eene kleene opening, waarin men eene breede holle sonde of den wijsvinger der linkerhand brengt, om op deeze het buikvlies op- en neder-waards met een bolftaand knop-bistourie, te verwijden: de naar buiten vallende darmen moeten door eene helpende hand terug gehouden worden.

Als het kind in de baarmoeder is, dan moet deeze door een scalpel, in de midden tusfchen den hals en bodem door eene snede van vijf duimen lang, geopend worden, 't zij op de sonde, of op de nagel van' een vinger, om het kind geen nadeel toetebrengen: het kind wordt ten eerften met de vliezen en nageboorte, uit het hol der baarmoeder, voorzigtiglijk uitgenomen.

Het losmaaken van de nog vastzittende nageboort, is van groot gewigtig, zoo wel voor de vrouw als voor den Vroedmeester.

Zoodraa de baarmoeder ledig is, trekt dezelve zig samen, naamlijk uit eene ruimte van vier duimen, in die van één duim: men zuivert dan de wond en buikholte met laauw water, en laat de wond der baarmoeder aan de Natuur over — De buik-wonde tracht men door twee lange hechtpleisters, door drukdoeken, en door het verëenigende verband te herëenigen, en men let op alles, dat bij groote buikwonden kan voorkomen.

Op dezelfde wijs, en met dezelfde oplettendheid, moet de Vroedmeester de keizerlijke snede bij eene overledene zwangere vrouw doen: want daar de tekens van dood en leven zeer onzeker zijn, en daar eene sterke bezwijming het beeld des doods wel eens valsch heeft voorgesteld; zoude het den onderneemer niet berouwen, als de lijderes weêr bijkwame, voorzigtiglijk gehandeld te hebben.

De oorzaken zijn zeer grondig, waarom men tegenwoordig de keizerlijke snede niet meer op de zijde van den buik, maar op 't midden van denzelfen, op de witte lijn doet: want,

1) Is het zeker, dat de bovenbuiks-slagader eerder kan gekwetst worden, dan in de witte lijn, en ook hier zakken de darmen onder de operatie, zoo schielijk niet buiten, als op zijde.

2) Om de groote vaten der baarmoeder, en de veelal zijdelingfche ligging van den koek; waarom de snede op zijde, eerder dan die op de bovenste vlakke der baarmoeder gevaarlijke kan weezen.

3) Om dat ook het uitgevloeide bloed of de etter gemaklijker boven het schaambeên, dan uit de wond op zijde, ontlast kan worden.

4) Kan de wond in 't midden door het verband beter, dan op zijde door de bloedige hechting, verëenigd worden.

5) Is het lidteken veel kleiner en vaster op de witte lijn, dan dat hetwelk in de zijde komt, en men heeft, naa het geneezen der wonde, minder vrees voor eene breuk, dan op zijde.

VERKLAARING

DER






PLAATEN.


PLAAT I.

- Fig. I. De Steinsche geboortestoel.
- II. Dezelve achterovergelegd, of het kunstige geboortebed.
- III. Roonhuyssaansche hefboom.
- IV. De stompe haak.
- V. De verborgene troisquart.
- VI. De luts.

PLAAT II.

- Fig. VII. De tang van Levret.
- VIII. Dezelve uitgelegd.
- A. De vrouwlijke arm.
- B. De manlijke arm.
- IX. Het perforatorium.
- X. De breede beentang.





VIII.
de la.

IX.

VII.

X.

VIII.
S. B.





